This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.



THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET

den man für Erfüllung körperlicher Bedürfnisse nicht anzusehen pflegt, auch für die Befriedigung geistiger anzuwenden. Durch den billigen Preis ermöglichen sie es tatsächlich jedem, auch dem wenig Begüterten, sich eine Bücherei zu schaffen, die das für ihn Wertvollste „Aus Natur und Geisteswelt" vereinigt.

Jedes der meist reich illustrierten Bändchen
ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich

Jedes Bändchen kartoniert M. 1.60, gebunden M. 1.90
Hierzu Teuerungszuschläge des Verlages und der Buchhandlungen

Leipzig, im März 191 Teubner

QC
6
.B65
1920

Jedes Bändchen kartoniert M. 1.60, gebunden M. 1.90

Bisher sind zur Physik und Chemie erschienen:

Physik: Einführung, Grundlagen und Geschichte.

Die Grundbegriffe der modernen Naturlehre. Einführung in die Physik. Von Hofrat Professor Dr. F. Auerbach. 4. Aufl. Mit 71 Figuren. (Bd. 40.)
Experimentalphysik, Gleichgewicht und Bewegung. Von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. A. Börnstein. Mit 90 Abbildungen. (Bd. 271.)
Die Lehre von der Energie. Von Oberlehrer R. Stein. 2. Aufl. Mit 13 Fig. (Bd. 257.)
Einführung in die Relativitätstheorie. Von Dr. W. Bloch. Mit 16 Fig. (Bd. 618.)
Das Wesen der Materie. Von Prof. Dr. G. Mie. 4. Aufl. 2 Bde. (Bd. 58/59.)
I. Moleküle und Atome. Mit 25 Figuren.
II. Weltäther und Materie. Mit zahlreichen Figuren.
Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin im klassischen Altertum. Von Professor Dr. Joh. L. Heiberg. Mit 2 Figuren. (Bd. 370.)
Große Physiker. Von Prof. Dr. F. A. Schulze. 2. Aufl. Mit 6 Bildnissen. (Bd. 324.)
Werdegang der modernen Physik. Von Oberlehrer Dr. H. Keller. 2. Aufl. Mit Figuren. (Bd. 349.)
***Physikalisches Wörterbuch.** Von Prof. Dr. G. Berndt. (Teubners kleine Fachwörterbücher. Geb. ca. M. 4.–)

Mechanik.

***Mechanik.** Von Prof. Dr. G. Hamel. 3 Bände. (Bd. 664/66.) I. Grundbegriffe der Mechanik. II. Mechanik der festen Körper. III. Mechanik der flüssigen u. luftförmigen Körper.
Aufgaben aus der technischen Mechanik. Von Prof. A. Schmitt. 2 Bde. (Bd. 558, 559, auch in 1 Bd. gebunden.)
I. Bewegungslehre. Statik. 156 Aufgaben u. Lösungen. Mit zahlreichen Figuren im Text.
II. Dynamik. 140 Aufgaben und Lösungen. Mit zahlreichen Figuren im Text.
Statik. Mit Einschluß der Festigkeitslehre. Von Baugewerkschuldirektor Reg.-Baumeister R. Schau. Mit 149 Fig. im Text. (Bd. 497.)
Das Perpetuum mobile. Von Dr. Fr. Schak. Mit 98 Abbildungen. (Bd. 462.)

Optik, angewandte Optik und Strahlungserscheinungen.

Das Licht und die Farben. Einführung in die Optik. Von Professor Dr. L. Graetz. 4. Auflage. Mit 100 Abbildungen. (Bd. 17.)
Sichtbare und unsichtbare Strahlen. Von Geh. Regierungs-Rat Professor Dr. A. Börnstein u. Professor Dr. W. Marckwald. 3. Aufl. von Professor Dr. E. Regener Mit zahlreichen Abbildungen. (Bd. 64.)
Das Radium und die Radioaktivität. Von Dr. M. Centnerszwer. 2. Aufl. Mit vielen Abbildungen. (Bd. 405.)
Die optischen Instrumente. (Lupe, Mikroskop, Fernrohr, photographisches Objektiv und ihnen verwandte Instrumente.) Von Prof. Dr. M. v. Rohr. 2., vermehrte u. verb. Auflage. Mit 89 Abbildungen im Text. (Bd. 88.)
Das Auge und die Brille. Von Prof. Dr. M. v. Rohr. 2. Aufl. Mit 84 Abbildungen und 1 Lichtdrucktafel. (Bd. 372.)
Das Mikroskop. Von Prof. Dr. W. Scheffer. 2. Aufl. Mit 99 Abb. (Bd. 33.)
Spektroskopie. Von Dr. L. Grebe. 2. Aufl. Mit zahlr. Abb. (Bd. 284.)
Kinematographie. Von Dr. H. Lehmann. 2. Auflage von Dr. W. Mertè. Mit Abbildungen. (Bd. 356.)
Die Photographie, ihre wissenschaftlichen Grundlagen u. ihre Anwendung. V. Dipl.-Ing. Dr. O. Prelinger. 2., verb. Aufl. Mit 64 Abbildungen i. T. (Bd. 414.)
Die künstlerische Photographie. Ihre Entwicklung, ihre Probleme, ihre Bedeutung. Von Dr. W. Warstat. 2., verb. Aufl. Mit Bilderanhang. (Bd. 410.)
***Angewandte Liebhaber-Photographie, ihre Technik und ihr Arbeitsfeld.** Von Dr. W. Warstat. (Bd. 535.)
Die Röntgenstrahlen und ihre Anwendung. Von Dr. med. G. Buck. Mit 85 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln. (Bd. 556.)

Akustik.

***Einführung in die Akustik.** Von Prof. Dr. D. R. Schulze. (Bd. 622.)

Jedes Bändchen kartoniert M. 1.60, gebunden M. 1.90

Wärmelehre.

Die Lehre von der Wärme. Gemeinverständlich dargestellt von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Bernstein. 2., durchgesehene Auflage hrsg. von Prof. Dr. A. Wigand. Mit 99 Abbildungen im Text. (Bd. 172.)
Einführung in die technische Wärmelehre (Thermodynamik). Von Geh. Bergrat Prof. A. Vater. Mit 40 Abb. im Text. (Bd. 516.)
Praktische Thermodynamik. Aufgaben und Beispiele zur technischen Wärmelehre. Von Geh. Bergrat Prof. A. Vater. Mit 40 Abb. im Text und 9 Tafeln. (Bd. 590.)
Die Kälte, ihr Wesen, ihre Erzeugung und Verwertung. Von Dr. H. Alt. Mit 45 Abbildungen. (Bd. 311.)

Einführung in die Chemie.

Einführung in die allgemeine Chemie. Von Studienrat Dr. B. Bavink. 2. Aufl. Mit 24 Figuren. (Bd. 582.)
Einführung in die organische Chemie. Natürliche und künstliche Pflanzen- und Tierstoffe. Von Studienrat Dr. B. Bavink. 2. Aufl. Mit 6 Abb. im Text. (Bd. 187.)
***Einführung in die anorganische Chemie.** Von Studienrat Dr. B. Bavink. (Bd. 598.)
***Einführung in die analytische Chemie.** Von Dr. F. Rüsberg. 2 Bde. (Bd. 524, 525, auch in 1 Bd. geb.)
Einführung in die Biochemie in elementarer Darstellung. Von Prof. Dr. W. Löb. 2. durchges. u. verm. Aufl. v. Prof. Dr. H. Friedenthal. M. 12 Fig. i. T. (Bd. 352.)
Elektrochemie und ihre Anwendungen. Von Prof. Dr. K. Arndt. 2. Auflage. Mit 37 Abbildungen im Text. (Bd. 234.)
Photochemie. Von Prof. Dr. G. Kümmell. 2. Aufl. Mit 20 Abbildungen im Text und auf 1 Tafel. (Bd. 227.)
Luft, Wasser, Licht u. Wärme. Neun Vorträge aus dem Gebiete der Experimentalchemie. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Blochmann. 4. Aufl. Mit 115 Abbildungen. (Bd. 5.)
Das Wasser. Von Geh. Regierungsrat Dr. O. Anselmino. Mit 44 Abbild. (Bd. 291.)

Chemische Technologie.

Die künstliche Herstellung von Naturstoffen. Von Prof. Dr. E. Rüst. (Bd. 674.)
Die chemische Technik. Von Dr. A. Müller. Mit 24 Abbildungen. (Bd. 191.)
Die Metalle. Von Prof. Dr. K. Scheid. 2. Auflage. Mit 11 Abbildungen. (Bd. 29.)
Der Luftstickstoff und seine Verwertung. Von Prof. Dr. K. Kaiser. 2. Aufl. Mit 18 Abbildungen. (Bd. 313.)
Agrikulturchemie. Von Dr. P. Krische. Mit 21 Abbildungen. (Bd. 314.)
Die Sprengstoffe, ihre Chemie und Technologie. Von Geh. Reg.-Rat Professor Dr. A. Biedermann. 2. Auflage. Mit 12 Figuren. (Bd. 289.)
Farben und Farbstoffe. Ihre Erzeugung u. Verwendung. Von Dr. A. Zart. Mit 91 Abb. (Bd. 483.)
Bierbrauerei. Von Dr. A. Bau. Mit 47 Abb. (Bd. 339.)
***Warenkundliches Wörterbuch.** Von Dr. M. Pietsch. (Teubners kleine Fachwörterbücher. Geb. ca. M. 4.–.)

Naturlehre im Hause.

Physik in Küche und Haus. Von Studienrat H. Speitkamp. Mit 51 Abb. (Bd. 478.)
Chemie in Küche und Haus. Von Dr. J. Klein. 4. Aufl. (Bd. 76.)
Desinfektion, Sterilisation, Konservierung. Von Regierungs- und Medizinalrat Dr. O. Solbrig. Mit 20 Abbildungen. (Bd. 401.)
Ernährung und Nahrungsmittel. Von Geh. Rat Prof. Dr. A. Zuntz. 3. Aufl. Mit 6 Abbildungen und 2 Tafeln. (Bd. 19.)
Arzneimittel und Genußmittel. Von Prof. Dr. O. Schmiedeberg. (Bd. 367.)
Die Bakterien im Haushalt der Natur und des Menschen. Von Prof. Dr. E. Gutzeit. 2. Aufl. Mit 13 Abbildungen. (Bd. 242.)
Das Beleuchtungswesen. Von Dr. H. Lux. Mit 54 Abb. (Bd. 433.)
Heizung und Lüftung. Von Ingenieur J. E. Mahrer. Mit 40 Abb. (Bd. 241.)

Die mit * bezeichneten und weitere Bände befinden sich in Vorbereitung.

5463 3.9

Aus Natur und Geisteswelt
Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen

618. Bändchen

Einführung in die Relativitätstheorie

Von

Dr. Werner Bloch

Zweite, verbesserte Auflage

Mit 18 Figuren

Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1920

Prof. Alex. Ziwet
gt.
5-7-1923

Herrn Professor

Dr. Alexander Pfänder

in München

meinem Lehrer der Philosophie

in dankbarer Verehrung

gewidmet

Schutzformel für die Vereinigten Staaten von Amerika
Copyright 1920 by B. G. Teubner in Leipzig

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechts, vorbehalten.

Vorwort.

In den folgenden Blättern habe ich mich bemüht, von der heute im Vordergrund des physikalischen Interesses stehenden Relativitätstheorie eine Darstellung zu geben, die für jeden lesbar sein soll, der mit den einfachsten Gedankengängen der analytischen Geometrie und der elementaren Physik vertraut ist, d. h. also sicherlich für alle diejenigen, die die Prima einer höheren Lehranstalt besucht haben. Ich habe geglaubt, die mathematische Behandlung nicht ganz vermeiden zu sollen, denn mir scheint, daß man bei Benutzung nur bildlicher, anschaulicher Methoden den Bildern zu viel Raum widmen muß und daß die Aufmerksamkeit gerade von den wichtigsten Punkten abgezogen wird. Ich habe aber andererseits Wert darauf gelegt, alles Mathematische auch ins Physikalische umzusetzen. Die Besprechungen der ersten Auflage, die übereinstimmend anerkannten, daß das Buch wirklich dem Anspruch der Verständlichkeit für weitere Kreise genügt, und der rasche Absatz der ersten Auflage ließen es mir geraten erscheinen, Abänderungen nur in geringem Umfang vorzunehmen. Ich habe auch grundsätzlich den zwei Versuchungen widerstanden, einerseits die allgemeinen naturwissenschaftlichen Betrachtungen zu erweitern und andererseits über das Notwendigste hinaus Dinge in das Buch aufzunehmen, die bei den elementaren mathematischen Mitteln nur hingenommen, aber nicht verstanden werden konnten. So habe ich mich darauf beschränkt — abgesehen von der Ausmerzung stehengebliebener Fehler oder Ungenauigkeiten — den Abschnitt über Masse und Energie in eine verständlichere Form zu bringen und dem Kapitel über die allgemeine Relativitätstheorie einige Betrachtungen einzufügen, die sich mit elementaren Mitteln durchführen lassen. Auch an dieser Stelle spreche ich gerne Herrn Professor Einstein meinen Dank aus, der sich freundlicherweise der Mühe unterzogen hatte, die erste Auflage im Manuskript durchzulesen, und aus dessen Ratschlägen auch die neue Auflage Vorteil gezogen hat. Mögen nun meine Leser an der Befriedigung teilnehmen, die ich immer wieder empfinde, [illegible] in die Gedankengänge dieser Theorie vertiefe.

im März 1920.

Werner Bloch.

424074

Inhaltsverzeichnis.

		Seite
I.	Einleitende Überlegungen	5
	Experimentelle und theoretische Physik	5
	Das Messen	7
II.	Die Bewegung und das Koordinatensystem	11
	Relative oder absolute Bewegung	12
	Das Koordinatensystem	15
	Koordinatentransformation	16
	Transformationsgleichungen	17
	Bewegte Koordinatensysteme	18
	Das Inertialsystem	19
III.	Der Bewegungszustand des Äthers. Aberration und Dopplerprinzip	27
	Der Äther	28
	Die Aberration	29
	Der Dopplereffekt	32
IV.	Die beiden Grundversuche	36
	Der Fizeauversuch	36
	Der Michelsonversuch	39
	Erklärungsversuche	43
V.	Die Relativitätstheorie	46
	Der Standpunkt des Beobachters	46
	Die Zeitmessung	47
	Die beiden Koordinatensysteme	50
	Die Längenmessung	52
	Die Frage nach den Transformationsgleichungen	53
	Andere Formulierung des Problems	54
	Das Relativitätsprinzip	56
	Das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit	56
VI.	Ableitung der Transformationsgleichungen	58
	Festsetzung über die Uhrstellung	58
	Mathematische Formulierung der Bedingungen	59
	Ansatz der Transformationsgleichungen	61
	Ausrechnung der Konstanten	64
VII.	Physikalische Bedeutung der Transformationsgleichungen und die ersten Folgerungen	66
	Bewegte Stäbe	66
	Bewegte Uhren	67
	Widerlegung eines Einwurfes gegen die Relativitätstheorie	71
VIII.	Das Additionstheorem der Geschwindigkeiten	72
	Die Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit	72
	Der Fizeauversuch	76
	Aberration und Dopplerprinzip	77
IX.	Einige weitere wichtige Folgerungen aus der Relativitätstheorie	78
	Die Mechanik	79
	Masse und Energie	80
X.	Bedeutung der Relativitätstheorie für die Physik und Philosophie	82
	Der gedankliche Anschluß	83
	Abänderung der Naturgesetze	84
	Philosophische Bedeutung	85
XI.	Historische Entwicklung der Relativitätstheorie und Ausblick auf die allgemeine Relativitätstheorie	87
	Die Elektrodynamik vor der Relativitätstheorie	87
	Die Leistung Minkowskis	89
	Allgemeine Relativitätstheorie	92

I. Einleitende Überlegungen.

Experimentelle und theoretische Physik.

Die Physik hat eine doppelte Aufgabe. Einmal liegt es ihr ob, Tatsachenmaterial zu sammeln, d. h. also Versuche anzustellen und durchzuführen und die beobachtbaren Erscheinungen zu beschreiben. Zweitens hat sie dieses Tatsachenmaterial zu sichten, zu ordnen, Vergleichbares zusammenzustellen, Unzusammengehöriges zu scheiden und schließlich Vorstellungen zu erdenken, die es gestatten, auch das in der Erscheinung nicht unmittelbar Zusammengehörige in der Vorstellung unter einheitlichen Gesichtspunkten zu erfassen. Man kann hiernach die Physik in zwei große Gebiete einteilen, indem man die experimentelle von der theoretischen Physik unterscheidet. Es ist selbstverständlich, daß keins der Gebiete ohne das andere lebensfähig ist. Man kann nichts „versuchen" ohne leitende Ideen, ohne theoretische Vorstellungen, und man keine Theorien aufstellen, ohne daß diese sich auf Tatsachen beziehen. Gleichwohl lassen sich gewisse Unterschiede im Charakter beider Seiten der Physik auffinden.

Der *experimentelle* Teil zeigt eine weit größere Stetigkeit im Fortgang der Entwicklung. Das liegt im Wesen der Sache. Eine einmal angestellte korrekte Beobachtung kann durch zukünftige Beobachtungen nicht widerlegt werden. Sie kann später anders gedeutet und ausgelegt werden, aber die Beobachtung selbst bleibt davon unberührt. Und so besteht der Hauptfortschritt auf diesem Gebiet, wenn es sich nicht um Entdeckung und Feststellung *neuer* Tatsachen handelt, vornehmlich in einer Verfeinerung der Maßmethoden, die es gestattet, die Genauigkeit früher angestellter Messungen zu erhöhen.

Ganz anders liegt die Sache auf dem *theoretischen* Felde. Hier gilt es, sich eine Vorstellung zu machen, die selbst nicht der Beobachtung entnommen ist, die zur Erklärung der Beobachtungen dienen soll. Eine solche Vorstellung nennt man eine *Hypothese*. Aus dieser Grundvorstellung oder Hypothese werden dann durch richtige Schlüsse Behauptungen abgeleitet über beobachtbare Tat-

sachen. Diese Behauptungen werden mit denen verglichen, die die experimentelle Forschung über denselben Gegenstand aufstellt. Stimmen dann alle abgeleiteten Behauptungen mit allen aus der Beobachtung sich ergebenden überein, so kann man die Hypothese als einheitliche Erklärungsvorstellung des ganzen Gebietes gelten lassen. Findet sich aber auch *nur eine* Erfahrung, die mit den Ableitungen aus dieser Hypothese in unlösbarem Widerspruch steht, so muß die Hypothese aufgegeben werden. Die Gesamtheit einer Hypothese und ihrer Folgerungen nennt man eine *Theorie*. Es ist nun in der Physik keine seltene Erscheinung, daß eine Theorie mit sämtlichen zur Zeit bekannten Tatsachen übereinstimmt, sich aber später mit einer neu auftretenden Erfahrung nicht vereinigen läßt. Dann wird man zunächst versuchen, sich durch Abänderung der Nebenhypothesen der Erfahrung anzupassen. Gelingt das aber nicht, ohne allzu komplizierte Annahmen in die Theorie einzuführen, so muß man eine veränderte Hypothese zugrunde legen und eine neue Theorie ableiten, die den neuen Erfahrungen besser entspricht. Nehmen wir ein Beispiel. Die Vorstellung, daß das Licht aus geradlinig ausgeschleuderten kleinsten Körperchen bestehe, genügt zur Erklärung vieler optischer Erscheinungen, insbesondere um die Schattenformen und die Spiegelung zu verstehen. Diese Vorstellung versagt jedoch bei der Erklärung der Brechungserscheinungen oder würde wenigstens sehr umständliche Hilfsannahmen erfordern. Beide Gebiete werden aber einheitlich erklärt durch die Vorstellung, daß das Licht eine wellenartige Bewegung in einem besonderen Medium, dem Äther, sei. Es mußte also die erste Hypothese durch die zweite ersetzt werden, nachdem man hinreichende Erfahrungen über die Brechung des Lichtes besaß.

Wir sehen hier gleich an einem Beispiel, daß die wichtigsten Fortschritte der theoretischen Physik in gleichzeitigem Niederreißen der überkommenen und Aufbau der neuen Vorstellungen bestehen. Neue Erfahrungen sprengen den alten Rahmen, führen zu kritischer Stellungnahme gegenüber dem bisher bewährten Vorstellungsganzen und führen so große Umwälzungen herbei, da ja mit Veränderung der Hypothese auch alle Ableitungen der neuen Vorstellung angepaßt werden müssen. Denn es ist selbstverständlich, daß man nicht auf die Dauer zwei verschiedene Grundvorstellungen über dasselbe Gebiet nebeneinander bestehen lassen kann. So zeigt die

retische Physik einen viel revolutionäreren Charakter als die experimentelle, der aber kein Fehler ist, sondern in ihrem Wesen unvermeidlich begründet liegt.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt steht die Physik nun in einer Phase, in der auf vielen Gebieten zugleich die bisher geläufigen Vorstellungen versagen und in der eifrig daran gearbeitet wird, das Alte durch Neues zu ersetzen. Es ist nur natürlich, daß hier nicht jeder Versuch, eine neue Hypothese einzuführen, sofort vollen Erfolg hat. Eine neue Hypothese kann in ihrem Grundgedanken richtig sein und doch in Teilen veränderungsbedürftig. Sie kann zu allgemein und zu speziell sein, und es bedarf meistens vieler experimenteller Arbeit, um eine neue Hypothese zu bestätigen. Auch muß man folgendes beachten. Zur Erklärung eines bestimmten Tatsachengebietes stehen zuweilen mehrere Hypothesen zur Verfügung (etwa zur Erklärung der Schatten- und Spiegelungserscheinungen allein sowohl die Emissions- als die Wellentheorie des Lichtes). Solange keine Erfahrungen aus verwandten Gebieten vorliegen, die der einen oder der anderen Hypothese ein Übergewicht verschaffen, wird die größere *Einfachheit der Vorstellung* für die Annahme einer Hypothese ausschlaggebend sein. So darf man denn im allgemeinen annehmen, daß, wenn eine bisher brauchbare Theorie durch eine neue ersetzt werden muß, diese neue in irgendwelcher Hinsicht die schwierigere ist. Denn wäre sie die einfachere, so hätte man sich ihrer ja schon vorher bedienen können, da sie das früher bekannte Tatsachengebiet jedenfalls mitumfassen muß.

Das Messen.

Der Relativitätstheorie, mit der wir uns hier beschäftigen wollen, liegen nun Hypothesen zugrunde, die die allerersten Voraussetzungen der ganzen Physik betreffen. Sie ist nämlich eine Antwort auf die Frage, ob unsere physikalischen Messungen und Bestimmungen sich auf einen durch die Natur gegebenen Raum und eine der ganzen Welt gemeinsame, gewissermaßen an einer Weltenuhr ablaufende Zeit beziehen, d. h. ob sie *absolute* Messungen[1]) sind, oder ob

[1]) Dieser Begriff der „absoluten" Messung hat nichts zu tun mit dem [illegible]l des „absoluten Maßsystems". Denn das ist der Name für ein ganz [illegible]mmtes, unter den Physikern verabredetes, auch als „wissenschaftliches" [illegible]ichnetes Maßsystem, das als Grundmaße das Zentimeter, das Gramm [illegible] Sekunde benutzt.

sie sich nur auf jeweils durch Verabredung bestimmte Körper und Uhren beziehen, d. h. relative sind. Wir können also nicht umhin, uns mit diesen Grundlagen der Physik vertraut zu machen, um uns an die Problemstellung unseres eigentlichen Themas heranzuarbeiten.

Um an einer Erscheinung etwas messen zu können, müssen wir zunächst voraussetzen, daß an den Erscheinungen überhaupt etwas vorhanden ist, das wir als Größe bezeichnen dürfen, das meßbar ist. Solch eine meßbare Größe an den Erscheinungen ist nicht immer unmittelbar auffindbar. Man kann z. B. die Farben sehr wohl in eine Ordnung nach Ähnlichkeit bringen, aber der Messung zeigen sich die Farben nicht so unmittelbar zugänglich. Um zu messen, ist es notwendig, eine Maßeinheit oder kurz ein Maß festzusetzen. Dieses Maß muß eine Erscheinung der gleichen Art sein wie das zu Messende. Im übrigen ist seine Größe beliebig. Das Messen besteht nun darin, festzustellen, wie oft von einem angenommenen Anfangspunkt aus das Maß gesetzt werden muß, damit die Summe dieser Maßeinheiten der zu untersuchenden Größe an der betrachteten Erscheinung gleichkomme.

Wir sehen also, daß es ebenso viele Maße geben muß als Arten zu untersuchender Erscheinungen. Es muß ein Maß für Längen geben, ein anderes für Flächen und ein weiteres für Räume; ein Maß für Zeiten, für Temperaturen, für Kräfte, für Geschwindigkeiten usw. Die Reihe, die hier aufzuzählen wäre, ist unabsehbar. Bei näherer Betrachtung dieser Maße ergibt sich nun aber, daß zwischen vielen von ihnen gewisse Zusammenhänge bestehen. Man mißt z. B. Geschwindigkeiten mit Hilfe von Längen und Zeiten, Beschleunigungen und Massen usw. Es ist nun möglich gewesen, eine sehr große Anzahl physikalischer Maße auf drei Grundmaße zurückzuführen. Als diese drei Grundmaße sind im wissenschaftlichen Maßsystem eine Längeneinheit, eine Zeiteinheit und eine Masseneinheit angenommen worden.

Solche Maßeinheiten festzulegen, ist nun aber nicht ohne jede Schwierigkeit möglich. Ein brauchbares Maß muß so beschaffen sein, daß es seiner Größe nach möglichst unveränderlich ist und namentlich sich auch während des Messens nicht ändert.

Stellt man also z. B. ein Längenmaß aus irgendwelchem Material her, so muß man vor allen Dingen dafür sorgen, daß der

Maßstab sich nicht von selbst ändert. Wir kennen mancherlei Einflüsse, die einen aus dem besten Material hergestellten Maßstab in seiner Länge zu beeinflussen vermögen, so insbesondere die Temperatur. Soweit uns solche Umstände bekannt sind, können wir sie ja nun bei Messungen in Rücksicht ziehen, die Messung korrigieren und ihren Einfluß in weiten Grenzen unschädlich machen. Solche Einflüsse lassen sich verhältnismäßig leicht feststellen, wenn verschiedene Körper in verschiedenem Grade von ihnen betroffen werden. So ist es z. B. bei der Ausdehnung durch die Temperatur der Fall. Nehmen wir aber einmal an, daß alle Körper, gleichviel aus welchem Material sie bestehen mögen, von dieser Veränderung betroffen werden, wie wäre es dann möglich, diese Veränderung festzustellen? Wir wollen uns der besseren Veranschaulichung halber ein Beispiel dazu ersinnen. Nehmen wir an, alle Körper würden bei einer Bewegung in der Bewegungsrichtung verkürzt. Wir wollen von den möglichen Ursachen dieser von uns jetzt angenommenen Verkürzung ganz absehen. Sie könnte ja vielleicht durch die Einwirkung eines den Raum erfüllenden Mediums, wie es der Äther etwa sein soll, eine Erklärung finden. In diesem Falle würden also z. B. alle Körper auf der Erde in Richtung ihrer Bewegung verkürzt werden. Die Verkürzung kann ja so gering sein, daß uns die Veränderung der Körper, wenn wir sie drehen, nicht auffällt; vielleicht könnte auch die entsprechende Veränderung unseres Auges den Erfolg haben, daß wir diese Verkürzung nicht unmittelbar wahrnehmen. Unserem Messen aber würde sie sich jedenfalls entziehen, denn jeder Maßstab würde ja, wenn ich mit ihm den zu untersuchenden Gegenstand einmal quer und einmal längs zur Erdbewegung liegend untersuchen wollte, ebenfalls mitverkürzt werden und uns daher dieselbe Länge für beide Fälle angeben. Und diesem Übelstand ist nicht abzuhelfen. Wir sehen hier also, daß bei der Festsetzung von Maßen gewisse Annahmen unumgänglich sind, deren Richtigkeit nicht so ohne weiteres geprüft werden kann. So nehmen wir also insbesondere von unseren Längenmaßstäben an, daß sie starre Körper sind, d. h. daß sie ihre Länge weder dadurch verändern, daß wir sie beim Messen nach und nach an verschiedene Orte bringen, noch dadurch, daß wir sie drehen, noch durch irgendeine andere Bewegung, die mit ihnen ausgeführt wird. Aber wie gesagt sind das *Annahmen*, insbesondere Annahmen, die sich im großen

und ganzen bei unseren Versuchen, physikalische Erfahrungen einheitlich zusammenzufassen, bewährt und uns gute Dienste geleistet haben. Keineswegs sind es unumstößliche Gewißheiten, Notwendigkeiten oder Selbstverständlichkeiten, die einer Prüfung durch die Erfahrung weder fähig noch bedürftig wären.

Ebenso sind gewisse Annahmen zu machen bei der Festlegung der Masseneinheit. Wir müssen dabei insbesondere voraussetzen, daß die Masse eines Körpers nicht von selbst mehr oder weniger wird, daß wir also einen Körper von bestimmter, unveränderlicher Masse aufheben oder immer wieder herstellen können, ebenso daß die Masse eines Körpers sich durch Bewegung nicht ändert, und sie soll auch von Temperatur und Luftdruck unabhängig sein. Da man alle diese Annahmen macht, kann man als aufhebbare Masseneinheit also einen beliebigen festen Körper wählen, der chemischen Einwirkungen möglichst wenig unterliegt. Man muß sich übrigens wohl hüten, die Masse eines Körpers mit seiner Materie zu verwechseln. Zwei Körper aus ganz verschiedenem Material können dieselbe Masse haben. Auch wäre es durchaus denkbar, daß sich die Masse eines Körpers änderte, ohne daß sich die Quantität des ihn bildenden Stoffes vermehrte oder verminderte. Daß dies nicht geschieht, ist eine Grundannahme — wenn man will: ein Grundsatz — der Physik, ausgesprochen im Satz von der Erhaltung der Masse, aber durchaus keine Selbstverständlichkeit. Das eigentümliche Kennzeichen der Masse ist ihr Widerstand gegen bewegende Kräfte, ihre Trägheit. Praktisch sind bekanntlich als Längenmaß das Meter, als Massenmaß das Kilogramm gewählt, und die Einheitskörper selbst werden in Paris im Archiv aufbewahrt.

Schwierigkeiten besonderer Art gibt es nun bei der Festlegung einer Zeiteinheit. Eine Zeiteinheit kann ja nicht als solche aufgehoben werden. Sie muß vielmehr so festgelegt werden, daß es jederzeit möglich ist, durch geeignete Apparate Zeiteinheitsabschnitte angeben zu lassen. Es wird also notwendig sein, den Apparat zu bestimmen, der die Zeiteinheit liefern soll. Wie kann aber ein solcher Apparat bestimmt werden, wie kann man sich vergewissern, d die Zeiten, die er gibt, alle gleich sind? Nehmen wir etwa e Pendel an. Wie kann bestimmt werden, ob seine Schläge gleich Zeitabschnitte markieren? Auf unser Taktgefühl können wir u doch nicht sicher genug verlassen, denn eine sehr allmähliche An-

rung des Taktes würden wir gewiß nicht bemerken. Vergleich mit einem anderen Zeitmesser ist auch nicht möglich, weil es sich ja um die allererste Festlegung von Zeitmessungen überhaupt handelt. Es bleibt also nichts übrig, als wieder eine Annahme zu machen, mit einer gewissen Willkür irgendeine periodische Bewegung, d. h. eine solche, die sich ständig in derselben Weise wiederholt, herauszugreifen und als zeitmessende Bewegung festzulegen. Als solche Bewegung, als Zeitmeßeinrichtung also, dient uns die Erddrehung. Wir nehmen somit an, daß sich die Erde „gleichmäßig" dreht. Den 86 400 Teil einer Umdrehung nehmen wir dann als Zeiteinheit unter der Bezeichnung Sekunde. Nun freilich ist diese Festsetzung nicht ganz willkürlich gewesen. Macht man nämlich diese Annahme, so gibt es noch eine ganze Anzahl periodischer Bewegungen, die dann ebenfalls gleichmäßig erfolgen. Insbesondere können dann, wie die Erfahrung zeigt, die Schläge eines Pendels als Zeitmaß genommen werden, und unsere Aussagen über Geschwindigkeitsgrößen und deren Zusammenhang mit anderen mechanischen Größen, die ja alle vom Zeitmaß abhängig sind, nehmen unter der Voraussetzung einer gleichmäßigen Erddrehung und damit also des Pendels als Zeitmeßinstrumentes den einfachsten Ausdruck an.[1]) Ein solches Zeitmeßinstrument geeigneter Form bezeichnen wir dann als Uhr und legen es unseren Zeitmessungen zugrunde.

II. Die Bewegung und das Koordinatensystem.

Wir haben soeben die Voraussetzungen untersucht, die es uns gestatten, Messungen vorzunehmen, und müssen uns jetzt der Frage zuwenden, welchen Einfluß auf physikalische Beobachtungen und Beschreibungen der Beobachter selbst hat oder besser der Standpunkt, den der Beobachter einnimmt. Denn von den persönlichen Eigenschaften des Beobachters, die natürlich auch seine Untersuchungen beeinflussen, sehen wir ab. Wir denken uns einen vollkommenen

[1]) ...ja, der eigentliche Weg der Festlegung ist sogar der umgekehrte. Aus ...durch unser Taktgefühl einigermaßen verbürgten Gleichmaß der Pendelge haben wir auf die gleichförmige Erddrehung geschlossen und diese ...t erst nachträglich zum Maß aller Zeit gemacht. Es hat also guten ...nd, wenn wir im folgenden das Pendel als Zeitmesser in die erste ...

Beobachter, der von allen menschlichen Schwächen frei ist, aber einen Standpunkt wie ein endliches Wesen soll er haben. Wir wollen ihm keine übermenschlichen Eigenschaften zuschreiben, sondern nur die menschlichen, aber diese in Vollkommenheit.

Relative oder absolute Bewegung.

Wir denken uns nun einen großen leeren Raum und in diesem Raum zwei Weltkörper. Auf jedem dieser Weltkörper soll sich ein Beobachter befinden. Wir unterscheiden sie als A und B. Außer diesen beiden Weltkörpern und ihren Beobachtern ist im ganzen Raume nichts wahrnehmbar. Es nehme nun A auf seinem Weltkörper einen festen Stand ein und beobachte den Weltkörper B. Wir nehmen an, er findet, daß der Weltkörper B seinen Augen nach der Seite zu entschwindet, daß er ihn aber fortwährend im Auge behält, wenn er sich an seinem Orte um seine eigene Achse dreht. Diese Erscheinung kann sich der Beobachter A auf recht verschiedene Weisen erklären. Die nächstliegende Annahme wird für ihn sein, daß sich der Körper B in Bewegung befindet. Denn sein eigener Zustand wird ihm wahrscheinlich als ein Ruhezustand erscheinen. Er wird also annehmen, daß der Körper B sich um seinen eigenen Weltkörper herumbewegt. Ist der Beobachter aber von etwas kritischer Gemütsart, so wird er sich vielleicht sagen, daß sich seine Beobachtungen auch dann ergeben müßten, wenn etwa sein eigener Weltkörper um seine Achse rotierte, der Körper B aber an seinem Orte bliebe. Und es wird ihm vielleicht auch noch eine dritte Möglichkeit in den Sinn kommen, daß nämlich sein eigener Weltkörper, ohne sich um seine Achse zu drehen, um den anderen Körper herum eine Kreisbahn beschreibt. Welche dieser drei Annahmen ist die richtige? so wird er vielleicht grübeln. Und wenn er auf diese Frage lange keine Antwort gefunden hat, so wird er doch sicherlich Trost finden in dem Gedanken, daß er wenigstens einen Leidensgefährten in seiner Trübsal hat, nämlich den Beobachter B. Versetzen wir uns doch einmal an dessen Stelle. Wir wollen uns denken, der Beobachter B, der auch einen festen Standpunkt auf seiner Welt eingenommen hat, der sehe nun den Weltkörper A immerfort in derselben Richtung vor sich, aber er sehe immer wieder und wieder andere Seiten seines Gegenübers, bis nach einer geraumen Zeit sich ihm der ursprüngliche Anblick wieder darbietet. Wie wird sich B das erklären? Selbstsicher, wie

er ist, wird er vermutlich zunächst auch glauben, daß *seine* Welt der *ruhende* Pol ist und daß „der andere" sich um sich selbst dreht, um ihm so das Schauspiel seiner verschiedenen Seiten zu bieten. Aber auch ihm kommt allmählich die kritische Besinnung. Könnte es nicht auch so sein, daß A stillsteht und er selbst sich so um A dreht, daß sein Weltkörper sich einmal um die eigene Achse dreht, während er A einmal umrundet. Ja, bliebe nicht schließlich auch noch denkbar, daß außer dieser seiner eigenen Bewegung auch A sich noch um sich selbst dreht?

Wie ist aus diesem Dilemma herauszufinden? Welches ist die wahre Ansicht, wie verhält sich die Sache in Wirklichkeit? So wird sich der Beobachter fragen, so haben sich die Menschen gefragt, die sich doch in einem ganz ähnlichen Fall befunden haben und befinden. Bewegen Sonne, Mond und Sterne sich in 24 Stunden einmal in rasendem Fluge um die Erde herum, oder dreht sich die Erde jeden Tag einmal um ihre Achse? Umkreisen Sonne und Planeten in teils ganz merkwürdigen Bahnen, die sich um ihre Achse drehende, aber im Raume still stehende Erde, oder führt die Erde außer ihrer Drehbewegung noch eine zweite fortschreitende Bewegung aus, indem sie die Sonne in einem Jahre in nahezu kreisförmiger Bahn umfliegt? Jahrtausende hindurch haben die Menschen der Erde einen festen Platz zugewiesen, sie als den Mittelpunkt der Welt betrachtet, um den sich die Gestirne drehen, Jahrhunderte erst wohnt der Gedanke unter den Menschen, daß die Erde mit vielen ihresgleichen in stetem Fluge sich um die Sonne bewege und mit dieser gemeinsam noch womöglich eine Reise durch das große Weltgebäude ausführe, deren Ziel wir vorläufig nicht ermessen können.

Wie ist dieser Umschwung des Denkens zustande gekommen? Die Astronomie war schon in alten Zeiten ein verhältnismäßig gut entwickelter Zweig der Wissenschaften, und die Gelehrten waren mit den Bahnen der Wandelsterne unter den festen wohl vertraut. Diese Bahnen waren aber von sonderbarer Form und entsprachen gar nicht dem Begriff der Vollkommenheit, den die Alten mit den himmlischen Dingen zu verbinden pflegten. Eine vollkommene Bewegung war ihnen eine Bewegung in einer Kreisbahn. Die Planeten wanderten aber auf wunderlichen Wegen am Himmel. Sie gingen vorwärts und wieder zurück, sie beschrieben merkwürdige Schleifen, und je genauer man sie beobachtete, desto verschnörkelter wurde die Bahn,

die man fand. Das Altertum und das ganze Mittelalter, soweit es der Astronomie zugetan war, behalf sich hier mit den „Epizykeln", den Kreisen auf den Kreisen.

Da trat mit einemmal eine Wendung ein, die dieses ganze System ebenso schön ausgeklügelter wie komplizierter Vorstellungen über den Haufen warf und durch eine einzige, ganz einfache Vorstellung ersetzte, freilich durch eine Vorstellung, die jener Zeit als Revolution erschien. Kopernikus lehrte, daß nicht die Sonne und die Gestirne sich um die Erde bewegen, sondern daß die Erde in einem Jahr die Sonne umkreise und außerdem in 24 Stunden sich einmal um ihre eigene Achse drehe.[1])

Welch ein Schritt vorwärts in der Entwicklung der menschlichen Gedankenwelt! Und doch wie wenig wurde der Schritt damals in seiner eigentlichen Bedeutung verstanden! Unter schweren Kämpfen brach sich die neue Anschauung Bahn, und als sie den Sieg errungen hatte, da erschien sie den Menschen als die neue Wahrheit. Kopernikus hatte recht, und Ptolemäus war nun abgetan. Die Erde bewegte sich, und die Sonne stand still. Die alte Lehre war falsch, die neue Wahrheit hatte sich die Welt erobert. So erschien es den meisten Menschen jener Zeit, so erscheint es auch heute noch vielen.

Welche Gründe aber konnten denn die Neuerer für ihre Ansichten vorbringen, mit welchen Argumenten war denn Ptolemäus und sein System zu widerlegen? Hatte man nicht auch vor den Zeiten des Kopernikus die Bewegungen der Gestirne berechnen können, konnte man nicht ihre Bahnen mit Hilfe der Epizykeln ganz gut beschreiben? Gewiß, das alles muß zugegeben werden. Es war durchaus kein Fehler im Ptolemäischen System enthalten, der die Menschen gezwungen hätte, dieses System zu verlassen. Und dennoch hatte die neue Vorstellungsweise einen großen und unleugbaren Vorteil, das war ihre große Einfachheit und Übersichtlichkeit. Die Planeten führten Kreisbahnen um die Sonne aus, und alle die vielen beobachteten Schleifen der Bahnen erklärten sich daraus, daß wir die anderen Planeten ja nicht vom Mittelpunkt ihrer Bahn und überhaupt

1) Allerdings ist auch im Altertum die Lehre von der Erdbewegung schon vertreten worden, aber sie blieb doch immer Meinung einzelner, wurde nicht Gemeingut der Gelehrten und ging jedenfalls während des Mittelalters wieder gründlich verloren. Andererseits behielt auch Kopernikus noch gewisse Epizykeln bei, die erst Kepler beseitigte.

nicht von einem festen Punkt aus beobachten, sondern von einem Gestirn aus, das sich selbst mit um den gemeinsamen Mittelpunkt bewegt.

Hat nun Kopernikus recht, und ist Ptolemäus widerlegt? Kopernikus hat zwar recht, aber Ptolemäus ist keineswegs widerlegt, hat durchaus nicht unrecht. Vielmehr müssen wir aus diesem Beispiel lernen, daß es möglich ist, *ein und dasselbe Geschehen auf verschiedene Weise zu beschreiben*, je nach dem Standpunkt, den man einnimmt. Freilich wird es zweckmäßig sein, unter einer großen Anzahl möglicher Beschreibungen sich stets diejenige herauszusuchen, die die einfachste ist, und das erreichen wir in diesem Fall, indem wir die Sonne als ruhenden Zentralkörper und die Erde als bewegt ansehen. Wenn wir das so tun, so müssen wir uns wohl hüten zu meinen, daß wir eine absolute Erkenntnis damit gewonnen hätten, daß wir wüßten, die Sonne ruhe wirklich und die Erde sei bewegt. Nichts anderes tun wir, als daß wir den Standpunkt unserer Betrachtung auf die Sonne verlegt denken und von ihr aus die Bahnen der Planeten beschreiben. Wir müssen uns klar machen, daß uns die *Beschreibung einer Bewegung überhaupt nur möglich ist, wenn wir einen bestimmten Standpunkt dabei zugrunde legen, auf den wir die Bewegung beziehen*. Welchen Standpunkt wir aber wählen wollen, das steht uns zunächst noch völlig frei. Das ist die *erste Relativitätseinsicht*, die wir gewinnen, die Einsicht, daß wir eine Bewegung immer nur in bezug auf einen bestimmten, und zwar physikalisch bestimmten, Standpunkt beschreiben können, nicht aber absolut etwa in bezug auf den leeren Raum.

Das Koordinatensystem.

Es ist nun zweckmäßig, uns mit einem Körper, den wir als Standpunkt für die Beschreibung irgendeiner Bewegung wählen, stets ein Koordinatensystem fest verbunden zu denken, d. h. drei aufeinander senkrechte gerade Linien, die wir als die X-, Y- und Z-Achse unterscheiden, oder wir brauchten uns im Grunde genommen für die Beschreibung von Bewegungen statt des Körpers und der Linien nur ein physikalisches Koordinatensystem zu denken, d. h. etwa drei aufeinander senkrecht stehende starre Stangen, die wir nebst ihren Verlängerungen als die Achsen betrachten. Drei solche Achsen legen drei aufeinander senkrechte „Hauptebenen" fest, und es kann dann jeder Punkt

im Raume durch seine Abstände (die nach entgegengesetzten Richtungen positiv und negativ zu rechnen sind) von den Hauptebenen gekennzeichnet werden. Wir werden also im folgenden statt von festen Standpunkten auf Weltkörpern häufig schlechtweg von Koordinatensystemen sprechen. Wir können also dann die Tat des Kopernikus kurz so beschreiben: Er dachte sich das Koordinatensystem, in bezug auf das er die Vorgänge am Himmel beschrieb, nicht mit der Erde, sondern mit der Sonne fest verbunden.

Koordinatentransformation.

Wir wollen uns nun zunächst einmal überlegen, was sich bei der Beschreibung einer Bewegung verändert, wenn wir ein Koordinatensystem durch ein neues ersetzen. Der Bequemlichkeit halber gehen wir vom räumlichen Koordinatensystem mit seinen drei Achsen zum ebenen Koordinatensystem mit nur zwei Achsen über. Wir denken uns die Linie PQ (Fig. 1) als Bahn eines Körpers und nehmen ferner an, daß ihm im Punkte P die Geschwindigkeit zukommt, die der Pfeil PQ der Größe und Richtung nach darstellt. Wir bezeichnen sie mit q. Wir wollen nun diese Bewegung von drei verschiedenen Koordinatensystemen aus beschreiben, die wir entsprechend der Art, wie die Achsen unterschieden sind, als die Systeme K, K' und K^*[1]) bezeichnen. Vergleichen wir zunächst die Beschreibung der Bewegung von den Systemen K und K' aus. In beiden Fällen wird die Bahn als eine gerade Linie erscheinen, die in beiden Fällen dieselbe Richtung gegen die Achsen hat. Der Körper wird nur zu verschiedenen Zeiten die X- und X'-Achse passieren und sie verschieden weit von den Anfangs-



Fig. 1.

1) Mit den Buchstaben K, K', K^* bezeichnen wir die Systeme selbst, diese Buchstaben können sich also in der Figur nicht finden. Die Achsen von K sind voll gezeichnet, die von K' punktiert und die von K^* lang gestrichelt. Die kurz gestrichelten Linien sind Hilfslinien.

punkten schneiden. Die Geschwindigkeit dagegen, die er in einem bestimmten Punkte hat, und deren beide Komponenten nach den Achsen werden in beiden Systemen völlig übereinstimmen. Vergleichen wir dagegen das System K^* mit K, so finden wir viel größere Abweichungen. Die Richtung der Bahn ist gegen die X^*-Achse weniger geneigt als gegen die X-Achse. Die Geschwindigkeit q zwar erscheint als dieselbe im neuen System wie im alten. Aber ihre Komponenten nach den Achsen sind nicht mehr die gleichen wie in K. Ersichtlich ist q_x^* größer als q_x und q_y^* kleiner als q_y.

Den Übergang von einem Koordinatensystem zu einem anderen nun nennt man eine Koordinatentransformation, und solche Größen, die sich bei einer derartigen Transformation nicht ändern, bezeichnet man als „Invarianten" der Transformation. Wir sehen also hier z. B., daß für die Transformation eines Koordinatensystems in ein anderes, das zu dem ersten eine feste Lage hat, die Geschwindigkeit eine Invariante ist, ihre Komponenten sind es aber im allgemeinen nicht.

Transformationsgleichungen.

Eine der wichtigsten Aufgaben bei Koordinatentransformationen ist es nun, Gleichungen aufzustellen, die die alten Koordinaten mit den neuen in Verbindung setzen, so daß, wenn man die Lage eines Punktes in einem System kennt, man sie mit Rücksicht auf das andere berechnen kann. Unsere Fig. 2 zeigt, wie das z. B. für zwei Systeme K und K' möglich ist, die einen gemeinsamen Anfangspunkt haben, von denen aber das eine gegen das andere um



Fig. 2.

Winkel α gedreht ist. Man entnimmt unmittelbar der Figur die Gleichungen:

$$x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$$

$$y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha$$

und sieht, daß die Koordinaten jedes Punktes im System K' mit Hilfe homogener[1]) linearer Gleichungen zu berechnen sind, wenn seine Koordinaten in K und der Winkel, den die Achsen von K mit denen von K' bilden, gegeben sind. Ganz analoge Gleichungen führen natürlich auch von K' nach K.[2]) Kennt man nun aber erst die Transformationsgleichungen für die Koordinaten, so findet man auch leicht diejenigen für die Überführung der Komponenten von Strecken und Vektoren[3]) aus einem System ins andere. Sie sind denen der Koordinaten ganz analog. Aus Fig. 3, in der der Pfeil PQ eine Geschwindigkeit im Punkt P darstellen möge und die Bezeichnungen wieder dieselben wie früher sind, entnimmt man direkt, daß



Fig. 3.

$$q'_x = q_x \cos\alpha + q_y \sin\alpha$$
$$q'_y = -q_x \sin\alpha + q_y \cos\alpha.$$

Bewegte Koordinatensysteme.

Bei den Transformationen, die wir bis jetzt vorgenommen haben, handelt es sich um den Übergang von einem System zu einem anderen, das zu dem ersten eine feste Lage hat. Wir können aber auch

1) Gleichungen heißen linear, wenn sie die Veränderlichen höchstens in der ersten Potenz und keine Produkte der Veränderlichen enthalten, d. h. wenn die einzelnen Glieder höchstens vom 1. Grade sind. Sie heißen homogen, wenn alle Glieder vom gleichen Grade sind.

2) Es ist dem solcher Überlegungen entwöhnten Leser zu empfehlen, diese Gleichungen mit Hilfe einer neuen Figur oder durch Rechnung abzuleiten. Sie lauten:

$$x = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha$$
$$y = x' \sin\alpha + y' \cos\alpha.$$

3) Das sind Größen, die eine Richtung haben, wie die Geschwindigkeit.

— und dieser Fall ist der interessantere und wichtigere — von einem System zu einem zweiten übergehen, das sich in bezug auf das erste in Bewegung befindet. Gerade das war ja die Leistung des Kopernikus, denn ein mit der Sonne fest verbundenes Koordinatensystem befindet sich nicht in Ruhe, in bezug auf ein solches, das mit der Erde fest verbunden ist, und umgekehrt. Hier sind die Übergänge von einem System zum anderen erheblich komplizierter. Man sieht ohne weiteres, daß z. B. ein Körper sich in bezug auf das eine System in Ruhe befinden kann, in bezug auf das andere aber bewegt ist. Die Erde etwa ruht natürlich, mit allem was auf ihr eine feste Lage hat, in ihrem eigenen Koordinatensystem, sie bewegt sich dagegen in bezug auf die Sonne. Denkt man sich ein Koordinatensystem, das zwar die Bewegung der Erde um die Sonne, aber nicht die tägliche Erddrehung mitmacht, so beschreibt der Mond in bezug auf dieses System annähernd eine Kreisbahn mit der Erde als Mittelpunkt, in bezug auf das Sonnensystem dagegen eine Epizykelbahn, die sich von einem Kreise um die Sonne als Mittelpunkt nur wenig unterscheidet.

Bewegt sich nun ein Körper in bezug auf das irdische System mit unveränderlicher Geschwindigkeit, also in gerader Linie, so ist seine Bahn von der Sonne aus betrachtet sicher keine gerade Linie, sondern krumm. Dieser Umstand ist nun von großer Wichtigkeit, denn er gibt uns einen Grund an die Hand, unter allen möglichen Koordinatensystemen eine große Anzahl auszuscheiden, deren Benutzung für physikalische Betrachtungen unzweckmäßig wäre. Nicht als ob es unmöglich wäre, der Physik ein beliebiges Koordinatensystem zugrunde zu legen. Aber genau so, wie die Einfachheit der Bahnen für Kopernikus einen ausschlaggebenden Grund lieferte, zum Sonnensystem überzugehen, genau so ist die Einfachheit der Formulierung physikalischer Gesetze ein Grund, bestimmte Koordinatensysteme zu bevorzugen.

Das Inertialsystem.

Eine physikalische Grundannahme von besonderer Einfachheit ist nun der Galilei-Newtonsche Trägheitssatz, der besagt, daß ohne Ursache kein Körper seinen Geschwindigkeitszustand ändert, und wir sehen sofort, daß dieser Satz nicht *sowohl* für das irdische System *als auch* für das Sonnensystem gelten kann.

Denn eine geradlinige und gleichförmige Bewegung im irdischen Koordinatensystem, die einzige, bei der sich der Geschwindigkeitszustand des Körpers nicht ändert, die also ohne Beschleunigung stattfindet, ist sicher nicht geradlinig in bezug auf die Sonne und umgekehrt. Es würde also ein Körper, auf den keine Kraft ausgeübt wird, in dem einen System sich geradlinig bewegen, im anderen dagegen nicht. Nun ist der Trägheitssatz von so grundlegender Bedeutung für die ganze Physik, daß es völlig verständlich ist, wenn man ihn zum Auswahlprinzip und Prüfstein von Koordinatensystemen macht.

Wir wollen ein solches Koordinatensystem, in dem der Trägheitssatz genau gültig ist, ein Inertialsystem (inertia, die Trägheit) oder auch ein Galileisches System nennen und einmal die verschiedenen naheliegenden Koordinatensysteme daraufhin ansehen, ob sie Inertialsysteme sind. Wie steht es zunächst mit dem irdischen System? Ist es ein Inertialsystem? Auf diese Frage kann uns nur der Versuch eine Antwort geben. Solch ein Versuch ist aber nicht ganz leicht anzustellen, denn wie soll man auf der Erde einen Körper der Einwirkung jeder Kraft entziehen? Das ist schlechterdings unmöglich. Man muß es also mit Vorgängen versuchen, bei denen die einwirkenden Kräfte sich gegenseitig möglichst aufheben, so daß im ganzen der Körper sich so bewegt, als ob keine Kraft auf ihn einwirkte, oder man muß versuchen, die durch genau bekannte Kräfte hervorgerufenen Geschwindigkeitsänderungen in Gedanken zu eliminieren, und zusehen, ob die so konstruierte Bewegung eine geradlinige und gleichförmige ist. In verschiedener Weise sind solche Versuche angestellt worden und haben ergeben, daß das irdische System kein Inertialsystem ist.[1]) Hier wird sich nun die Frage erheben, wie denn Galilei zur Aufstellung des Trägheitssatzes gekommen sein kann, wenn doch das Erdsystem gar kein Inertialsystem ist? Darauf ist zu antworten, daß für Vorgänge von kurzer Dauer das Erdsystem doch wenigstens annähernd mit einem Inertialsystem übereinstimmt. Wir werden darauf noch zurückkommen.

Wie steht es nun mit der Sonne? Ist das mit ihr fest ver-

1) Näheres darüber findet der Leser in W. Brunner, Dreht sich die Erd (Mathem.-Phys. Bibl. XVII.)

bundene Koordinatensystem genau ein Inertialsystem? Auch das müssen wir verneinen. Aber ein Koordinatensystem, daß *ziemlich angenähert* mit einem Inertialsystem übereinstimmt, erhalten wir doch, wenn wir die Sonne zum Anfangspunkt eines Systems machen, dessen Achsen wir durch die Richtungen nach bestimmten Fixsternen festlegen. Auch dieses, sagten wir, ist nur angenähert richtig, weil eben die Sonne und die Fixsterne sich, wenn auch sehr langsam, gegeneinander bewegen, und so werden wir wahrscheinlich fortgesetzt durch immer bessere Bestimmungen stets nur eine noch größere Annäherung an ein wirkliches Inertialsystem bewerkstelligen, ohne seine genaue Festlegung jemals zu erreichen.

Wir lassen nun aber einmal die Frage, wie ein Inertialsystem in der Praxis wirklich bestimmt werden kann, ganz beiseite. Wir wollen vielmehr einmal annehmen, es wäre uns gelungen, ein solches Inertialsystem richtig zu bestimmen, und uns nun die Frage stellen, *ob dieses das einzige solche System ist*, oder ob es noch ein oder mehrere andere außer ihm gibt. Was war doch ein Inertialsystem? Ein solches, in dem ein Körper, auf den keine Kraft ausgeübt wird, die Größe und Richtung seiner Geschwindigkeit unverändert beibehält. Nun haben wir aber gesehen, daß bei allen Koordinatentransformationen, die von einem System zu einem zweiten führen, das zu dem ersten eine feste Lage innehat, die Geschwindigkeit eine Invariante ist, d. h. ihrer Größe nach nicht geändert wird, und daß ferner eine geradlinige Bahn in dem einen Koordinatensystem auch als gerade Linie in dem anderen System erscheint. Wenn also ein Körper sich in bezug auf ein Koordinatensystem geradlinig gleichförmig bewegt, so bewegt er sich auch geradlinig gleichförmig in bezug auf jedes andere Koordinatensystem, das zu dem ersten eine feste Lage innehat. Das ist nun weiter nichts Wunderbares, ja das ist uns eigentlich so selbstverständlich, daß wir *diese unendlich vielen möglichen Inertialsysteme doch nur als eines behandeln*.

Wenn wir nun also unter *einem* Inertialsystem im weiteren Sinne ...ze Gruppe aller solchen Systeme verstehen, die zu *einem* Inertial- ...m im *engeren* Sinne eine feste Lage haben, so können wir nun ...er fragen: Gibt es nur dieses eine System, oder sind deren mehrere ...lich? Wir haben vorhin schon gesehen, daß wir jedenfalls solche ...nschließen haben werden, die gegen das erste sich in drehender

Bewegung befinden. Wir wollen jetzt die einfacheren Fälle untersuchen. Wir denken uns zwei Koordinatensysteme K und K', die zur Zeit $t = 0$ mit ihren Anfangspunkten und entsprechenden Achsen aufeinanderfallen mögen. K' soll sich nun aber, ohne sich dabei zu drehen, mit der gleichbleibenden Geschwindigkeit v in der Richtung der beiden X-Achsen bewegen. Wir wollen die Gleichungen suchen, die zwischen den Koordinaten des Systems K und denen des Systems K' bestehen, und wir wollen uns überlegen, wie die Bahn und Bewegung eines Körpers von dem einen und dem anderen System aus beurteilt erscheinen. Wir denken uns also einen Punkt P, der im Koordinatensystem K eine feste Lage hat, und bezeichnen seine Koordinaten in K mit x und y. Offenbar wird sich dann seine Lage in K' fortgesetzt ändern. Fig. 4 zeigt uns die beiden Systeme in einem bestimmten Augenblick, nämlich t Sekunden nach Beginn der Zählung, nach dem Zeitpunkt also, in dem sich die beiden Systeme gerade deckten. Offenbar hat das System K' inzwischen eine Strecke zurückgelegt, die gleich dem Produkt aus der Geschwindigkeit und der Zeit, d. h. der Zahl von Sekunden, ist, die es sich bis jetzt bewegt hat. Um dieses Stück vt nun sind die x-Koordinaten aller in K festen Punkte für K' verkürzt. Die y-Koordinaten dagegen — und, wenn wir ein räumliches System zugrunde legen, die z-Koordinaten — bleiben von dieser Bewegung ganz unbeeinflußt, so daß wir die folgenden Transformationsgleichungen erhalten:



Fig. 4.

$$(1)\qquad \begin{array}{l|l} x' = x - vt & x = x' + vt \\ y' = y & y = y' \\ z' = z & z = z'. \end{array}$$

Obwohl wir hier scheinbar einen Spezialfall behandeln, nämlich den der Bewegung des zweiten Systems in Richtung der X-Achse, umfaßt er doch für unsere Untersuchung den allerallgemeinsten Fall der Bewegung eines gleichförmig bewegten Koordinatensystems gegenüber

einem ruhenden. Denn würde sich K' auf einer beliebigen geraden Linie bewegen, so dürften wir ja sicher diese Gerade zur X-Achse eines neuen Koordinatensystems machen, das in K eine feste Lage hat und somit auch selbst ein Inertialsystem ist. Was für unseren Spezialfall gilt, muß also notwendig auch für den allgemeinen gelten. Ist unser spezielles K' ein Inertialsystem, wenn K eines ist, so ist jedes zu einem Inertialsystem geradlinig gleichförmig bewegte System ebenfalls ein Inertialsystem.

Um diese Frage näher zu untersuchen, betrachten wir nochmals unseren Punkt P. Er sollte in K ruhen. Dann bewegt er sich aber offenbar in K', und zwar mit der Geschwindigkeit v, und um die Richtung dieser Geschwindigkeit zu charakterisieren — er bewegt sich entgegen der Richtung der positiven X'-Achse — sagen wir, daß ihm die Geschwindigkeit $-v$ zukommt. Ein Punkt also, der in K ruht, hat in K' die Geschwindigkeit $-v$. Nun denken wir uns einen weiteren Punkt Q (der nicht in die Figur eingezeichnet ist), der sich in bezug auf K mit der Geschwindigkeit q in der Richtung der positiven X-Achse bewegen soll. Wie bewegt sich dieser Punkt von K' aus betrachtet? Es ist leicht zu sehen, daß ein Beobachter in K' ihm nur eine kleinere Geschwindigkeit zuschreiben würde, und zwar eine um so viel verminderte, als des Beobachters Eigengeschwindigkeit gegenüber K beträgt. Verstehen wir also unter q' die Geschwindigkeit des Punktes Q in K', so gilt ersichtlich die Beziehung:

$$(2) \qquad q' = q - v \quad \text{oder} \quad q = q' + v.$$

Nehmen wir nun schließlich an, ein Punkt R bewege sich in K in einer beliebigen Richtung, also etwa schräg gegen die beiden Achsen, so können wir seine Geschwindigkeit q nach dem bekannten Satz von dem Parallelogramm der Geschwindigkeiten in die beiden Komponentem q_x und q_y zerlegen. Von K' aus betrachtet wird dann die x-Komponente der Geschwindigkeit wieder um v vermindert erscheinen, während die y-Komponente durch eine Bewegung in Richtung der X-Achse natürlich gar nicht beeinflußt werden kann. Wir erhalten also als Transformationsgleichungen für die Geschwindigkeit von einem System zu einem zweiten, das in bezug auf das erste in Richtung der positiven X-Achse gleichförmig bewegt ist, wenn wir jetzt von der Ebene zum Raum übergehen, die drei Gleichungen:

$$(3)\qquad \begin{array}{l|l} q'_x = q_x - v & q_x = q'_x + v \\ q'_y = q_y & q_y = q'_y \\ q'_z = q_z & q_z = q'_z \end{array}\ ^{1}).$$

Sind nun q_x, q_y und q_z unveränderliche Größen, d. h. also, ist q der Richtung und Größe nach konstant, ist ferner v stets dasselbe, so sind auch die Komponenten von q' und mithin ist q' selbst unveränderlich. Hiermit haben wir nun einen sehr wichtigen Satz gewonnen: Ein Körper, der sich in einem Koordinatensystem mit einer beliebigen, aber unveränderlichen Geschwindigkeit in gerader Linie bewegt, bewegt sich in jedem anderen Koordinatensystem, das zu dem ersten geradlinig gleichförmig bewegt ist, zwar mit einer der Größe nach anderen Geschwindigkeit als im ersten System, aber doch auch wieder mit unveränderlicher Geschwindigkeit und geradlinig. Gilt also der Trägheitssatz für das eine System, so gilt er auch für jedes System, das sich zu ihm in geradlinig gleichförmiger Bewegung befindet. Ist also das erste System ein Inertialsystem, so ist es auch jedes der eben gekennzeichneten Systeme.

Wenige und leichte Überlegungen zeigen uns ferner, daß ein Körper, der in K eine beschleunigte Bewegung ausführt, sich auch in K' beschleunigt bewegt und daß die Größe seiner Beschleunigung in beiden Systemen dieselbe ist. Denken wir uns nämlich die Beschleunigung des Körpers in K, wie vorhin die Geschwindigkeit, in Komponenten zerlegt, so können die Beschleunigungskomponenten in Richtung der Y- und Z-Achse von der von uns angenommenen Bewegung längs der X-Achse überhaupt nicht betroffen werden. Aber auch die x-Komponente der Beschleunigung kann sich nicht ändern. In jedem Augenblick ist nach den Gleichungen (3) $q'_x = q_x - v$. Wächst also q_x in der Sekunde um einen bestimmten Betrag, so wächst, wie die Gleichung zeigt, q'_x um den nämlichen Betrag. Die Beschleunigung eines Körpers, die ja nichts anderes ist als der Geschwindigkeitszuwachs des Körpers in der Sekunde, wird also von allen solchen Systemen aus hinsichtlich ihrer Größe als gleich beurteilt, die sich nur in gleichförmiger Translationsbewegung gegeneinander befinden.[2])

1) Der mit der Differentialrechnung bekannte Leser leitet sich natürl. diese Formeln direkt aus den Gleichungen (1) S. 22 ab, indem er für $q_x = dx/d$ für $q'_x = dx'/dt$ usw. setzt.

2) Alle diese Dinge macht sich der der Mathematik fernerstehende Les

Wir könnten nun die gleiche Untersuchung anstellen für zwei Koordinatensysteme, die ungleichförmig gegeneinander bewegt sind. Denken wir uns auch hier den einfachsten Fall, daß nämlich K' gegen K sich in gleichförmig beschleunigter Bewegung in Richtung der positiven X-Achse befindet. Schon der erste Blick zeigt uns hier ganz andere Verhältnisse. Ein in K ruhender Körper würde nämlich offenbar in K' eine gleichförmig beschleunigte Bewegung in Richtung der negativen X-Achse aufweisen. Wirkt aber auf den Körper keine Kraft ein, d. h. ist K ein Inertialsystem, so erscheint dieser Körper in K' beschleunigt bewegt, obwohl keine Kraft ihm diese Beschleunigung erteilt, K' ist also kein Inertialsystem.

Fassen wir alles das, was wir jetzt abgeleitet haben, zusammen, so müssen wir feststellen: Wenn es ein Inertialsystem (im weiteren Sinn) gibt, so gibt es deren unendlich viele. Jedes andere System ist nämlich ebenfalls ein Inertialsystem, das sich zu dem ersten nur in einer gleichförmigen Translationsbewegung befindet.

Wir erkennen jetzt auch, woher es kommt, daß das irdische System annähernd ein Inertialsystem für hinreichend kurze Vorgänge ist. Die Erde führt zwei Bewegungen gegen dasjenige System, das wir uns mit Hilfe der Sonne und des Fixsternhimmels festgelegt denken, aus. Erstens bewegt sie sich im Kreise um die Sonne, und zweitens dreht sie sich um sich selbst. Denken wir uns nun einen Punkt am Äquator und untersuchen wir seine Bahn während einer halben Stunde. Er beschreibt den 48. Teil eines Kreises infolge der Erdrotation, die Erde dreht sich hierbei um $7^1/_2{}^0$. Der Leser mag selbst versuchen, in einen Kreis ein regelmäßiges 48-Eck einzuzeichnen und wird sich dabei gut davon überzeugen, daß man sehr angenähert auf einer so kurzen Strecke den Kreisbogen durch die Sehne ersetzen darf. Betrachten wir aber nun gar die Bewegung der Erde um die Sonne, so beträgt das in der halben Stunde zurückgelegte Wegstück wenig mehr als 1″ und darf also mit noch weit besserer Annäherung durch die Sehne ersetzt werden. Da nun die Rotationsgeschwindigkeit völlig und die Bahngeschwindigkeit an-

---

t an den in gleichförmiger Translationsbewegung zueinander befind-
ordinatensystemen der Erde und eines fahrenden Eisenbahnzuges
rend sie derjenige, der mit den Anfangsgründen der Differential-
bekannt ist, wieder leicht aus den Gleichungen (1) S. 22 entnimmt.
$b = d^2x/dt^2$ und $b' = d^2x'/dt^2$ setzt.

nähernd gleich bleibt, so darf man jede der beiden Bewegungen auf einem hinreichend kleinen Stück Weges als geradlinig gleichförmig behandeln. Sie addieren sich nach dem Parallelogramm der Geschwindigkeiten und geben eine Resultierende, für welche nun allerdings die Bahngeschwindigkeit gegenüber der Rotationsgeschwindigkeit ausschlaggebend ist. Denn in ihrer Bahn legt die Erde annähernd 30 km/sec zurück, bei der Rotation aber ein Punkt des Äquators nur 426 m/sec.

Welche Bedeutung hat es nun, daß es nicht nur ein, sondern mehrere, ja unendlich viele Inertialsysteme gibt? Der Trägheitssatz — der seit Galilei in der Wissenschaft festen Fuß gefaßt hat — ist auch das erste der drei grundlegenden Gesetze, die Newton für die Mechanik aufgestellt hat. Das zweite besagt, daß die Kraft nach Richtung und Größe der durch sie hervorgerufenen Beschleunigung proportional sei. Auch dieses Gesetz gilt in dem den oben erörterten Bedingungen genügenden System K', wenn es in K gilt, denn wir haben gesehen, daß die Beschleunigung in K' dieselbe ist wie in K, und von der Kraft wollen wir annehmen, daß sie in ihrer Größe von Koordinatentransformationen unberührt bleibt. Das dritte Newtonsche Gesetz, das Gesetz von der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung, schließlich besagt, daß, wenn ein Körper A auf einen Körper B eine Kraft ausübt, stets auch der Körper B auf den Körper A eine Kraft ausübt, die der ersten der Größe nach gleich, der Richtung nach entgegengesetzt ist. Dieses dritte Gesetz wird ersichtlich nach dem, was wir soeben über die Kräfte festgesetzt haben, von Koordinatentransformationen überhaupt nicht berührt. Wir können somit sagen, daß im System K', das gegen K geradlinig gleichförmig bewegt ist, die drei Newtonschen Gesetze gelten, wenn sie in K gelten.

Die drei Newtonschen Gesetze nun sind natürlich Erfahrungssätze. Sie sind aber eine so glückliche Zusammenfassung unserer gesamten mechanischen Erfahrungen, daß sie allein vollständig ausreichend sind, um alle Fragen der Mechanik zu beantworten, soweit wir diese überhaupt beantworten können. Alle anderen Sätze der Mechanik können aus diesen drei, deshalb Axiome genannten Gesetzen abgeleitet werden. Das besagt nun aber, daß nicht nur die drei Newtonschen Axiome, sondern alle mechanischen Gesetze in K' gelten, wenn sie in K gelten. Wir können diesen Gedanken auch so wenden: Denken wir uns auf einem in K und einem zweiten in K' ruhenden Weltkörper je einen

Beobachter. Beiden soll ein wohlausgestattetes physikalisches Laboratorium zur Verfügung stehen, das aber so eingerichtet ist, daß nur mechanische Versuche darin ausgeführt werden können, dann können die beiden Beobachter auf keine Weise entscheiden, welcher der beiden Weltkörper „wirklich" ruht und welcher bewegt ist. Denn der gegenseitige Anblick wird beiden nur zeigen, daß sie gegeneinander bewegt sind, was nichts über ihre „absolute" Bewegung aussagt, und die Gesetze der Mechanik werden sich auf dem einen Körper als ganz dieselben erweisen wie auf dem anderen.

Diese Einsicht, die da besagt, daß es unter allen gleichförmig geradlinig gegeneinander bewegten Koordinatensystemen keines gibt, das für die mechanisch-physikalische Betrachtung ausgezeichnet wäre, liefert uns das Relativitätsprinzip der Mechanik.

III. Der Bewegungszustand des Äthers. Aberration und Dopplerprinzip.

Das vorige Kapitel hat uns bis zu der Einsicht geführt, daß alle Körperbewegung physikalisch nur unter Angabe eines Bezugssystems beschrieben werden kann. In der Wahl des Bezugssystems sind wir zunächst völlig frei. Sollen die mechanischen Gesetze aber einen möglichst einfachen Ausdruck finden, so müssen wir ein Inertialsystem benutzen. Allein auch diese Einschränkung macht die Wahl des Koordinatensystems noch nicht zu einer eindeutigen. Es bleiben vielmehr noch unendlich viele Koordinatensysteme zur Auswahl, die alle der Anforderung genügen, daß in ihnen das Trägheitsgesetz erfüllt ist. Wir können also von einer absoluten Bewegung auch nicht einmal dann sprechen, wenn wir darunter die Bewegung in einem Inertialsystem verstehen, weil es eben nicht nur ein Inertialsystem gibt, sondern deren unendlich viele. Gibt es nun unter all den Inertialsystemen vielleicht eines, das eine besondere Auszeichnung verdient, das irgendeinen Vorzug in physikalischer Hinsicht aufweist?

Wir haben ja bis jetzt nur die Mechanik berücksichtigt, d. h. den Teil der Physik, der sich mit der Körperbewegung befaßt. Es gibt nun aber noch andere Arten der Bewegung, bei denen nicht Körper von einem Ort an den andern gebracht werden, sondern ein Vor-

gang oder Zustand sich in einem Medium ausbreitet. Solche Vorgänge sind etwa die Ausbreitung des Schalles, der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität. Es wird sich also fragen, ob vielleicht diese Vorgänge uns die Auswahl eines bestimmten Koordinatensystems nahelegen.

Ohne uns allzuweit auf die Begründung dieser Behauptung einzulassen, können wir doch von vornherein sagen, daß Schallausbreitung und Wärmeleitung hier nicht in Betracht kommen, denn das sind Vorgänge, die in Körpern und nur in Körpern vor sich gehen, die daher auch den Bewegungszustand des Körpers, in dem sie sich befinden, teilen.

Anders aber liegt der Fall für die Ausbreitung des Lichtes und der Elektrizität. Diese erfolgt nicht in Körpern, oder mindestens nicht nur in Körpern. Durchmißt doch das Licht den ungeheuren leeren Raum zwischen den Fixsternen, und die magnetischen Störungen auf der Erde hängen in deutlich beobachtbarer Weise mit Vorgängen auf der Sonne zusammen.

Der Äther.

Wie haben wir uns demnach die unbezweifelbare Ausbreitung des Lichtes im leeren Raume zu denken? Es fällt dem Menschengeiste offenbar schwer, sich einen Vorgang anders denn als eine Körperbewegung zu denken. Die Physik erfand sich also einen Träger der Lichtbewegung und nannte ihn den Äther. Die Annahme des Äthers ist nun aber eine der schwierigsten Hypothesen, die je in der Physik eingeführt worden sind. Diesen Äther nämlich muß man sich denken als den ganzen Raum erfüllend, als begabt mit einer nur schwindend kleinen Masse, denn er übt ja keinerlei merkbare Einwirkung auf die Bewegung der Planeten aus, als alle Körper durchdringen. Man machte also, wie gesagt, diese Annahme eines den Raum erfüllenden Mediums, des Trägers der Lichtbewegung, der elektrischen Strahlen und noch anderer ähnlicher Strahlenarten, die ja die gegenwärtige Physik als wesentlich gleichartige Vorgänge auffaßt — aber es ist bis auf den heutigen Tag nicht recht gelun trotz zahlreicher von den namhaftesten Forschern unternomme Versuche, sich eine bestimmte und genaue Vorstellung über d Wesen und die Beschaffenheit des Äthers zu bilden.

Eine der wichtigsten Fragen, die den Äther betreffen, ist die,

welchem Bewegungszustande er sich befindet, ob der Äther als Ganzes sich in einem bestimmten Bewegungszustande oder, wenn man will, im Ruhezustande befindet und die materiellen Körper sich durch ihn hindurchbewegen, oder ob der Äther an den Körperbewegungen mehr oder weniger teilnimmt, so etwa, daß der Äther in einem Körper, wie in einem Gefäß, mit fortgeführt werden würde und auch etwa die dem Körper nächstgelegenen Teile des Äthers durch ihn in Bewegung gesetzt werden, wie die Luft durch einen sich in ihr bewegenden Körper.

Es ist leicht zu sehen, daß diese Frage einen engen Zusammenhang mit der Frage nach der Relativität der Bewegung hat. Denn wenn der Äther als Ganzes ruht, und wenn er etwa in einem Inertialsystem ruht, so würde dieses doch zweifellos ein physikalisch bevorzugtes System sein, das Äthersystem würde das Grundsystem der Physik werden, und alle physikalischen Messungen und Bestimmungen würden auf dieses System Bezug nehmen. Man würde dann physikalisch von einer „absoluten" Bewegung sprechen können und damit eine Bewegung gegen dieses durch die Natur ausgezeichnete System des ruhenden Äthers meinen.

Eine Entscheidung dieser Frage ist natürlich nur von der Erfahrung zu erwarten, und unwillkürliche Erfahrungen so gut als absichtlich angestellte Versuche mußten das Ihrige dazu beitragen. Namentlich zwei in der Astronomie bedeutsame Erscheinungen spielen hier eine Rolle, die Aberration und die Verschiebung der Spektrallinien nach dem Dopplerschen Prinzip.

Die Aberration.

Die Erscheinung der Aberration besteht in folgendem. Der Astronom beobachtet, daß alle Fixsterne gegen den Himmelshintergrund, auf den wir sie zu beziehen pflegen, eine regelmäßige Jahresbewegung ausführen, und zwar beschreiben die Sterne in der Nähe des Pols der Ekliptik kleine Kreise, alle mit demselben Durchmesser, die tiefer stehenden Sterne Ellipsen, deren große Achse gleich dem Durchmesser jener ise ist, und die vollends in der Ebene der Ekliptik stehenden Sterne egen sich auf geraden Linien hin und her, und zwar so, daß die fernung ihrer Umkehrpunkte wieder gleich dem Durchmesser jener ise ist. Es liegt nahe, diese allen Fixsternen gemeinsame Bewegung t als eine wahre Bewegung der Gestirne, sondern als eine schein-

bare, durch den Standpunkt des Beobachters bedingte zu erklären. Und in der Tat läßt sich diese Erscheinung sehr plausibel erklären, wenn man die Annahme eines ruhenden, also von den Körpern nicht mitbewegten Äthers zugrunde legt. Man kann sich das zunächst an einem Bilde in der Anschauung klarmachen. Wir wollen uns einen ganz senkrecht fallenden Regen denken und einen Menschen, der in einem fahrenden Eisenbahnwagen sitzen möge, an dessen Decke ein kurzes, oben offenes Rohr angebracht ist. Der Wagen soll vorn und hinten offen sein, so daß die Luft ungehindert hindurchstreichen kann. Von den Regentropfen wollen wir annehmen, daß sie infolge der Reibung an der Luft nicht mehr beschleunigt, sondern gleichförmig mit der Geschwindigkeit c herunterfallen. Wie wird der Mann im Wagen die Tropfen fallen sehen? (Fig. 5.) Er wird sie schräg fallen sehen, und zwar um so schräger, je rascher er sich bewegt. Während nämlich der Tropfen, der oben durch die Decke des Wagens eben eingetreten ist, den Weg von der Decke bis zur Erde zurücklegt, bewegt sich der Eisenbahnwagen ein Stück vorwärts, so daß der Tropfen nicht senkrecht unter der Öffnung auf den Boden aufschlägt, sondern um ein Stück nach rückwärts verschoben, und es ist klar, daß die Wege, die der Tropfen und der Wagen in gleichen Zeiten zurückgelegt haben, sich verhalten wie ihre Geschwindigkeiten. Nun hat der vom Tropfen gegen die Erde zurückgelegte Weg die Länge AB, der vom Wagen in gleicher Zeit durchmessene Weg die Länge BC. Nennen wir den Winkel, um den die scheinbare Fallrichtung von der Senkrechten abweicht, φ, so ist ersichtlich $\operatorname{tg}\varphi = BC/AB$ oder, da sich diese Wege verhalten wie die Geschwindigkeiten, auch $\operatorname{tg}\varphi = v/c$, wenn wir unter v die Geschwindigkeit des Wagens und unter c die gleichförmig gedachte Fallgeschwindigkeit des Tropfens verstehen. Ganz entsprechende Verhältnisse liegen vor, wenn das Licht, das sich im Äther bewegt, auf die im Äther vorwärts eilende Erde trifft. Auch hier wird der Lichtstrahl dem Erdbewohner unter einem bestimmten Winkel gegen diejenige Lage schräg erscheinen, unter der er einem Beobachter erscheinen müßte, der diesen Strahl vom ruhenden Äther selbst aus beobachten könnte. Steht die Strahlrichtung zur Erdbahn senkrecht, so wird also der Astronom, der diesen Stern beobachtet, das Fernrohr etwas schräg stellen müssen,



Fig. 5.

wenn der Lichtstrahl gerade die Achse des Fernrohrs durchlaufen soll. Und wiederum wird der Winkel der Abweichung von der Senkrechten gegeben durch

$$\text{(4)} \qquad \operatorname{tg} \varphi = \frac{v}{c}$$

wenn jetzt unter c die Lichtgeschwindigkeit, unter v aber die Geschwindigkeit des Fernrohrs gegen den Äther, d. h. der Erde in ihrer Bahn verstanden wird. Da nun die Lichtgeschwindigkeit sehr groß ist gegen die Erdgeschwindigkeit, so ist dieser Winkel natürlich sehr klein. Er beträgt nach den neuesten Messungen 20,445″. Da die Erde sich aber annähernd in einer Kreisbahn bewegt, so wird die Abweichung des Lichtes von der Senkrechten in ständig veränderter Richtung erscheinen und der Stern wird im Laufe eines Jahres in der Tat einen Kreis am Firmament beschreiben.



Fig. 6.

Man kann übrigens diese ganze Betrachtung auch rechnerisch durch eine Koordinatentransformation behandeln. Denken wir uns einen Stern senkrecht über der Erdbahn, also im Ekliptikpol, und betrachten diejenige Ebene, die durch die Verbindungslinie Stern—Erde und die augenblickliche Richtung der Erdbewegung bestimmt ist. Wir denken uns in dieser Ebene ein im Äther ruhendes Koordinatensystem mit den Achsen X und Y (Fig. 6), so daß die Erdbewegung in der X-Achse verläuft und somit SE der Y-Achse parallel läuft. Der Stern S möge in diesem System die Koordinaten (a, b) haben. Bezeichnen wir wieder die Lichtgeschwindigkeit mit c und rechnen wir die Zeit t von dem Augenblick ab, in dem eine bestimmte Lichtwelle von dem Stern ausgeht, so bestimmen folgende beiden Gleichungen den jeweiligen Ort der Lichtwelle:

$$\text{(5)} \qquad \begin{aligned} x &= a \\ y &= b - ct, \end{aligned}$$

und die von dieser Lichtwelle durchmessene Bahn wird durch die von t

freie Gleichung

$$x = a \tag{6}$$

dargestellt, die eine zur Y-Achse im Abstande a parallele gerade Linie bezeichnet. Dieses Ergebnis war hier allerdings selbstverständlich, da wir die Gleichungen ja auf Grund dieser Annahme erst aufgestellt hatten. Wir wollen nun den Weg des Lichtstrahls von einem Koordinatensystem aus beurteilen, das sich zu dem ersten in Richtung der X-Achse mit der Geschwindigkeit v bewegt. Die für diesen Fall geltenden Transformationsgleichungen sind die Gleichungen (1) auf S. 22. Führen wir diese hier ein, so erhalten wir:

$$\begin{aligned} x' &= a - vt \\ y' &= b - ct. \end{aligned} \tag{7}$$

Eliminieren wir in bekannter Weise aus beiden Gleichungen das t, so erhalten wir nach leichter Umformung eine Gleichung zwischen den beiden Koordinaten x und y, die die Bahn des Lichtstrahls darstellt:

$$y' = \frac{c}{v}\left(x' - a + \frac{bv}{c}\right). \tag{8}$$

Das ist nun die Gleichung einer geraden Linie, deren Richtungstangens c/v der reziproke Wert des vorhin für den Tangens der Abweichung vom Lot gefundenen Ausdrucks ist. Da der Richtungswinkel das Komplement des Abweichungswinkels ist, so steht dieses Ergebnis in voller Übereinstimmung mit dem früher aus der Anschauung abgeleiteten. Auch daß der Schnittpunkt mit der X'-Achse jetzt ein anderer, nämlich $a - bv/c$, ist, steht ja mit der Anschauung, die wir uns an dem fahrenden Eisenbahnwagen gebildet haben, in bestem Einklang. Diese ganze Erklärung setzt aber voraus, daß der Äther in Ruhe bleibt und von der Erde bei ihrem Fluge um die Sonne nicht mitgenommen wird. Genau so wie die Angabe über die Abweichung der Regentropfen nur für einen offenen, die Luft nicht mitführenden Wagen gilt; in einem geschlossenen würden die Tropfen stets etwas durch die Luft mitgerissen werden.

Der Dopplereffekt.

Unter derselben Voraussetzung läßt sich auch der aus der Akustik wohlbekannte Dopplereffekt auf die optischen Erscheinungen übertragen und dient hier zur Erklärung der Verschiebung der Spektrallinien der Sterne. Wir wollen uns die Erscheinung zunächst akustisch klarmachen. Wir denken uns in unmittelbarer Nähe eines Eisen

bahngleises eine Fabrik, die mit einer Dampfpfeife lautschallende Signale abzugeben vermag. Der Schall dieser Signale breitet sich wellenartig durch die Luft aus. Es ist ja nun bekannt, daß die Tonhöhe eines Tones von der Schwingungszahl abhängt, d. h. von der Anzahl Verdichtungen und Verdünnungen, die in der Sekunde das Ohr eines Beobachters treffen. Nun denken wir uns zwei Beobachter, einen, der an seinem Orte fest sitzen bleibt, und einen, der auf einem offenen Eisenbahnwagen sitzend sich der pfeifenden Fabrik in rascher Fahrt nähert. Es ist offenbar, daß das Ohr des fahrenden Beobachters von mehr Schallwellen in derselben Zeit getroffen wird als das Ohr des ruhenden Beobachters, denn er fährt ja den Wellen entgegen, nimmt also nicht nur die wahr, die auch bis zu dem ruhenden Beobachter hin gelangen, sondern außerdem noch alle die, die in dieser Zeit nur bis zum Endpunkt seiner Fahrt gelangt sind. Da aber nun in jeder Sekunde sein Ohr mehr Schwingungen treffen als das Ohr des ruhenden Beobachters, so wird ihm der Ton höher erscheinen, und zwar um so höher, je rascher er sich der Schallquelle annähert. Ist er aber erst an der Fabrik vorbeigefahren, so wird nun das Umgekehrte in Erscheinung treten. Er entfernt sich von der Schallquelle, entflieht also gewissermaßen den ihm nacheilenden Wellen, und sein Ohr wird nun von weniger Schwingungen getroffen als das des ruhenden Beobachters; der Ton wird ihm mithin tiefer klingen.

Eine ganz entsprechende Erscheinung können wir uns nun auf optischem Gebiet denken. Stellen wir uns eine im Äther ruhende Lichtquelle vor. Sie entsende Lichtwellen einer ganz bestimmten Schwingungszahl. Diese Schwingungszahl ist bekanntlich maßgebend für die Farbe des ausgesandten Lichtes. Denken wir uns nun einen Beobachter, der sich durch den Äther hindurch auf die Lichtquelle zubewegt, so werden ihm hier genau wie bei dem akustischen Fall mehr Schwingungen in der Sekunde begegnen, als an einem im Äther ruhenden Beobachter vorbeieilen. Er wird also eine andere Farbe wahrnehmen als dieser. Nun haben wir ein physikalisches Mittel, eine solche Farbenveränderung festzustellen. Man kann bekanntlich das weiße Licht, das uns z. B. von der Sonne oder den Sternen zugestrahlt wird, durch ein Prisma in seine farbigen Bestandteile zerlegen, und zwar ordnen sich die einzelnen Farben in einer ganz bestimmten Weise nebeneinander an, und man nennt

dieses farbige Nebeneinander das Spektrum. Nun treten in den Spektren zwischen den Farben dunkle Linien auf, und man weiß genau, welche Schwingungszahl dem Licht zukommt, das durch sie gerade ausgelöscht wird, an welcher Stelle einer Skala sie also erscheinen müßten. Erscheinen diese Linien und ihre farbige Umgebung nun an einer anderen als der ihnen zukommenden Stelle der Skala, erscheinen sie also gewissermaßen in einer anderen Farbe, so können wir uns diesen Umstand mit der Annahme erklären, daß die Schwingungszahl, die wir dem Licht der Streifen auf Grund ihrer Lage auf der Skala zuschreiben müssen, nicht dieselbe ist, die ihnen im Äther zukommt, die also ein im Äther ruhender Beobachter wahrnehmen würde. Wir nehmen daher an, daß wir uns auf die betrachtete Lichtquelle, einen Stern etwa, zubewegen, wenn die von uns beobachtete Schwingungszahl größer ist als die normale, und daß wir uns von ihm entfernen, wenn sie geringer ist.

Auch dieser Vorgang kann mathematisch mit Hilfe einer Koordinatentransformation behandelt werden.[1]) Wir denken uns eine Strahlenquelle im Äther ruhend und legen das Koordinatensystem K so, daß die Strahlenquelle im Nullpunkt ruht. Wir betrachten lediglich den Wellenzug, der sich entlang der X-Achse bewegt. Verstehen wir dann unter a die Amplitude der Schwingungen, unter n die Schwingungszahl und unter c die Lichtgeschwindigkeit im Äther, so ist

$$y = a \sin\left[2\pi n\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]; \tag{9}$$

die Gleichung des Bewegungszustandes längs der Strahlbahn y gibt hier als Funktion von t und x an, welchen Abstand irgendein Teilchen von seiner Ruhelage in der X-Achse zur Zeit t hat, wenn eine Sinusschwingung über die X-Achse hinwegläuft. Die Bewegung des Nullteilchens wird nämlich durch die Gleichung $y = a \sin 2\pi n t$ wiedergegeben, und jedes andere Teilchen der X-Achse wird sich um so viel später in dem gleichen Abstand von seiner Ruhelage befinden wie das Nullteilchen, als das Licht Zeit gebraucht, um bis zu ihm hinzugelangen, und das ist gerade x/c. Wir können nun ein neues Koordinatensyst K' einführen, das wieder längs der X-Achse gegen K gleichförmi mit der Geschwindigkeit v bewegt ist, und die Strahlgleichung mit K

1) Der mathematisch wenig geschulte Leser mag diese Ausführung ü springen.

der Transformationsgleichungen (1) auf S. 22 für dieses neue System umformen. Wir erhalten dann die Gleichung:

$$y' = a \sin 2\pi n \left(t - \frac{x' + vt}{c} \right), \tag{10}$$

die wir so umformen, daß sie formal der Gleichung (9) entspricht:

$$y' = a \sin 2\pi n \left(t \frac{c - v}{c} - \frac{x'}{c} \right)$$

$$y' = a \sin 2\pi n \frac{c - v}{c} \left(t - \frac{x'}{c - v} \right)^{1}) \tag{11}$$

$$y' = a \sin 2\pi n' \left(t - \frac{x'}{c'} \right).$$

In dieser mit (9) übereinstimmenden Form läßt uns die Gleichung erkennen, daß die Schwingungszahl im neuen System

$$n' = n \frac{c - v}{c} \tag{12}$$

und die Lichtgeschwindigkeit im neuen System

$$c' = c - v \tag{13}$$

ist. Haben c und v gleiche Richtung und ist $v < c$, so ist $n' < n$. Das entspricht dem Fall, daß sich der Beobachter von der Strahlenquelle entfernt. Haben dagegen c und v entgegengesetztes Vorzeichen, so bedeutet das eine Annäherung des Beobachters an die Lichtquelle, und n' ist größer als n, beides in Übereinstimmung mit unseren Überlegungen. Auch die dem bewegten Beobachter vergrößert oder verkleinert erscheinende Lichtgeschwindigkeit c' fügt sich dem ganzen Gedankengange ein. Allerdings unterliegt sie bei diesen Erscheinungen nicht der Beobachtung, sie tritt nur in der Formel auf, die bei der Erklärung der veränderten Schwingungszahl eine Rolle spielt.

Diese beiden Erscheinungen, die Aberration und der Dopplereffekt, ären sich also, wie man sieht, sehr einfach, wenn man die Anne eines unbeweglichen, von den Körpern nicht mitgeführten Äthers unde legt.

---

1) Wir setzen $n(c - v)/c = n'$ und $c - v = c'$.

IV. Die beiden Grundversuche.

Es liegt nun nahe, um die Frage nach dem Bewegungszustande des Äthers zur Entscheidung zu bringen, Versuche anzustellen, bei denen man direkt die Geschwindigkeit des Lichtes in einem bewegten Medium mit der im ruhenden Medium vergleichen kann. Und solchen Versuchen hat man sich in der Tat auch zugewandt. Nun ist aber die Lichtgeschwindigkeit in körperlichen Medien von derjenigen im freien Äther verschieden. Die Zahl, die angibt, der wievielte Teil die Lichtgeschwindigkeit im Medium von der Lichtgeschwindigkeit im Äther ist, heißt Brechungsquotient. Es ist also $c_n = c/n$, wenn man unter c_n die Geschwindigkeit des Lichtes im Medium vom Brechungskoeffizienten n versteht. Wenn sich das Medium nun während des Lichtdurchganges bewegt, so steht folgendes zu erwarten. Entweder addiert sich die Körpergeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit, das würde für einen mitgeführten Äther sprechen, oder die Lichtgeschwindigkeit bleibt durch die Körperbewegung unberührt, das würde die Annahme des ruhenden Äthers nahelegen. D. h. wir müssen entweder

$$c_n' = c_n \quad \text{erwarten oder aber} \quad c_n' = c_n + v,$$

wenn c_n' die Lichtgeschwindigkeit im bewegten Medium und v die Körpergeschwindigkeit darstellt.

Der Fizeauversuch.

Der experimentellen Entscheidung dieser Frage ist ein Versuch von Fizeau gewidmet. Dieser Versuch war äußerst schwierig, denn das hierbei festzustellende Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im ruhenden und bewegten Medium ist entweder 1 oder $1 + v/c_n = 1 + n \cdot v/c$, und es kommt auf die Messung einer Größe an, die von v/c abhängt. Dieser Quotient hat wegen der enormen Größe der Lichtgeschwindigkeit gegenüber allen irdischen Geschwindigkeiten einen sehr kleinen Wert. Für Messungen von so außerordentlicher Genauigkeit, wie sie also hier erforderlich sind, steht uns nun eine sehr feine Methode zur Verfügung, die Interferenzmethode, deren Wesen kurz in folgendem besteht. Läßt man zwei Lichtstrahlen, die von ein und derselben Lichtquelle ausgehen, mit Hilfe eingeschalteter optischer Instrumente zwei verschiedene und verschieden lange Wege zurücklegen und vereinigt

beide Strahlen hernach wieder, so können die Strahlen sich in ihrer Bewegung gegenseitig unterstützen oder hemmen, je nachdem ob Wellenberge und Wellentäler beider Lichtstrahlen aufeinanderfallen oder ob ein Wellenberg des einen Strahls auf ein Wellental des anderen fällt. In diesem Falle heben sich die beiden Strahlen gegenseitig auf, und es wird an solcher Stelle kein Licht erscheinen. Dieser Fall tritt nun immer dann ein, wenn sich die von den Strahlen zurückgelegten Wege um $^1/_2$ Wellenlänge, $3 \cdot {}^1/_2$ Wellenlänge oder irgendein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge unterscheiden. Nun ist aber die Länge der Lichtwellen außerordentlich klein, sie schwankt etwa zwischen $^1/_3$ und $^2/_3$ Mikron (tausendstel Millimeter). Sehr geringe Änderungen des einen der beiden Wege bei unverändertem Wege des anderen Strahles rufen also hier schon Änderungen in der Verteilung von Licht und Dunkelheit hervor und können beobachtet werden. Die beiden Lichtstrahlen, von denen wir sprachen, sind ja natürlich keine mathematischen Strahlen, sondern haben eine gewisse Dicke, und wenn man diese Strahlen z. B. von zwei Seiten kommend schräg auf eine Platte fallen läßt, so ist der Gangunterschied der beiden Strahlenbüschel nicht an allen Stellen der Platte, an denen sie sich überdecken, gleich, und es entsteht somit ein System von abwechselnd hellen und dunklen Streifen, in dem nun eine wenn auch sehr kleine Änderung des einen Strahlenweges eine deutlich beobachtbare Änderung hervorruft. Mit Hilfe einer solchen Interferenzmethode führte Fizeau seinen wichtigen Versuch aus.

Fig. 7 gibt eine schematische Zeichnung der Versuchsanordnung. P sei eine punktförmige Lichtquelle. Das von ihr ausgehende Licht wird durch die eingeschaltete Linse parallel gemacht, und durch die Blende Bl gehen nun zwei parallele Strahlen hindurch. Diese durchlaufen ein mit Wasser gefülltes Gefäß $ABCD$, dessen Vorder- und Rückwand aus Glas besteht. Sie fallen dann auf die Linse L', die die beiden Strahlen in der Ebene E zur Deckung bringt. In der Ebene E wird sich ein ganz bestimmtes System heller und dunkler Streifen als Interferenz-



Fig. 7.

bild ergeben. Wir lassen nun das Wasser im Troge in der durch die Pfeile angedeuteten Weise strömen, dann ist nach unseren Überlegungen zu erwarten, daß entweder die Lichtbewegung von der Wasserbewegung ganz unbeeinflußt bleibt, also das Interferenzbild keine Änderungen zeigt, oder aber daß auf der Strecke AB sich die Strömungsgeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit addiert, auf der Strecke DC dagegen die Lichtgeschwindigkeit um die Wassergeschwindigkeit vermindert wird. Hierdurch werden die beiden Strahlen einen Gangunterschied erhalten, und das Interferenzbild muß entsprechende Änderungen zeigen. Der mit großer Sorgfalt angestellte Versuch ergab nun aber keines der beiden von uns angenommenen Resultate. Es zeigte sich vielmehr, daß die Lichtgeschwindigkeit zwar von der Strömungsgeschwindigkeit beeinflußt wurde, daß sich aber diese Körpergeschwindigkeit nicht voll zur Lichtgeschwindigkeit im ruhenden Medium hinzuaddierte, sondern versehen mit einem vom Brechungsquotienten abhängigen Faktor. Es ergab sich:

$$c_n' = c_n + v\left(1 - \frac{1}{n^2}\right), \tag{14}$$

ein Resultat, das übrigens auf Grund anderer Erfahrungen schon von Fresnel 30 Jahre früher vorhergesagt worden war. Nach ihm heißt der Koeffizient von v der Fresnelsche Mitführungskoeffizient, Mitführungskoeffizient deshalb, weil man sich nun vorstellte, daß der Äther von den Körpern doch zum Teil mitgeführt werde. Das Maß der Mitführung hängt also vom Brechungsquotienten ab, und für den Brechungsquotienten 1 wird der Faktor von v zu Null. In einem solchen Medium also bleibt der Lichtstrahl von der Bewegung des Mediums unbeeinflußt. Nun kann man allerdings sagen, daß diese theoretischen Annahmen des z. T. mitgeführten Äthers ziemlich unbefriedigend sind, und so bedeutete es einen erheblichen Schritt vorwärts, als Lorentz zeigen konnte, daß der Fizeausche Versuch sich gerade dann erklären läßt, wenn man die Annahme eines auch in seinen einzelnen Teilen absolut ruhenden Äthers mit neueren, namentlich von Lorentz selbst ausgehenden Hypothesen über die Konstitution der Materie verbindet. Es ist unmöglich, auf di Fragen hier ausführlich einzugehen, weil dazu erhebliche mathemati und physikalische Vorkenntnisse erfordert werden. Wir können aber a von dieser neueren befriedigenderen Erklärung ganz absehen. F unsere Zwecke wird es genügen, sich an das eine Ergebnis des Fize

versuches zu halten, daß der Äther jedenfalls von einem Medium mit dem Brechungsquotienten 1 nicht mitgeführt wird. Es haben nämlich die Gase und insbesondere die Luft einen Brechungsquotienten, der sehr nahe bei 1 liegt. Für atmosphärische Luft ist beispielsweise der Brechungsquotient für das gelbe Licht eine Natriumflamme 1,000294. Der Mitführungskoeffizient der Luft ist also sehr nahe Null, *von bewegter Luft wird also der Äther so gut wie gar nicht mitgeführt. Das ist jedenfalls das bestimmte Ergebnis des Fizeauversuches.*

Der Michelsonversuch.

Die Hauptschwierigkeit beim Fizeauversuch liegt, wie schon früher gesagt, in der Kleinheit aller Geschwindigkeiten gegenüber der Lichtgeschwindigkeit. Es war ein naheliegender Gedanke, an Stelle der künstlich hervorgerufenen Geschwindigkeiten die sehr viel größere Geschwindigkeit einzuführen, die der Erde bei ihrer Fahrt um die Sonne zukommt. Das ist eine Geschwindigkeit von 30 km in der Sekunde, immer noch sehr klein gegen die Lichtgeschwindigkeit, aber doch schon sehr groß gegen die uns sonst zur Verfügung stehenden Geschwindigkeiten. War doch z. B. die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers beim Fizeauversuch nur 7 m in der Sekunde. Ja, man kann die Aufgabe geradezu in folgende Form kleiden. Nach dem Fizeauversuch wird der Äther nicht von der Erde oder mindestens nicht von der Erdatmosphäre mitgeführt. Der ruhende Äther bildet also ein besonders berücksichtigenswertes physikalisches System. *Es soll der Geschwindigkeitszustand der Erde gegenüber diesem ausgezeichneten System, dem Äther, bestimmt werden.* Denn zeigt uns der Fizeauversuch, daß die Atmosphäre den Äther *nicht* mitführt, so muß ein Lichtstrahl, der die Richtung der Erdbewegung hat, für einen auf der Erde stehenden Beobachter verzögert erscheinen, und wenn man ihn mit einem Strahl vergleicht, der sich senkrecht zur Erdbewegung fortpflanzt, so muß sich diese Verzögerung auch erkennen lassen.

Ein solcher Versuch ist von Michelson (sprich Meikelßn) unternommen
den. Wir wollen uns, allerdings auch nur in den Hauptzügen und
matisch, die Theorie dieses Versuches klarmachen. Wir sehen zu-
hst von der wirklichen Versuchsanordnung völlig ab und machen
folgende Vorstellungen. In Fig. 8 sei L eine Lichtquelle, die be-

fähigt ist, einen momentanen Lichtblitz zu geben. S_1 und S_2 seien zwei Spiegel, die mit L fest und starr verbunden sind und beide von L genau gleichen Abstand haben. Denken wir uns den ganzen Apparat im Äther ruhend und lassen von L einen Lichtblitz ausgehen, so wird der Lichtblitz von den beiden Spiegeln zurückgeworfen, und zur genau gleichen Zeit werden die beiden reflektierten Lichtstrahlen in L wieder eintreffen. Nunmehr wollen wir uns vorstellen, der ganze Apparat sei in der Richtung der Linie LS_1 gegen den Äther mit der Geschwindigkeit v bewegt. Nach welchen Zeiten werden dann die Strahlen wieder in L ankommen? Eine leichte Rechnung gibt uns Antwort auf diese Frage. Nennen wir t_1 die Zeit, die der Lichtstrahl gebraucht, um bis zu dem Spiegel S_1 zu gelangen, so ist der Weg, den er in dieser Zeit zurücklegt, ct_1. In dieser Zeit muß er nun aber nicht nur die Strecke LS_1, wir nennen ihre Länge a, sondern auch das Stück zurücklegen, um welches sich der Apparat inzwischen vorwärts bewegt hat, das ist ein Stück von der Länge vt_1. Es ergibt sich also die Gleichung $ct_1 = a + vt_1$,



Fig. 8.

und daraus finden wir: $t_1 = \frac{a}{c-v}$.

Durch ganz entsprechende Überlegungen finden wir als Zeit des Rückweges bis L: $t_2 = \frac{a}{c+v}$.

Die Gesamtzeit des Weges beträgt also:

$$T_1 = t_1 + t_2 = \frac{2ac}{c^2 - v^2}. \tag{15}$$

Betrachten wir nun den Lichtstrahl, der von L ausgeht zum Spiegel S_2 und von da zurück zu L in seiner inzwischen veränderten Lage gelangt, so bilden der Hin- und Rückweg dieses Strahles, im ruhenden Äther abgezeichnet, die beiden Schenkel eines gleichschenkligen Dreiecks. Nennen wir nun T_2 die Zeit des Hin- und Rückweges dieses Strahles, so findet man leicht aus dem rechtwinkligen Dreieck, dessen Hypotenuse der Lichtweg, dessen eine Kathete der gleichzeitige Weg des Punktes L und dessen zweite Kathete die Strecke a ist, die Gleichung:

$$c^2\left(\frac{T_2}{2}\right)^2 - v^2\left(\frac{T_2}{2}\right)^2 = a^2,$$

und daraus ergibt sich sofort:

$$T_2 = \frac{2a}{\sqrt{c^2 - v^2}}. \tag{16}$$

T_1 und T_2 sind, wie man sieht, einander nicht gleich. Der in der Bewegungsrichtung des Apparates laufende Strahl braucht für den Hin- und Rückweg länger als der quer laufende. Handelt es sich um einen Lichtblitz, so werden die reflektierten Strahlen nacheinander an der Ursprungsstelle L wieder eintreffen. Sendet aber L dauernd Licht aus, so werden die beiden Strahlen gegeneinander einen Gangunterschied aufweisen müssen, da sie verschieden lange Wege im Äther zurückgelegt haben, und es werden am Treffpunkt sich wieder bestimmte Interferenzerscheinungen ergeben, von denen wir gleich noch näher zu sprechen haben werden. Wir wollen uns zunächst fragen, wie groß denn eigentlich der Zeitunterschied für die Wege beider Strahlen ist. Es ergibt sich:

$$T_1 - T_2 = \frac{2ac}{v^2 - v^2} - \frac{2a}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2\frac{a}{c}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{2\frac{a}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Setzen wir zur Abkürzung $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = k$, so erhalten wir:

$$T_1 - T_2 = \frac{2a}{c}\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k}\right).$$

Wir entwickeln die beiden Brüche nach dem binomischen Lehrsatz:

$$\frac{1}{k} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right) + \frac{3}{8}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)^2 + \cdots$$

$$\frac{1}{k^2} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} = 1 + \left(\frac{v^2}{c^2}\right) + \left(\frac{v^2}{c^2}\right)^2.$$

Da nun schon v/c eine sehr kleine Größe ist, so ist es v^2/c^2 erst recht, und wir dürfen somit in diesen beiden Reihen alle Glieder von der zweiten oder einer höheren Potenz von v^2/c^2 vernachlässigen und erhalten somit:

$$T_1 - T_2 = \frac{a}{c}\frac{v^2}{c^2}$$

für den Zeitunterschied und daraus durch Multiplikation mit der Lichtgeschwindigkeit für den Wegunterschied:

$$a\frac{v^2}{c^2}.$$

Die praktische Ausführung des Versuches schließt sich nun auf das engste an unsere theoretischen Betrachtungen an. Im wesentlichen besteht der Apparat, den Michelson benutzte, aus zwei zueinander rechtwinkligen gleichlangen festen Armen, an deren beiden Enden sich die Spiegel befinden (Fig. 9). An der Kreuzungsstelle der beiden Arme befindet sich unter 45° gegen beide geneigt eine Glasplatte, die die von einer Lichtquelle herstammenden Strahlen zum Teil hindurchläßt und zum Teil reflektiert. So entstehen die beiden von ein und derselben Lichtquelle herstammenden zueinander senkrechten Strahlen. Nach ihrer Rückkehr von den Spiegeln gelangen die beiden Strahlen wieder an die Glasplatte, und wieder wird von jedem Strahl ein Teil hindurchgelassen und ein Teil reflektiert, und so gelangt von beiden Strahlen ein Teil in das Fernrohr F, in dem nun die Interferenzstreifen beider Strahlen beobachtet werden können. Der ganze Apparat ist nun drehbar eingerichtet, so daß man einmal dem Arm GS_1 und ein andermal den Arm GS_2 in die Richtung der Erdbewegung drehen kann. Nach unserer soeben angestellten Betrachtung muß dann abwechselnd der eine und der andere Weg der kürzere sein, und somit bei der Drehung eine Änderung des Interferenzbildes der beiden Strahlen beobachtbar werden.



Fig. 9.

Die größte Schwierigkeit, die hierbei zu überwinden war, lag wiederum in der ungewöhnlichen Kleinheit des zu beobachtenden Effektes. Spielte beim Fizeauversuch der Quotient v/c eine Rolle, so handelt es sich hier um einen zu beobachtenden Effekt von der Größenordnung v^2/c^2, welcher Bruch selbst bei den 30 km Erdgeschwindigkeit nur die Größe 0,000000 01 hat. Es bedurfte eines sehr großen experimentellen Geschickes, um den Kampf mit der Kleinigkeit dieser Zahl erfolgreich durzuführen. Es mußten eben die Wege GS_1 und GS_2 sehr lang gem werden und der Weg des Strahls noch dadurch vergrößert werden, l man ihn mehrmals hin und her laufen ließ.[1]) Jedenfalls kam Michel

1) Um uns eine ungefähre Vorstellung dieser Schwierigkeiten zu versch

durch seine Anordnungen so weit, daß er mit Sicherheit noch ein Hundertstel des im voraus berechneten und zu erwartenden Effektes gegebenenfalls beobachten konnte. Und als sich nun Michelson an den Versuch heranmachte, da fand er — nicht nur den erwarteten Effekt nicht, sondern noch nicht einmal das Hundertstel dieses Effektes, er fand überhaupt gar nichts. Es blieb, wenn Michelson seinen Apparat gedreht hatte, alles genau so wie vorher, alles so, als ob die Lage zum ruhenden Äther ohne jeden Einfluß wäre.

An der Sache selbst war nicht zu zweifeln. Aber man muß zugeben, sie war höchst überraschend und beunruhigend. Hier der Fizeauversuch, der auf das bestimmteste zeigte, daß der Äther von Körpern mit dem Brechungskoeffizienten 1, wie es die Gase annähernd sind, nicht mitgeführt wird, dort der Michelsonversuch, der zu zeigen schien, daß der Äther vollständig von der mit der Erde bewegten Luft mitgenommen wird. Denn wie anders soll man sich erklären, daß alle unsere vorhin angestellten Überlegungen, die doch nur die Folge der Annahme eines ruhenden Äthers sind, von der Erfahrung nicht bestätigt werden? *Hier also gab es zwei Versuche, deren Resultate schlechterdings nicht miteinander vereinbar erschienen*, ein Dilemma hatte sich ergeben, das nicht ohne Erschütterung der Grundlagen der Physik beseitigt werden konnte, der gordische Knoten mußte durchhauen werden, zu lösen war er nicht.

Erklärungsversuche.

Es schien unumgänglich, irgendeine der bisher als gesichert angesehenen *Voraussetzungen der Theorie*, die die beiden Versuche umfaßte, *fallen zu lassen*. Das nächstliegende war es vielleicht, anzunehmen, daß die *Lichtgeschwindigkeit von der*

---

machen wir folgende Überschlagsrechnung. Der Gangunterschied beider Strahlen muß mindestens eine halbe Wellenlänge, d. i. ungefähr 0,2 μ (tausendstel Millimeter) betragen. Wir fanden für diesen Gangunterschied den Ausdruck $a \cdot v^2/c^2$. Also muß

$$a \frac{v^2}{c^2} = 0{,}2\,\mu$$

$$a = 0{,}2\,\mu \cdot \frac{c^2}{v^2} = 0{,}2\,\mu \cdot 10^8$$

. D. h. der Abstand zwischen Lichtquelle und Spiegel müßte, wenn er einmal durchlaufen werden soll, wenigstens 20 m lang sein.

Geschwindigkeit der Lichtquelle abhängig sei. Es bot sich für diese Annahme die Analogie der Mechanik. Wirft man in einem fahrenden Eisenbahnzuge einen Ball in der Fahrtrichtung, so addiert sich zu der dem Ball von der Hand erteilten Geschwindigkeit die Geschwindigkeit des Eisenbahnzuges, weil auch der werfende Mensch, gewissermaßen die Wurfquelle, diese Geschwindigkeit hat. So also konnte man sich denken, daß sich zur Geschwindigkeit des Lichtstrahles, wenn er von einem bewegten Körper ausgesandt wird, noch die Geschwindigkeit eben dieses Körpers addiert. Dann wäre alles erklärt gewesen, denn in jeder Lage und bei jeder Geschwindigkeit des ganzen Apparates hätte der Lichtstrahl nicht nur seine eigene Bewegung ausgeführt, sondern außerdem noch die Bewegung des Apparates mitgemacht. Ruhe oder geradlinig gleichförmige Bewegung des Apparates kann dann also der mitbewegte Beobachter so wenig durch optische Versuche feststellen, wie der Zustand gleichförmiger Translationsbewegung eines Körpers durch mechanische Versuche ermittelt werden kann. Diese Hypothese hätte also mit einem Schlage aus der ganzen Verlegenheit herausgeholfen, wenn sie nur nicht im übrigen gegen die besten und gesichertsten Erfahrungen der Optik verstoßen hätte, die zu dem sogenannten Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Äther geführt hatten. Die sorgfältigsten und genauesten Untersuchungen namentlich an Doppelsternen hatten ergeben, daß die Lichtgeschwindigkeit sowohl vom Bewegungszustand der Lichtquelle als auch von der Farbe des Lichtes völlig unabhängig ist. Es war also mit dieser Hypothese nicht viel anzufangen, die zwar diesen einen Versuch befriedigend erklärt hätte, aber viele andere Erklärungen auf optischem Gebiet ungültig gemacht hätte. Es war also richtiger, auf diese Annahme zunächst zu verzichten, statt um des einen Versuches willen die ganze Optik umzuwerfen.

Viel aussichtsreicher war ein Vorschlag von Lorentz. Lorentz stellte sich vor, daß ein jeder Körper, der sich im Äther bewegt, in der Richtung seiner Bewegung verkürzt wird. Aus unseren Formeln (15) und (16) S. 40/41 kann man errechnen, daß die Beziehung

$$T_1 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = T_2$$

gilt. Nimmt man nun an, daß der in der Richtung der Erdbewegung

liegende Arm des ganzen Apparates nicht die Länge a, sondern nur die Länge $a\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ hat, so ergibt sich gerade Gleichheit der Zeiten, die zur Durchlaufung der beiden zueinander senkrechten Strecken erforderlich sind, wie es dem Michelsonschen Versuche entsprechen würde. Eine solche Verkürzung ist nun natürlich mit keinem Maßstab zu messen, denn jeder Maßstab wird ja in dem Maße, in dem er in die Richtung der Erdbewegung gedreht wird, auch seinerseits verkürzt, und die Verkürzung ist außerdem so geringfügig, daß sie sich der direkten Wahrnehmung völlig entzieht. Beträgt doch die Verkürzung eines Stabes von 1 km Länge, der in der Richtung der Erdgeschwindigkeit liegt, nur $^1/_{200}$ mm, und der ganze Erddurchmesser würde in der Bewegungsrichtung nur um etwa 6,3 cm verkürzt werden. Diese Hypothese würde sich also mit allen unseren Erfahrungen gut vertragen, denn derartig geringe Veränderungen spielen für die meisten physikalischen Untersuchungen gar keine Rolle, jedenfalls aber existiert keine Erfahrung von hinreichender Genauigkeit, die dieser Annahme widerspräche. Der einzige Versuch von so großer Genauigkeit, der Michelsonversuch, aber ist es gerade, der sie erfordert.

Man hätte sich also mit dieser Annahme wohl abfinden können. Aber sie war doch noch *in einer Hinsicht unbefriedigend*. Sie war eine isolierte Hypothese, nur ad hoc geschaffen, nur bestimmt, den Michelsonversuch zu erklären. Es war eine Hypothese mehr, eine brauchbare gewiß, aber doch keine solche, die eine Vereinfachung oder größere Übersichtlichkeit oder Vereinheitlichung des Gebietes bewirkt hätte, für das sie Gültigkeit beanspruchte. Und welche Antwort bleibt uns nun über den *Bewegungszustand des Äthers* und die Bewegung der Erde relativ zum Äther? Nun, es blieb die Vorstellung vom ruhenden Äther bestehen, der nicht von den sich in ihm bewegenden Körpern mitgenommen wird. Zu einem physikalischen Grundsystem eignet sich aber das System des ruhenden Äthers nicht, denn infolge der Verkürzung aller Körper in der Bewegungsrichtung ist es *nicht möglich, den Bewegungszustand eines Körpers dem Äther gegenüber festzustellen*. Die Differenz, die sich aus unseren früheren Betrachtungen für die Wege der beiden Lichtstrahlen ergeben hatte, wird gerade durch die Verkürzung aller Körper in der Bewegungsrichtung kompensiert. Auch dieses Ergebnis, so wenig man ihm irgend-

einen Fehler vorhalten kann, darf man doch als unbefriedigend bezeichnen. Ist es nicht unbefriedigend, die Existenz eines physikalischen Dinges, wie es der Äther sein soll, anzunehmen, ihm aber Eigenschaften beizulegen, derart, daß ein sehr wesentliches Moment an ihm, nämlich sein Bewegungszustand gegenüber der Erde, durch Kompensation zweier verschiedener Vorgänge gerade unerkennbar wird? Alles dieses Unbefriedigende wird nun völlig beseitigt durch die neue Theorie, der wir uns jetzt zuwenden werden, die uns aber darüber hinaus noch ungeahnte und tiefe Aufschlüsse über physikalische Grundfragen geben wird.

V. Die Relativitätstheorie.

Der Standpunkt des Beobachters.

Man kann den besprochenen Widerstreit der beiden optischen Versuche, des Fizeauschen und desjenigen von Michelson, auch auf folgende Form bringen. Beim Fizeauversuch befindet sich der Beobachter außerhalb des bewegten Mediums, er beobachtet von einem vergleichsweise als ruhend angenommenen System aus einen Vorgang, der sich in einem zu ihm bewegten System abspielt. Beim Michelsonversuch dagegen ist der Beobachter mitbewegt, er befindet sich in dem Medium, das bewegt wird, und stellt hier seine Beobachtungen an. Die beiden Versuche führen zu Ergebnissen, die sich nicht ohne Zwang vereinigen lassen. Es läßt sich wohl die Frage aufwerfen: *Ist denn der Standpunkt des Beobachters gleichgültig für das Ergebnis der Beobachtung, oder ist es nicht vielleicht notwendig, diesem Standpunkt des Beobachters Rechnung zu tragen, und könnte die Unvereinbarkeit der beiden Ergebnisse nicht ihren Grund eben darin haben, daß man es versäumt hat, diese Abhängigkeit vom Beobachter zu berücksichtigen?* Diese Frage aufgeworfen zu haben, sie als erster gesehen zu haben, ist ein wesentliches Verdienst Albert Einsteins. Größer noch aber ist die Leistung, die in der richtigen Beantwortung die Frage liegt. Denn für den ersten, der neue Wege wandelt, ist stets am schwersten, die überkommenen Vorurteile abzulegen; a welche Meinungen — von alters her als unumstößlich sicher a

gewiß erachtet — mußten hier erst abgelegt werden, um den Weg zu den neuen Einsichten zu bahnen!

Mancherlei Einzelüberlegungen haben wir jetzt anzustellen, deren wir uns erst versichern müssen, ehe wir den Blick für das Ganze gewinnen werden.

Die Zeitmessung.

Wir wenden uns wieder zu Betrachtungen zurück, wie wir sie mit Vorbedacht im ersten Kapitel dieses Buches angestellt haben. Und zwar wenden wir uns noch einmal der Frage nach der Zeitmessung zu.

Auf Grund der Festsetzungen, die wir dort getroffen haben, ist es uns möglich, mit Hilfe eines Pendels überall auf der Erde einen Zeitmesser herzustellen, d. h. eine Vorrichtung, die die Pendelschläge zählt und somit bestimmten Zeitpunkten bestimmte Zahlen zuordnet. Dabei denken wir uns die Pendelschläge so rasch aufeinanderfolgend, daß die kleinsten Zeitabschnitte, die für irgendeinen physikalischen Zweck in Betracht kommen, noch nach der Zahl der Pendelschläge unterschieden werden können. Wir können uns auch irgendeiner anderen gleichmäßig periodisch wirkenden Einrichtung bedienen, die wir genügend oft auf die Genauigkeit ihres Ganges hin an dem ursprünglichen Maß, der Erddrehung, oder an dem abgeleiteten Zeitmeßinstrument, dem Pendel, prüfen. Wir haben einen beliebigen Zeitmesser der Art, wie er soeben bestimmt wurde, eine „Uhr" genannt. Wir können also beliebige Punkte der Erde mit Uhren versehen und mit Hilfe dieser Uhren die Zeitdauer von Vorgängen messen, soweit sie *an ein und demselben Ort* stattfinden; nur dann nämlich können wir uns einer und derselben Uhr bedienen, und unsere Festsetzungen über Zeitmessung im ersten Kapitel beziehen sich zunächst nur auf Messungen mit *einer* Uhr, denn wie zwei Uhren miteinander verglichen werden können, darüber ist noch nichts ausgemacht. Man könnte ja meinen, das Problem habe jeder Uhrmacher gelöst. Man reguliert die eine Uhr nach der anderen

Tage lang, und dann ist die Sache gemacht. Das ist nun freilich einer für die Praxis des täglichen Lebens hinreichenden Genauigkeit möglich. Den weitergehenden Anforderungen der Physik spricht dieses Verfahren aber nicht. Denn es ist nicht ohne weiteres sicher, daß die richtiggestellte Uhr, wenn sie an einen anderen

Ort gebracht wird, nicht ihren Gang ändert. Bei Pendeluhren ist das ja beispielsweise der Fall; wenn sie von den Polen her dem Äquator genähert werden, so gehen sie langsamer, weil die Anziehungskraft der Erde an der Erdoberfläche von den Polen nach dem Äquator abnimmt. Es muß also eine physikalische Methode ausfindig gemacht werden, die es gestattet, den Gang zweier Uhren miteinander zu vergleichen, auch wenn sie sich nicht am gleichen Ort befinden.

Praktisch wird ja auch diese Aufgabe täglich von unserer Reichspost mit zureichender Genauigkeit gelöst, indem sie jeden Morgen um Punkt 8 Uhr ein Signal durch alle Telegraphenleitungen gibt. Die größeren Postanstalten geben um 5 Minuten nach 8 Uhr ein gleiches Signal an die kleinen Anstalten, und so wird allmorgenlich ganz Deutschland mit der richtigen Zeit versorgt. Und durch immer bessere Regulierung der Uhren kann nun dafür gesorgt werden, daß sie zwischen zwei aufeinander folgenden Signalen möglichst genau 24 Stunden angeben. Das Verfahren ist, wie gesagt, praktisch völlig ausreichend. Theoretisch unterliegt es einem naheliegenden Einwande. So rasch sich auch das elektrische Signal ausbreitet, Zeit braucht es schließlich doch, und so muß es in den von der Zentralstelle entfernteren Orten später ankommen als in den nähergelegenen. Es werden also die Uhren der entfernteren Orte genau genommen etwas nachgehen müssen. Der Unterschied ist aber so gering, daß eine solche Zeitdifferenz im täglichen Leben selbstverständlich keine Rolle spielt, für theoretische Betrachtungen aber bleibt der Fehler in der Zeitmessung als prinzipieller bestehen. Es ist nun aber nicht schwer, ihn zu beseitigen. Nehmen wir etwa an, daß zwei Uhren A und B in Übereinstimmung gebracht werden sollen. Nun stellen wir uns vor, daß es ein schöner windstiller Tag sei und daß man in der Nähe der Uhr A eine Flinte aufgestellt habe mit der Mündung nach B. In B soll eine ganz gleiche Flinte mit dem Rohr nach A gewandt stehen. Nun richten wir die Flinte in A so, daß die Kugel gerade den Abzug der Büchse in B treffen muß und führen in folgender Weise einen Probeschuß aus. Bei einer bestimmten Zeigerstellung unserer Uhr A drücken wir die Flinte ab und passen auf, wann die Kugel von B nach A kommt, die ja dort in dem Augenblick abgehen muß, in dem die erste den Hahn berührt. Nehmen wir an, es seien zwischen dem

Abgang der ersten Kugel und der Ankunft der zweiten 4 Sekunden verstrichen. Wenn wir nun beide Büchsen in ganz gleicher Weise geladen haben und auch sonst keine Umstände vorliegen, die uns eine andere Annahme nahelegen, so werden wir vermuten dürfen, daß die eine Kugel genau so viel Zeit gebraucht hat wie die andere, und wir werden mit dem Beobachter in B verabreden, daß wir z. B. um Punkt 12 Uhr eine Kugel abschießen werden und daß er dann seine Uhr bei Ankunft des Geschosses auf 12 Uhr und 2 Sekunden einstellen soll. Besser könnten wir noch sagen, daß wir nicht „vermuten", sondern zum Zwecke der Zeitdefinition festsetzen, daß der Hin- und Rückweg gleich lange dauere. Man sieht leicht, daß die hier geschilderte Methode sich nicht zur praktischen Durchführung eignet, sondern nur den prinzipiellen Weg besonders deutlich machen soll. Denselben Dienst muß uns natürlich auch jede andere Verständigungsmethode zwischen zwei Orten leisten, von der wir annehmen dürfen, daß das bei ihr benutzte Signal zum Hin- und Rückweg gleichviel Zeit beansprucht. Ein akustisches Signal also würde sich z. B. schon wesentlich besser eignen. Es kommt uns ja aber im Augenblick gar nicht darauf an, die Sache wirklich auszuführen, denn wir werden auch für wissenschaftliche Zwecke im allgemeinen mit den elektrischen Signalen völlig auskommen. Wir wollen nur das physikalische Prinzip einwandfreier Zeitvergleichung sicherstellen, weil uns das für unsere theoretischen Untersuchungen jetzt unentbehrlich sein wird. Wir wollen nun von zwei Uhren, die wir uns in physikalisch einwandfreier Weise aufeinander eingestellt denken, sagen, daß sie „synchron" gehen. Allerdings müssen wir hieran noch eine Forderung knüpfen. Als physikalisch brauchbar ist eine solche Methode der Uhrenstellung nur dann zuzulassen, wenn die Uhren nach ihrer Einstellung der Bedingung genügen, daß, wenn zwei Uhren mit einer dritten synchron gehen, sie auch untereinander synchron gehen, daß es also zum selben Ergebnis führt, wenn ich eine dritte Uhr nach der ersten und wenn ich sie nach der zweiten stelle.

Diese Festsetzungen über die physikalische Methode der Uhrenvergleichung mögen vielleicht manchem als belanglos und selbstverständlich erscheinen, aber es ist gerade das Selbstverständliche, das sich zuweilen am schwersten findet. Es mag sein, daß jeder Physiker von selbst auf eine solche Methode der Uhrvergleichung gekommen wäre, wenn man ihm das Problem gestellt hätte; sicher

ist nur, daß niemand vor Einstein daran gedacht hat, daß überhaupt, mindestens für theoretische Betrachtungen, eine solche Festsetzung getroffen werden muß, wenn das Inbeziehungsetzen der Angaben zweier an verschiedenen Orten befindlicher Uhren Bedeutung haben soll. Wir wollen nun zwei an verschiedenen Orten stattfindende Ereignisse als gleichzeitig bezeichnen, wenn zwei in ihrer unmittelbaren Nähe befindliche, synchron gehende Uhren jeweils dieselbe Zeigerstellung aufweisen. Und wenn zwei Ereignisse zu verschiedenen Uhrzeigerstellungen unmittelbar benachbarter, synchroner Uhren stattfinden, so soll der Unterschied der Zeigerstellungen uns das Maß der Zeitdifferenz der beiden Ereignisse sein. Wir wollen überhaupt hinfort unter der Zeit eines Ereignisses oder dem Zeitpunkt, zu dem es stattfindet, nichts anderes verstehen als die Angabe einer in unmittelbarer Nähe des Ereignisses befindlichen Uhr.

Die beiden Koordinatensysteme.

Wir wollen uns nun vorstellen, wir hätten zwei Koordinatensysteme im Raum K und K'. Wesentlich hierbei sind drei durch Körper festgelegte, aufeinander senkrechte Richtungen, die Körper, die sie festlegen, mögen im übrigen beschaffen sein, wie sie wollen, und wenn nichts anderes gesagt wird, soll stets K' ein System sein, daß sich gegenüber K von einem bestimmten Augenblick ab in der Richtung der positiven X-Achse mit der gleichförmigen Geschwindigkeit v bewegt. Man stelle sich also vielleicht als System K einen geradlinigen Eisenbahndamm und als System K' einen sehr langen und in überaus rascher Fahrt befindlichen Wagen vor. Wir versehen nun die positive X-Achse von K in hinreichend kurzen Abständen mit Uhren, die wir alle nach irgendeiner Methode untereinander synchron stellen, wobei wir die Zeitangaben der Uhr im Nullpunkt als die Grundangaben betrachten wollen. Wir wollen nun ferner auch die X'-Achse mit Uhren versehen, die wir nach ganz derselben Methode untereinander synchron stellen wollen. Auch hier sollen alle anderen Uhren nach derjenigen im Nullpunkt des Systems gestellt werden. Die Zeitangaben der beiden Nullpunktsuhren sollen n gleichartige sein. Das soll heißen, daß solche gleichartigen Vorgän in beiden Systemen, die vom Bewegungszustande des Systems unal hängig sind, jeweils mit den zugehörigen Uhren untersucht, gleiche Zeite dauern. Ist derjenige physikalische Vorgang, der zur Konstruktion d

Uhr gebraucht wird, selbst vom Bewegungszustande des Systems (soweit keine Beschleunigung im Spiel ist) unabhängig, wie das z. B. bei einer ideal konstruierten, durch eine Unruhe regulierten Federuhr der Fall ist, so kann man sich auch kurz so ausdrücken: die beiden Nullpunktsuhren sollen einander völlig gleich sein. Wir wollen nun ferner noch annehmen, daß die Nullpunktsuhr des Systems K' in dem Augenblick, in dem sie durch den Nullpunkt von K geht, mit der Nullpunktsuhr in K genau die gleiche Zeit zeigt. Es fragt sich nun, ob unter diesen Voraussetzungen stets, wenn irgendwelche zwei Uhren der beiden gegeneinander bewegten Systeme sich an derselben Stelle befinden, beide dieselbe Zeit angeben müssen.

Stellen wir uns kurz noch einmal unsere Annahmen vor Augen. Wir haben zwei gegeneinander bewegte Systeme mit Uhren versehen, wir haben angenommen, die Nullpunktsuhren sollen von gleicher Beschaffenheit sein und in dem Augenblick, in dem sie unmittelbar benachbart sind, gleiche Zeiten zeigen. Wir haben ferner die Uhren des einen Systems untereinander synchron gestellt und die Uhren des anderen Systems untereinander synchron gestellt. Das ist aber auch alles. Unsere Voraussetzungen schließen keineswegs die Annahme in sich, daß die beiden Nullpunktsuhren untereinander synchron sind. Ja, wir können diese Annahme gar nicht machen, da sich unsere Methode, Uhren synchron zu stellen, offenbar nur auf gegeneinander ruhende Uhren bezieht, hier aber die beiden Uhren gegeneinander bewegt sind. Die Antwort auf diese Frage muß also lauten, daß wir auf Grund der Angaben der Uhren des Systems K zunächst gar nicht wissen können, welche Zeitangaben die jeweils an denselben Stellen befindlichen Uhren des Systems K' machen werden. Nur die Erfahrung kann uns hierüber belehren, ihr werden wir die Entscheidung dieser Frage überlassen müssen. Wir müssen also mit der Möglichkeit rechnen, daß ein bestimmtes Ereignis, das auf der X-Achse des Systems K vor sich geht, mit den unmittelbar benachbarten Uhren der Systeme K und K' verglichen, in den beiden Systemen zu verschiedenen Zeiten stattfindet, d. h. daß die Uhrzeiger der beiden in Betracht kommenden Uhren eine verschiedene Stellung haben, und , obwohl jede von ihnen mit ihrer Nullpunktsuhr synchron geht und e, als sie aneinander vorbeiglitten, gleiche Zeiten anzeigten. Es wäre nn also auch in den beiden Systemen eine verschieden lange Zeit rstrichen zwischen dem Augenblick, in dem die beiden Nullpunkte sich kten, und dem Augenblick des beobachteten Ereignisses. Das würde

also besagen, daß die Messung und Bestimmung einer und derselben Zeitspanne, die von zwei ganz bestimmten physikalischen Vorgängen begrenzt wird, von den beiden verschiedenen Systemen aus nicht zu demselben Ergebnis führt. Physikalische Zeitangaben dürften also nicht mehr schlechthin gemacht werden, als ob sie eine für alle Raumpunkte ohne weiteres gültige Zeit angäben, als ob sie sich auf eine Weltenuhr bezögen, sondern die physikalischen Zeitangaben müßten dann stets eine Mitteilung darüber enthalten, von welchem System aus sie gerechnet sind.

Wohlgemerkt, das sind bisher nur Möglichkeiten, Erwägungen, die für den Fall Gültigkeit bekommen, daß die Erfahrung uns zeigen sollte, die Uhren in K und K' gehen nicht synchron. Wir werden aber alsbald sehen, daß die Erfahrung uns in der Tat diesen Weg führt.

Die Längenmessung.

Zuvor aber wollen wir noch ein zweites Vorurteil beheben, das sich auf die Längenmessung bezieht. Wie messen wir Längen? Befindet sich der auf seine Länge hin zu untersuchende Körper mit dem Beobachter im selben System, also etwa beide in K, so ist die Sache einfach genug und schon im ersten Kapitel besprochen worden. Man legt dann mehrmals hintereinander einen geeigneten Maßstab an den Körper an und bestimmt, wie oftmals man diesen Maßstab anzulegen hat. Die Anzahl der Male, die man den Maßstab anzulegen hat, liefert die Maßzahl der Länge des Körpers. Ganz anders aber müssen wir verfahren, wenn wir die Länge eines Körpers bestimmen wollen, der relativ zu uns bewegt ist. Denken wir uns den zu messenden Gegenstand ruhend in K' und den Messenden in K. Der zu messende Gegenstand soll seine Längserstreckung in der Richtung der X'-Achse haben. Stellen wir uns etwa einen fahrenden Eisenbahnzug vor, dessen Länge von dem Boden aus, über den er hinfährt, bestimmt werden soll. Schließen wir es aus, daß der Beobachter nebenher läuft — denn dann befindet er sich ja in Ruhe im System K', aber in Bewegung gegenüber dem System K —, so wird er sich folgender Methode bedienen müssen. Längs des Bahndamms wird er eine Anzahl von Leuten mit richtiggehenden (d. h. synchron gestellten) Uhren verteilen und wird ihnen vorschreiben, daß zu einer ganz bestimmten Zeit die beiden in diesem Augenblick am Anfang und am Ende des Zuges stehenden Leute diese beiden Stellen auf dem Boden markieren. Dann wird er die so

abgesteckte Länge nach der vorhin angegebenen Methode ausmessen und als die Länge des Zuges ausgeben. Ein im Zuge befindlicher Mensch braucht aber diese ganze Zurüstung nicht, um die Zuglänge festzustellen, er wird sie einfach durch mehrmaliges Hintereinanderlegen eines Maßstabes feststellen können. Kehren wir von dem Eisenbahnzug wieder zu der Ausdrucksweise, die wir sonst anwenden, zurück, so können wir sagen: Eine Länge auf der X'-Achse mißt ein Beobachter in K' durch die Methode des Aneinanderlegens von Maßstäben, ein Beobachter in K dagegen, indem er die Lage des Anfangspunktes und Endpunktes der zu untersuchenden Strecke „gleichzeitig", d. h. wenn die Uhren des Systems K am Anfang und Ende der Strecke die gleiche Zeit zeigen, auf seiner X-Achse markieren läßt. Ist es nun sicher, daß *diese beiden auf verschiedene Weise festgestellten Längenangaben* für die Länge eines und desselben Körpers *untereinander gleich sind*? Man möchte das für selbstverständlich halten. Es ist es aber keineswegs. Hier liegen zwei ganz verschiedene Untersuchungen vor, die sich zwar auf denselben Körper beziehen, aber doch jede in ihrer eigenen Weise. So bedarf man — um einen charakteristischen Unterschied hervorzuheben — für die eine Methode nur eines Maßstabes, für die andere dagegen benötigt man auch noch Uhren. Da wir uns aber schon soeben davon überzeugt haben, daß die Zeitmessung noch Besonderheiten in sich enthält, die wir bis jetzt noch nicht aufgeklärt haben, so wird Vorsicht vonnöten sein beim Vergleich zweier Methoden, von denen die eine eine Zeitmessung verwendet, die andere dagegen nicht. Wir wollen also auch diese Frage noch vorläufig in der Schwebe lassen.

Die Frage nach den Transformationsgleichungen.

Suchen wir uns jetzt zunächst das *mathematische Gewand*, in das wir die soeben berührten Fragen werden kleiden müssen, wenn wir sie beantworten wollen. Wir wollen wissen, erstens, welche Zeit zeigt eine Uhr des Systems K', die sich zu einer bestimmten Zeit des Systems K an einer bestimmten Stelle des Systems K befindet, und wir wollen zweitens wissen, welcher Abstand einem Punkte vom Nullpunkte des Systems K' zukommt, der zu einer bestimmten Zeit des Systems K einen bestimmten Abstand vom Nullpunkt des Systems K hat. Verstehen wir unter x, y, z, t die drei Ortskoordinaten eines Ereignisses in K und seinen Zeitmoment, ebenfalls nach Uhren in K bestimmt, und unter x', y', z', t' die Ortskoordinaten desselben Ereig-

nisses in K' und seinen Zeitmoment, nach Uhren bestimmt, die dem System K' angehören und in ihm synchron laufen, so kommt es darauf an, diejenigen Transformationsgleichungen aufzufinden, die von K nach K' und umgekehrt von K' nach K überführen, das heißt, die es gestatten, x', y', z' und t' zu berechnen, wenn man x, y, z und t kennt, oder, wie man sich auch ausdrücken kann, die die gestrichenen Koordinaten als Funktionen der ungestrichenen Koordinaten darstellen.

Dieses Unternehmen sieht nun auf den ersten Blick eigentlich hoffnungslos aus, denn wir haben hier zwei verschiedene Systeme, jedes mit seinen eigenen Maßstäben und Uhren ausgerüstet. Was ist ihnen beiden gemeinsam, das uns zu einer Vergleichsmessung hülfe? Denn nur dann kommen wir zu den Transformationsgleichungen, wenn es uns gelingt, einen physikalischen Vorgang ausfindig zu machen, von dem wir angeben können, wie er sich von K aus gemessen und von K' aus beobachtet darstellen muß, und wenn wir die beiden Ergebnisse miteinander vergleichen können. Dafür wird sich nun aber Rat schaffen lassen. Wir kommen jetzt dazu, diejenigen Hypothesen aufzustellen, die uns hier weiter helfen können.

Andere Formulierung des Problems.

Wir haben zu Anfang dieses Kapitels die beiden so schwer zu vereinigenden Versuche von Fizeau und Michelson noch einmal einander gegenübergestellt. Wir können sie in folgender Weise ausdeuten. Geht ein Lichtstrahl durch ein Medium hindurch, das gegen den Standpunkt des Beobachters bewegt ist, so nimmt das Medium das Licht nicht mit, das Licht breitet sich im System des Beobachters vielmehr auch durch das bewegte Medium hindurch nach allen Seiten gleich schnell aus, gleichviel welcherlei Bewegungen das Medium ausführt, wenigstens, wenn das Medium Luft ist. Geht aber ein Lichtstrahl durch ein bewegtes Medium hindurch und wird von einem mitbewegten Beobachter untersucht, so breitet es sich auch in diesem System nach allen Richtungen gleichmäßig aus. Denken wir uns den Fizeauversuch mit Luft ausgeführt und eine höchst intelligente Fliege im Luftstrom, so würde sie das Licht im Luftstrom nach allen Seite gleichmäßig schnell bewegt finden (nach dem Michelsonversuch), de außen beobachtende Mensch aber würde die Lichtbewegung als gleich mäßig in der umgebenden ruhenden Luft wahrnehmen. Es ist al — so können wir diese beiden Tatsachen zusammenfassen — de

Beobachter nicht möglich, mit Hilfe optischer Untersuchungen seinen Bewegungszustand festzustellen. Auf Grund des optischen Befundes kann er vielmehr stets annehmen, er ruhe im Äther. Da das aber jeder andere Beobachter in irgendwelchen anderen Systemen, die zu dem ersten sich in gleichförmiger Translationsbewegung befinden, ebenfalls von sich annehmen kann, so ist gar nicht ausfindig zu machen, wie eines dieser Systeme vor dem anderen bevorzugt sein soll. Man hat den Michelsonversuch oft genug wiederholt. Man hat später auch einige andere, namentlich elektrische Versuche (auch die Optik ist ja heute nur ein Spezialgebiet der Elektrizitätslehre) anstellen können, um den Bewegungszustand der Erde gegenüber dem Äther festzustellen. Sie waren alle von demselben Erfolge, es gelang nicht, den Bewegungszustand der Erde gegenüber dem Äther zu bestimmen, obwohl die Messungen hinreichend fein waren. Alles verhielt sich so, als ob die Erde im Äther ruhte. So gewann man denn allmählich die Überzeugung, daß es überhaupt unmöglich sein würde, den Bewegungszustand der Erde gegen den Äther festzustellen. Daß mechanische Messungen nicht zur Feststellung einer absoluten gleichförmigen Translationsbewegung ausreichten (wenn darunter eine Bewegung gegenüber einem ausgezeichneten Inertialsystem verstanden wird), haben wir schon gesehen und haben diese Einsicht als das Relativitätsprinzip der Mechanik bezeichnet. Wir dürfen nun annehmen, daß auch optisch-elektrische Messungen zu einer solchen Feststellung nicht führen, und müssen danach wohl auch zugeben, daß wir überhaupt kein Mittel besitzen, der Erde einen bestimmten Bewegungszustand gegenüber irgendeinem von Natur ausgezeichneten System zuzuschreiben, weil wir kein derartiges System finden können. Weder ließ sich „das" Inertialsystem auffinden, vielmehr gibt es deren unzählige, noch läßt sich jetzt das System des ruhenden Äthers angeben — vielmehr sieht es so aus, als ob der Äther in sehr vielen Systemen ruhte. Denn es ist ja gar nicht einzusehen, welchen Vorzug die Erde etwa vor anderen Systemen haben sollte, r Äther wird doch nicht gerade zufällig im Erdsystem ruhen. ein in vielen Systemen ruhender Äther ist aber ein Unding, und so ird es wohl geraten sein, zunächst einmal ganz von der Hypothese es Äthers, die unbedingt ein bevorzugtes System, das des Äthers, rlangt, abzusehen, und eine Hypothese anzunehmen, die der Ver-

geblichkeit aller Versuche, den Bewegungszustand der Erde in diesem Äther zu ergründen, Rechnung trägt.

Das Relativitätsprinzip.

Diese Hypothese ist das Relativitätsprinzip. Es mögen hier zunächst zwei der bekannten Formulierungen dieses Prinzips stehen. Zunächst diejenige, die Einstein ihm in seinem ersten Aufsatz über diese Theorie gegeben hat: „Die Gesetze, nach denen sich die Zustände der physikalischen Systeme ändern, sind unabhängig davon, auf welches von zwei relativ zueinander in gleichförmiger Translationsbewegung befindlichen Koordinatensystemen diese Zustandsänderungen bezogen werden:" Sodann diejenige, die Laue ihm in seiner zusammenfassenden Darstellung gegeben hat: „Man kann aus der Gesamtheit der Naturerscheinungen durch immer weiter gesteigerte Annäherung immer genauer ein Bezugssystem x, y, z, t bestimmen, in welchem die Naturgesetze in bestimmten, mathematisch einfachen Formen gelten. Dies Bezugssystem ist aber durch die Erscheinungen keineswegs eindeutig festgelegt. Vielmehr gibt es eine dreifach unendliche Mannigfaltigkeit gleichberechtigter Systeme, welche sich gegeneinander mit gleichförmigen Geschwindigkeiten bewegen." Beide Formulierungen wollen im Grunde auf dasselbe hinaus. Es gibt gewisse Systeme, die sich vor anderen dadurch auszeichnen, daß sich die Gesetze über die Änderungen der Zustände physikalischer Systeme, d. h. die Naturgesetze, in ihnen in besonders einfachen Gleichungen darstellen lassen. Aber es gibt eben viele solche Systeme, unter denen nun keines weiter hervorgehoben ist.

Das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.

Mit diesem Prinzip verbindet sich nun ein zweites, das man wohl als den eigentlichen Schlüssel der Transformationsgleichungen ansprechen darf, das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Wir sagten vorhin (S. 54), daß es zur Auffindung der Transformationsgleichungen notwendig sei, einen Vorgang ausfindig zu machen, den man in beiden Systemen beobachten kann. Als solcher Vorgang bietet sich nun die Lichtausbreitung dar. Der Fizeau- und der Michelsonversuch zusammen haben ergeben, daß das Licht sich in mehreren gleichförmig geradlinig gegen-

einander bewegten Systemen nach allen Seiten gleichmäßig ausbreitet. Macht man nun erst die Annahme der Relativität, d. h. der Gleichwertigkeit aller dieser Systeme, so liegt kein Grund vor, die Lichtgeschwindigkeit in dem einen System für größer zu halten als im anderen. Auch die vorrelativistische Physik kannte schon einen Satz von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, der sich allerdings auf den Äther als Grundsystem bezog. Sie nahm an, daß die Lichtgeschwindigkeit im freien und unbeweglichen Äther unabhängig vom Bewegungszustande der Lichtquelle, von der Farbe des Lichtes und von Massen sei, die sich etwa in der Nähe des Lichtweges befinden. Ein gegen den Äther bewegter Beobachter hätte aber nach dieser Anschauung nicht dieselbe Lichtgeschwindigkeit bezüglich seines Systems gefunden wie ein im Äther ruhender. Jetzt aber, da wir vom Äther ja ganz absehen, nehmen wir an, daß die Lichtgeschwindigkeit auch für alle gleichförmig geradlinig gegeneinander bewegten Systeme dieselbe sei, daß also z. B. ein und derselbe Lichtstrahl zwei gegeneinander bewegten Beobachtern sich gleich schnell zu bewegen scheint. Wenn das auch auf Grund des Relativitätsprinzips eine naheliegende Annahme ist, so ist es doch eine neue, eine zweite Annahme, nicht eine bloße Folge des Relativitätsprinzips. Wir müssen also sagen, daß wir den Vorgang, dessen wir zur Ableitung der Transformationsgleichungen bedürfen, nicht eigentlich „gefunden" haben, sondern daß wir ein Prinzip an die Spitze stellen, aus dem sich dieser Vorgang ergibt.

Erinnern wir uns dessen, was wir im ersten Kapitel über die Ausbildung einer Theorie gesagt haben. Einer Theorie liegen Annahmen oder Hypothesen zugrunde, die man versuchsweise benutzt, um Schlüsse aus ihnen zu ziehen. Stimmen diese Schlüsse mit den Ergebnissen der Versuche überein, so darf man das Ganze als eine gelungene Theorie betrachten. Anderenfalls wird man die Voraussetzungen abändern oder fallen lassen müssen. Wir machen nun diese beiden Voraussetzungen, diejenige der Relativität aller gleichförmig geradlinig gegeneinander bewegten Systeme und die der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in diesen Systemen, und sehen zu, welche Folgerungen sich hieraus ergeben.

VI. Ableitung der Transformationsgleichungen.

Es sind also zwei Prinzipien, die wir jetzt unseren Ableitungen zugrunde legen, die allerdings in einem inneren Zusammenhange stehen und erst in Gemeinschaft das Mittel bieten, die von uns gewünschten Transformationsgleichungen herzuleiten. Das erste ist das Prinzip der Relativität, das zweite ist das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.

Festsetzung über die Uhrstellung.

Zunächst führen uns diese Annahmen zu einer bestimmten Auswahl unter den möglichen Methoden, die Uhren eines und desselben Systems untereinander synchron zu stellen. Da wir ja angenommen haben, daß in allen gegeneinander gleichförmig bewegten Koordinatensystemen das Licht sich nach allen Seiten mit gleicher Geschwindigkeit bewegt, so sind optische Signale nunmehr durchaus geeignet, die Uhrstellung zu vermitteln. Diese Möglichkeit ist, wohlgemerkt, erst eine Folge unserer jetzigen Annahmen, denn solange man mit dem Äther rechnete, mußte man annehmen, wie wir es ja auch ursprünglich getan haben, daß sich das Licht in einem zum Äther bewegten System nach den verschiedenen Seiten mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen würde. Wir setzen jetzt also fest, daß wir solche Uhren als synchron bezeichnen, deren Übereinstimmung in folgender Weise hergestellt worden ist. Ein Lichtstrahl gehe zur Zeit t_1 vom Punkte A aus, werde im Punkte B gespiegelt und gelange zur Zeit t_2 nach A zurück. Die Uhr im Punkte B geht mit der in A synchron, wenn sie bei Ankunft des Signals die Zeit $\frac{1}{2}(t_1 + t_2)$ gezeigt hat. Bei unserer Annahme, daß das Licht sich an allen Orten und in allen Richtungen, von einem Galileisystem aus untersucht, gleichförmig ausbreitet, wird bei dieser Definition der Synchronität auch der Bedingung genügt, daß, wenn zwei Uhren mit einer dritten synchron gehen, sie untereinander synchron gehen. Diese Möglichkeit, die Uhren durch Lichtsignale zu stellen, ist von großer Bedeutung. Denn ein und dasselbe Lichtsignal kann zur Stellu der Uhren in verschiedenen Systemen dienen. Das Licht lä nach unserer zweiten Annahme nämlich sozusagen außerhalb all Systeme, gehört keinem System in besonderer Weise an, auch nicht etr dem System, in welchem die Lichtquelle ruht. Diese Eigentümlichkeit kom

nur dem Lichte und den ihm gleichartigen Strahlenarten zu. Nicht aber beispielsweise dem Schall. Der Schall ist in einer besonderen Weise dem System zugehörig, in dem der Schallträger, also etwa die Luft, ruht, die Gewehrkugel ist in besonderer Weise dem System zugehörig, in dem das Gewehr ruht. Das Licht allein ist Kosmopolit, in jedem System in gleicher Weise zu Hause.

Mathematische Formulierung der Bedingungen.

Denken wir uns also in dem Augenblick, in dem die Nullpunkte zweier Systeme K und K' sich decken, in diesem Nullpunkt ein Lichtsignal aufblitzen. Das Licht wird sich nach allen Seiten des Raumes ausbreiten, und zwar in beiden Systemen gleichförmig und mit derselben Geschwindigkeit. Dae Licht wird sich also in K fortwährend auf der Oberfläche einer Kugel befinden, deren Mittelpunkt der Nullpunkt von K ist. Die Kugel wird sich ständig erweitern, und alle Uhren, an denen das Licht vorbeikommt, werden in diesem Augenblick geradesoviel zeigen müssen, als sich durch Division ihres Abstandes vom Nullpunkt durch die Lichtgeschwindigkeit ergibt, wenn sie alle synchron sein sollen. Da nun

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

die Gleichung einer Kugel um den Nullpunkt als Mittelpunkt mit r als Radius darstellt, so wird die sich ständig erweiternde Lichtkugel dargestellt durch die Gleichung

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2.$$

Das also ist der mathematische Ausdruck für den Vorgang der Lichtausbreitung im System K. Wie stellt sich nun derselbe Vorgang im System K' dar? Hier muß das Relativitätsprinzip in Verbindung mit dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit antworten. Auch für einen Beobachter in K' muß die Lichtausbreitung auf sich stets erweiternden Kugelflächen vorgehen, allerdings um den Nullpunkt von K' als Mittelpunkt. Mit Hilfe von Maßstäben und Uhren, die K' ruhen, untersucht, muß die mathematische Darstellung genau selben Vorganges der Lichtausbreitung also zu einem völlig gleichigen Ausdruck, zu der Gleichung

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2$$

hren.

Die gesuchten Transformationsgleichungen müssen also so beschaffen sein, daß sich die zweite Gleichung aus der ersten ergibt, wenn man die x, y, z, t durch die x', y', z' und t' ausdrückt.[1]) Damit haben wir den eigentlichen Ansatzpunkt für die mathemathische Behandlung gewonnen, wenn wir noch hinsichtlich der abzuleitenden Transformationsgleichungen die einschränkende Bedingung stellen, daß sie *linear* sein sollen. Diese Bedingung hat physikalische Gründe. Mathematisch könnte man ja beliebige Funktionalzusammenhänge zwischen den Koordinaten des einen und des anderen Systems zulassen. Physikalisch aber muß man vor allen Dingen verlangen, daß die gegenseitige Zuordnung von Punkten des einen und des anderen Systems eindeutig und stetig sei, und daß die Transformationsgleichungen dem Umstande Rechnung tragen, daß der Raum als in jeder Hinsicht *isotrop* und *homogen* anzusehen ist, d. h. daß es in ihm weder bevorzugte Richtungen (daß er also keine Kristallstruktur hat) noch Unterschiede des Ortes gibt, daß also an einer Stelle des Raumes die Vorgänge verlaufen wie an jeder anderen. Analoges gilt von der Zeit. Es soll für den Verlauf eines Vorganges belanglos sein, ob er zu Anfang der Zeitrechnung oder erst später vor sich geht. Diese Bedingungen werden nur dann erfüllt, wenn wir die Transformationsgleichungen linear wählen. Damit haben wir uns nun die Aufgabe vollständig gestellt und so, daß sie nur eine bestimmte Lösung zuläßt. Wir fassen das alles noch einmal zusammen. Wir suchen diejenigen linearen Transformationsgleichungen zwischen den x, y, z, t und den x', y', z', t', welche die Gleichung

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0 \tag{17}$$

1) Man hätte auch in folgender Weise argumentieren können. Das Relativitätsprinzip verlangt Gleichförmigkeit der Naturgesetze in allen gegeneinander in gleichförmiger Translationsbewegung befindlichen Systemen. Konstanten, die in diesen Gesetzen etwa vorkommen, müssen „Invarianten" der Transformation sein, d. h. sie dürfen ihren Wert nicht ändern. Kennt man nun *ein* Naturgesetz „genau", so kann man nach denjenigen Transformationsgleichungen fragen, durch die die Form *dieses* Gesetzes nicht geändert wird. Alle auf empirische Grundlage aufgestellten Gesetze sind aber ungewiß wegen der Grenzen der Beobachtungsgenauigkeit. Deshalb wird die Exaktheit *eines* Gesetzes als *Hypothese* gebraucht, und dieses Gesetz ist das von der Lichtausbreitung, welches das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit umfaßt. Die Lichtgeschwindigkeit ist eben hiernach eine universelle Konstante und muß eine Invariante der gesuchten Transformationsgleichungen werden.

in die Gleichung

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0 \tag{18}$$

überführen. Und wir erinnern noch einmal an die Bedeutung unserer Systeme K und K'. Es soll K' ein Koordinatensystem sein, das sich gegen K in der Richtung der positiven X-Achse mit der gleichförmigen Geschwindigkeit v bewegt, so daß die Y'- und Z'-Achsen beständig den Y- und Z-Achsen parallel sind.[1])

Ansatz der Transformationsgleichungen.

Wir hätten demnach jetzt vier lineare Transformationsgleichungen für die Veränderlichen x, y, z, t anzusetzen. Nun zeigt sich aber sofort, daß infolge der speziellen Wahl, die wir hinsichtlich der Anfangslage und der Bewegungsrichtung der beiden Systeme gegeneinander getroffen haben, diese Gleichungen besonders einfach, d. h. mit einer sehr geringen Anzahl zu bestimmender Konstanten ausfallen. Es ist zunächst klar, daß die Transformationsgleichungen homogen sein müssen, da ja für $x = y = z = t = 0$ auch $x' = y' = z' = t' = 0$ sein soll.[2]) Weiter aber sieht man, daß offenbar die Transformationsgleichungen für die x- und t-Koordinate eine besondere Rolle spielen werden, für die x-Koordinate, weil die Bewegungsrichtung mit der X-Achse zusammenfällt, für die t-Koordinate, weil sie sowieso den drei Raumkoordinaten gegenüber eine Sonderstellung einnimmt und auch bei der Bewegung in Betracht kommt. Dagegen müssen die Transformationsgleichungen für die y- und z-Koordinate ganz gleichartig sein. Nun folgt aus den Eigenschaften der Isotropie und Homogeneität des Raumes und der Homogeneität der Zeit, daß y' nur von y abhängen kann. Um das einzusehen, denken wir uns in der XY-Ebene senkrecht auf der X'-Achse einen Stab stehen. Durch die y-Koordinate des

1) Der Leser, dem es auf die Nachprüfung der Einzelheiten nicht ankommt, mag ohne Schaden für das Verständnis die folgenden Ausführungen überspringen und von S. 65 weiterlesen.

2) Homogen heißt eine Gleichung dann, wenn alle ihre Glieder vom gleichen Grade sind, für lineare Gleichungen bedeutet das im besonderen, daß sie keine absoluten Glieder enthalten. Die denkbar allgemeinsten hier in Betracht kommenden linearen homogenen Gleichungen würden also

$$\begin{aligned} x' &= a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t \\ y' &= a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t \\ z' &= a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 t \\ t' &= a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 t \end{aligned}$$

heißen müssen, und in der Tat würde es bei einer allgemeinen Behandlung des Problems notwendig sein, die sämtlichen 16 Konstanten zu bestimmen. Für die physikalische Untersuchung bedeutet aber unsere Annahme keine Einschränkung, da uns ja die Wahl der Koordinatensysteme stets völlig in die Hand gegeben ist.

Endpunktes dieses Stabes wird seine Länge bestimmt. Würde nun y' von x abhängen, so würde das besagen, daß derselbe Stab an einer vom Nullpunkt entfernteren Stelle der X-Achse eine andere Länge hätte, das würde aber einen Verstoß gegen die Homogeneität des Raumes bedeuten, denn man dürfte dann den Koordinatenanfangspunkt nicht beliebig wählen. Ebenso kann y' nicht von z abhängen, denn y' bedeutet den Abstand eines Punktes von der $X'Z'$-Ebene. Die z-Koordinate dieses Punktes (A in Fig. 10) würde sich nun ändern, wenn die X- und X'-Achse sich selbst parallel „tiefer" gelegt würde. Das y', der Abstand von der $X'Z'$, aber kann sich hierdurch offenbar nicht ändern, denn wir können uns ja dieses y' wieder durch einen Stab repräsentiert denken, und seine Länge kann doch nicht abhängig davon sein, ob wir die gemeinsame X-Achse höher oder tiefer legen, wenn sie nur in die Bewegungsrichtung der Systeme gegeneinander fällt. Fig. 10 läßt das deutlich hervortreten. Auch von der Zeit t kann y' nicht abhängig sein, es würde sonst der gedachte Stab zu verschiedenen Zeiten verschiedene Längen haben, ohne daß physikalische Umstände diese Längenänderung bewirkt hätten, denn seinen Bewegungszustand nehmen wir ja als unveränderlich an. Das würde aber heißen, daß verschiedene Zeitpunkte physikalisch ungleichwertig wären — ein Widerspruch gegen die angenommene Homogeneität der Zeit. Genau aus den entsprechenden Gründen kann nun auch z' nur von z abhängen.[1]) Ferner kann auch x' weder von y noch z abhängen. Denn denke ich mir einen Stab in der X'-Achse liegen mit seinem einen Endpunkt im Anfang, so bestimmt seine Länge die x-Koordinate seines anderen Endpunktes und bleibt natürlich auch ungeändert, wenn wir der X-Achse bei unveränderter Richtung eine schrägseitlich verschobene Lage geben, während sich hierdurch das y und z des Endpunktes des Stabes geändert haben. Schließlich müssen wir auch t' als von y und z unabhängig annehmen. Denn auch hier dürfen wir wieder nicht annehmen, daß die Stellung irgendwelcher Uhren sich dadurch ändert, daß wir der X- und X'-Achse eine andere, der ursprünglichen



Fig. 10.

1) Das heißt also, daß in den S. 61 Anm. 2 ausgeschriebenen Gleichungen die Konstanten a_2, c_2, d_2 und a_3, b_3, d_3 zu Null werden.

parallele Lage geben. Hierdurch ändert sich aber wieder das y und z einer jeden Uhr.[1]) Nun ist aber auch klar, daß wegen der Gleichwertigkeit aller Raumrichtungen y' in derselben Weise von y abhängen muß wie z' von z[2]), so daß wir schließlich zu folgendem Ansatz gelangen:

$$\begin{aligned} x' &= mx + nt \\ y' &= oy \\ z' &= oz \\ t' &= px + qt \end{aligned} \tag{19}$$

wenn wir unter den Buchstaben $m \ldots q$ noch zu bestimmende Konstanten verstehen. Nun läßt sich zunächst weiter zeigen, daß der zweimal auftretende Faktor o gleich 1 sein muß.

Denken wir uns an der X- und X'-Achse je einen Blechstreifen von gleicher Breite befestigt, so daß beide Streifen in der XY-Ebene liegen und aufeinander schleifen. Dann darf wegen der Gleichwertigkeit beider Systeme keiner der beiden Streifen den anderen überragen, denn das wäre ein von beiden Systemen in gleicher Weise beobachtbares Faktum, das die hinsichtlich ihres Bewegungszustandes gleichwertigen Systeme ungleichwertig machen würde. Das bedeutet aber, daß $y' = y$ und entsprechend auch $z' = z$ sein muß.

Schließlich läßt noch eine Vereinfachung auf Grund physikalischer Erwägungen anbringen. Da wir die Zeitrechnung von dem Augenblick an zählen, in dem sich die Nullpunkte decken, und dem System K' die Geschwindigkeit v gegen K zuschreiben, so hat der Nullpunkt von K' in jedem Augenblick den Abstand vt vom Nullpunkt des Systems K. D. h.

(19a) für $x' = 0$ soll stets $x = vt$ sein.

Setzen wir dies in die erste der Gleichungen (19) ein, so erhalten wir:

$$0 = mvt + nt$$

oder durch t dividiert: $$n = -mv,$$

so daß wir schließlich folgende vier Gleichungen erhalten, in denen nun nur noch drei Konstanten zu bestimmen bleiben:

$$\begin{aligned} x' &= m(x - vt) & z' &= z \\ y' &= y & t' &= px + qt \end{aligned} \tag{20}$$

Jetzt erinnern wir uns der Bedingung, die diese Gleichungen erfüllen sollen (Gl. 17/18). Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Transformationsgleichungen bewirken, daß für beliebige Koordinaten die Gleichung gilt:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = a(x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2),$$

in der a eine zunächst beliebige Konstante bedeutet.

Diese Gleichung ist, wie man sofort sieht, eine hinreichende Bedingung die Erfüllung der oben aufgestellten Forderung, sie ist aber auch eine

---

[1]) Das besagt also, daß in den Gleichungen S. 61 Anm. 2 auch die Konstanten b_1, c_1 und b_4, c_4 Null sind.

[2]) Das besagt, daß in obigen Gleichungen $b_2 = c_3$ sein muß.

notwendige Bedingung, wie sich durch mathematische Überlegungen erweisen läßt [1]), und ist somit ein vollgültiger Ersatz der ursprünglichen Bedingung.

Ausrechnung der Konstanten.

Nun liefert uns die Methode des Koeffizientenvergleichs [2]) die Konstante a und die noch zu bestimmenden drei Koeffizienten m, p, q. Wir führen die elementaren Rechnungen ohne weitere Erläuterungen durch:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$$
$$= a(m^2x^2 - 2m^2vxt + m^2v^2t^2 + y^2 + z^2 - c^2p^2x^2 - 2c^2pqxt - c^2q^2t^2)$$
$$= a(m^2 - c^2p^2)x^2 - 2a(m^2v + c^2pq)xt + a(m^2v^2 - c^2q^2)t^2 + ay^2 + az^2.$$

Der Vergleich von y und z liefert sofort:

$$a = 1.$$

Demnach bleiben die drei Gleichungen:

$$\text{I.} \quad m^2 - c^2p^2 = 1$$
$$\text{II.} \quad m^2v + c^2pq = 0$$
$$\text{III.} \quad m^2v^2 - c^2q^2 = -c^2$$
$$v \times \text{II.} \quad m^2v^2 + c^2vpq = 0$$
$$\text{III.} \quad m^2v^2 - c^2q^2 = -c^2$$
$$c^2vpq + c^2q^2 = c^2$$
$$vpq = 1 - q^2$$
$$p = \frac{1 - q^2}{vq}$$
$$\text{III.} \quad m^2 = \frac{c^2(q^2 - 1)}{v^2}$$
$$\text{I.} \quad \frac{c^2(q^2 - 1)}{v^2} - \frac{c^2(1 - q^2)^2}{v^2q^2} = 1$$
$$c^2q^4 - c^2q^2 - c^2 + 2c^2q^2 - c^2q^4 = v^2q^2$$
$$c^2q^2 - c^2 = v^2q^2$$
$$q^2 = \frac{c^2}{c^2 - v^2}$$
$$q = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

---

1) Zwei quadratische Formen derselben Veränderlichen können nur dann für unendlich viele Wertsysteme gemeinsam verschwinden, wenn sie sich nur durch einen konstanten Faktor unterscheiden.

2) Zwei ganz rationale Funktionen derselben Variabeln sind identisch gleich, wenn die Koeffizienten entsprechender Glieder einander gleich sind.

$$p = \frac{\frac{c^2 - v^2 - c^2}{c^2 - v^2}}{\frac{vc}{\sqrt{c^2 - v^2}}} = \frac{-v^2}{vc\sqrt{c^2 - v^2}} = -\frac{v}{c^2}\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$m^2 = \frac{c^2}{v^2}\frac{c^2 - c^2 + v^2}{c^2 - v^2} = \frac{c^2}{c^2 - v^2}$$

$$m = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Die von uns gesuchten Transformationsformeln sind dann die folgenden vier Gleichungen:

$$(22)\qquad \begin{array}{ll} x' = k(x - vt) & z' = z \\ y' = y & t' = k\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{array} \qquad k = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Man nennt die durch diese Gleichungen vermittelte Transformation eine „Lorentztransformation" im Gegensatz zu der durch die Gleichungen (1), die noch durch die vierte Gleichung $t' = t$ zu ergänzen sind, dargestellten „Galileitransformation". Man kann auf Grund dieser Gleichungen auch umgekehrt die ungestrichenen Koordinaten durch die gestrichenen ausdrücken, und dabei werden wir zu ganz entsprechenden Gleichungen geführt, in denen nur überall v durch $-v$ ersetzt ist, wie das ja auch physikalisch von vornherein zu erwarten ist. Beide Systeme sind ja an sich gleichberechtigt. Der einzige Unterschied ist, daß für den Beobachter in K sich K' in der positiven Richtung, also mit der Geschwindigkeit v, dagegen für den Beobachter in K' das System K sich in der negativen Richtung, also mit der Geschwindigkeit $-v$ bewegt. Wir schreiben diese inversen Gleichungen hin, ohne die zu ihnen führende (übrigens ganz elementare) Rechnung wiederzugeben:

$$\begin{array}{ll} x = k(x' + vt') & z = z' \\ y = y' & t = k\left(t' + \frac{v}{c^2}x\right). \end{array}$$

VII. Physikalische Bedeutung der Transformationsgleichungen und die ersten Folgerungen.

Bewegte Stäbe.

Wir wenden uns nun der Frage zu, was diese Gleichungen in physikalischer Hinsicht aussagen. Untersuchen wir zunächst die erste Gleichung. Zu diesem Zwecke wollen wir die Länge eines und desselben Stabes von beiden Systemen aus bestimmen. Er möge sich in System K' in Ruhe befinden, und die Koordinaten seines Anfangs- und Endpunktes seien in diesem System x'_1 und x'_2; die entsprechenden Punkte im System K zur Zeit t mögen x_1 und x_2 heißen. Dann hat er in K' die Länge $x'_2 - x'_1$ und in K die Länge $x_2 - x_1$. Um beide Längen miteinander vergleichen zu können, bilden wir deren Verhältnis $\frac{x'_2 - x'_1}{x_2 - x_1}$ und ersetzen die im Zähler stehenden Koordinaten des gestrichenen Systems durch die des ungestrichenen nach (22). Dann ist

$$\frac{x'_2 - x'_1}{x_2 - x_1} = \frac{k(x_2 - vt) - k(x_1 - vt)}{x_2 - x_1} = k.$$ [1])

k ist nun eine Größe, die zwar im allgemeinen von 1 nur äußerst wenig verschieden ist, aber doch um ein geringes größer ist als 1.[2]) Es ergibt sich somit, daß ein und derselbe in K' befindliche Stab, der in der Bewegungsrichtung liegt, in K' gemessen und in K gemessen, verschiedene Länge zeigt, und zwar erscheint er dem Beobachter in K kürzer als dem Beobachter in K'. Oder um es noch deutlicher zu machen: Denken wir uns einen Meterstab, den ein Beobachter in K auf seine Richtigkeit hin kontrolliert hat, einem im System K' befindlichen Be-

1) Scheinbar liefert der Bruch den Wert $\frac{1}{k}$, wenn man statt des Zählers den Nenner nach (23) umformt. Das ist aber ein Trugschluß, denn, wenn x_2 und x_1 die Endpunktskoordinaten zur Zeit t des ruhenden Systems sind, so sind t'_1 und t'_2 nicht gleich.

2) Für Näherungsrechnungen merken wir uns, daß

$$k = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} \quad \text{und} \quad \frac{1}{k} = \sqrt{1 - \frac{v_2}{c_2}} = 1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}$$

gesetzt werden dürfen.

obachter hinübergereicht. Dieser legt ihn in die Richtung der X'-Achse, und ein Beobachter aus K mißt nun noch einmal die Länge des Stabes nach, allerdings in der Weise, in der allein bewegte Körper gemessen werden können[1]), und findet, daß der Stab jetzt kürzer geworden ist. Seine Länge beträgt nur mehr $1/k$ m.

Hier kommen wir also auf Grund des Relativitätsprinzips und der Hypothese der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit zu demselben Ergebnis — und zwar auch numerisch zu demselben Ergebnis —, das Lorentz als eine besondere Hypothese zur Erklärung des Michelsonversuches eingeführt hatte. Die Relativitätstheorie liefert die Lorentzkontraktion.

Bewegte Uhren.

Sehen wir nun zu, was uns die Gleichungen über die Zeiten in den beiden Systemen lehren. Denken wir uns im Nullpunkt von K einen Beobachter, der ständig seine Uhr mit den vorübereilenden Uhren des Systems K' vergleicht. Die vierte unserer Formeln (22) lehrt uns dann, welche Zeiten die vorübereilenden Uhren zeigen müssen. x ist hier ständig gleich Null. Das zweite Glied in der Klammer kommt also nicht in Betracht. Zur Zeit $t = 0$ ist auch $t' = 0$, zeigt aber die Uhr in K $t = 1$, so zeigt die im selben Augenblick vorübergehende Uhr von K' $t' = k$, zu $t = 2$ gehört $t' = 2k$ usw. Das heißt also, da k größer ist als 1, so geht die Uhr im ruhenden System, die dauernd beobachtet wird, nach, verglichen mit den vorübereilenden Uhren des bewegten Systems, und zwar immer mehr nach, allerdings wiederum um einen ganz geringfügigen Betrag, solange nicht allzu ausgedehnte Zeitstrecken in Betracht kommen. Jedenfalls aber zeigen zwei Uhren am selben Orte, die sich in verschiedenem Bewegungszustande befinden, nur in einem einzigen Augenblick dieselbe Zeit. Diese Verhältnisse sollen durch unsere Fig. 11 verbildlicht werden. Man denke sich etwa fünfmal in Abständen von je $7\frac{1}{2}$ Minuten eine Momentaufnahme der ruhenden und gerade vorbeieilenden Uhr gemacht, und es wird die fünf aufeinanderfolgenden Bilder der Stellung der großen Uhr erhalten, wie sie unsere Figur zeigt, vorausgesetzt, daß man k durch sehr groß macht, daß man die Geschwindigkeit des vorüber-



Fig. 11.

[1]) Vgl. S. 52 ff.

eilenden Systems v der Lichtgeschwindigkeit stark annähert. Wir können uns diese vierte Formel aber noch in einer anderen Weise ausdeuten. Wir denken uns eine große Anzahl von Beobachtern in gleichen Abständen längs der X-Achse von K verteilt und lassen diese „gleichzeitig", d. h. wenn ihre Uhren dieselbe Zeit weisen, beobachten, was die jeweils gegenüberstehenden Uhren für eine Zeit zeigen. Der Bequemlichkeit halber lassen wir diese Beobachtung zur Zeit $t = 0$ ausführen, also wenn alle Uhren in K ihre Anfangsstellung innehaben. Dann müssen, wie die Formel, in der jetzt $t = 0$ und x von Stelle zu Stelle wachsend einzusetzen sind, zeigt, die in K' befindlichen Uhren um so weiter gegen ihre Anfangsstellung noch zurück sein, je weiter der Punkt vom Nullpunkt entfernt ist. Auch diese Verhältnisse erläutern wir wieder durch eine Figur (Fig. 12). Diesmal aber sind die fünf Momentaufnahmen als an verschiedenen Orten, aber zu gleicher Zeit in K gemacht vorzustellen.



Fig. 12.

Sehr wesentlich ist es nun, sich klarzumachen, daß ganz dieselben Verhältnisse für den Beobachter in K' bestehen. Auch ihm erscheint ein Stab, den er zuerst in seinem eigenen System gemessen hat und der dann in K in der X-Achse liegt, nunmehr verkürzt, auch ihm scheinen die Uhren in K, die an ihm vorbeieilen, gegen seine eigene Uhr vorzugehen (sie laufen natürlich für ihn in der entgegengesetzten Richtung; dieser Umstand hat ja aber wegen der Homogenität des Raumes weiter keine Bedeutung, als daß in den Formeln an Stelle von v der entsprechende negative Wert $-v$ zu setzen ist) und auch in K' würden Beobachter, die auf der X'-Achse in gleichen Abständen vom Nullpunkt in der Bewegungsrichtung aufgestellt wären, d. h. also in der Richtung der negativen X'-Achse, wahrnehmen müssen, daß bei gleichzeitiger Beobachtung nach ihren Uhren die Uhren von K nicht die gleiche Zeit zeigen.

Wir sehen also, daß zwei Ereignisse, die, nach Uhren von K untersucht, an zwei verschiedenen Punkten der X-Achse gleichzeitig vor gehen, mit Uhren des Systems K' bestimmt, nicht zur selben Zeit st finden. Die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse, die an v schiedenen Stellen des Raumes stattfinden, ist keine die Ereignissen absolut zukommende Eigentümlichkeit, vielm

ist diese Gleichzeitigkeit nur in einem einzigen unter unzählig vielen, gleichberechtigten Systemen vorhanden.

Eine weit sonderbarere und interessantere Konsequenz ist aber die folgende. Denken wir uns die X-Achsen unserer beiden Systeme aus zwei Latten bestehen, die mit Haken versehen sind, an die wir Uhren anhängen können. Zur Zeit $t = 0$ hängen wir die Uhr, die sich eben im Nullpunkt von K befand, an den Nullhaken von K', der sich ja dieser Uhr gerade gegenüber befindet, an und lassen nun die Uhr an der Bewegung von K' teilnehmen. Sie gehört nunmehr zu diesem System und wird, von K aus betrachtet, stets die Koordinate $x = vt$ haben. Daraus folgt, nach (22), daß zwischen ihrer Zeigerstellung und der jeweilig gegenüberliegenden Uhr in K folgende Beziehung besteht:

$$t' = kt\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

oder, indem wir den Wert für k aus (22) einsetzen:

$$(24) \qquad t' = t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{k}t = t\left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right),$$

d. h. die bewegte Uhr bleibt gegen die ruhenden Uhren zurück. Heben wir sie nun an irgendeiner Stelle, an der sie anlangt, wieder ab, so wird sie mit der dort befindlichen Uhr von K nicht übereinstimmen, sondern nachgehen. Es kommt also, wie man hieraus ersieht, durchaus nicht auf dasselbe heraus, ob man die Zeit an zwei verschiedenen Punkten eines Systems mit Uhren mißt, die „synchron" gestellt sind, oder mit Uhren, die an einer Stelle auf gleichen Gang reguliert sind und von denen die eine an den entfernten Ort gebracht wird.

Wir betrachten nun drei aus mit Haken versehenen Latten bestehende Koordinatensysteme K, K' und K'' und nehmen an, daß sich K' gegen K mit der Geschwindigkeit v bewegt, dagegen soll sich K'' gegen K mit der Geschwindigkeit $-v$ bewegen, d. h. also ebenso rasch, aber in der entgegengesetzten Richtung. Lassen wir nun genau wie vorhin von zwei ganz gleichen Uhren die eine im Nullpunkt von K ruhen, zweite aber von der Zeit $t = 0$ an sich mit dem Nullpunkt des emes K' mitbewegen, bis sie eine entfernte Stelle des Systemes reicht, an der ein Beobachter steht oder eine automatische Vorung sich findet, mit deren Hilfe die Uhr nunmehr an den augen- vorübereilenden Haken des Systemes K'' angehängt wird. Wir

lassen die Uhr nun mit K'' wieder zurückwandern bis zum Nullpunkt von K, wo wir sie nunmehr mit der Uhr vergleichen können, mit der sie ursprünglich übereinstimmte. Was werden wir finden müssen? Während des Hinweges geht die bewegte Uhr nach, während des Rückweges geht sie aber — auch nach. Denn auf die Bewegungsrichtung kommt es ja gar nicht an. Unter allen Umständen geht die bewegte Uhr nach, wie ja auch aus unserer Formel (24) hervorgeht, die ja v nur im Quadrat enthält, also vom Vorzeichen von v unabhängig ist. Die Uhr wird also, neben die Uhr, die in K geblieben ist, gelegt, eine Zeitdifferenz zeigen, sie wird nachgehen. Eine Uhr, die sich von einem Orte entfernt und nach einiger Zeit zu ihm zurückkehrt, zeigt also nicht dieselbe Zeit wie eine Uhr, die am Ort geblieben ist. Da aber die Uhr in jedem System, in dem sie sich gerade befand, die „richtige" Zeit zeigte, so müssen wir uns vorstellen, daß jeder Vorgang durch eine solche Hin- und Herbewegung verzögert wird. Wir können uns die Sachlage durch ein Beispiel besonders verdeutlichen, das zwischen Scherz und Ernst die Mitte hält und die Schwierigkeiten gut erkennen läßt, die den verschiedenen Begriffen des Wortes Zeit anhaften. Denken wir uns zwei ganz gleichaltrige Menschen in einem Häuschen auf einem Galileischen Bezugssystem wohnen. Dann lassen wir den einen von beiden eine Reise unternehmen. Er fahre mit einem D-Zug in der Richtung der X-Achse zu Verwandten und kehre nach einiger Zeit zu seinem Freunde zurück. Besaßen beide richtiggehende Taschenuhren, so muß jetzt die Uhr dessen, der die Reise unternommen hat, nachgehen. Da sie aber für ihn stets richtigen Gang, d. h. dieselbe Ganggeschwindigkeit wie alle anderen Uhren des Systems, in dem er sich gerade befand, gehabt hat, so müssen wir wohl oder übel auch sagen, daß der zurückgekehrte Freund nunmehr jünger ist als der daheimgebliebene, denn seine Taschenuhr kann er zwar durch einen gewaltsamen Eingriff wieder mit der seines Freundes in Übereinstimmung bringen, nicht aber die Gesamtheit der körperlichen Umstände, die wir im physiologischen Sinn als sein Alter bezeichnen, auch nicht die Tatsache, daß eine richtiggehende Uhr, die er ständig bei sich getragen hat, den Verlauf einer kürzeren Zeit seit seiner Geburt verzeichnet als bei seinem Freunde.

Widerlegung eines Einwurfs gegen die Relativitätstheorie.

Auf diese Uhrendivergenz ist übrigens ein oft wiederholter Einwand gegen die Relativitätstheorie gestützt worden, den wir hier besprechen wollen. Man hat nämlich gesagt: Denken wir uns bei jeder der beiden Uhren, die sich gegeneinander bewegen, je einen Beobachter, dann werden beide Beobachter nur ihre Relativbewegung gegeneinander beobachten. Man kann sich also ebensogut auf den Standpunkt des bewegten Beobachters stellen, und dann wird die ruhende Uhr eine Bewegung auszuführen scheinen. Nach der Relativitätstheorie müßte dann das Ergebnis dieser Relativbewegung für den einen Beobachter dasselbe sein wie für den anderen. In der Tat aber geht doch von den wieder vereinigten Uhren die eine nach, die andere vor. Derselbe Vorgang führt, von zwei Systemen aus beobachtet, zu verschiedenen Ergebnissen, der eine muß sagen: bewegte Uhren gehen vor, der andere: sie gehen nach, und somit hebt sich die Relativitätstheorie an dieser Stelle selber auf.

Der Einwand ist aber falsch. Denn der eine der beiden Beobachter befindet sich während der ganzen Dauer des Vorganges in einem Galileischen oder Inertialsystem, der andere dagegen nacheinander in zwei verschiedenen Systemen, wie das aus unserer Darstellung mit den Latten ganz klar hervorgeht. Zwar in jedem Augenblick, mit Ausnahme der Übergangszeiten, befindet sich auch der zweite Beobachter in einem berechtigten Koordinatensystem, nicht aber die ganze Zeit über in einem berechtigten Koordinatensystem. Die Relativitätstheorie sagt aber nichts darüber aus, wie sich die Naturvorgänge auf einem Koordinatensystem darstellen, das nacheinander mit verschiedenen der berechtigten Systeme zusammenfällt. Es spielen eben in diese Vorgänge Beschleunigungen hinein, und damit überschreitet dieses Problem den Rahmen derjenigen Relativitätstheorie, die wir hier behandelt haben, die heute [illegible]n den Namen der speziellen Relativitätstheorie führt, d weist auf eine Verallgemeinerung hin, die in der allergsten Zeit auch in Angriff genommen worden ist, auf eine allmeine Relativitätstheorie, die auch beschleunigte Koordiensysteme zu berücksichtigen vermag und innerhalb deren auch das liegende Problem seine eigentliche und befriedigende Lösung findet.

VIII. Das Additionstheorem der Geschwindigkeiten.

Die Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit.

Wir wenden uns nun einigen anderen Ergebnissen der Relativitätstheorie zu, die sich ebenfalls ohne Schwierigkeit aus den Transformationsgleichungen ableiten lassen. Die Gleichungen lehren uns nämlich, daß, wenn ein berechtigtes Koordinatensystem K vorliegt, jedes andere berechtigte System gegen dieses eine Geschwindigkeit haben muß, die kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit. Würde nämlich $v = c$ werden, so würde der Faktor k unendlich groß werden. Nun ist aber k nach S. 66 der Quotient aus der Länge eines bewegten Stabes, im bewegten System gemessen, und der Länge desselben Stabes, im ruhenden System gemessen. Wird k unendlich, so heißt das, daß die Länge des bewegten Stabes für den ruhenden Beobachter auf Null zusammenzuschrumpfen scheint. Der Stab müßte also völlig verschwinden, und das können wir aus physikalischen Gründen kaum als zulässige Annahme gelten lassen. Wenn v gar c an Größe übersteigen würde, so bekäme der Ausdruck $1 - v^2/c^2$ einen negativen Wert, und die Wurzel verliert dann jede reelle Bedeutung. Das führt uns aber sofort zu einer weiteren sehr bedeutsamen Folgerung. Unter Zugrundelegung der Galileitransformation, also im Rahmen der Anschauungen Newtons, ist es möglich, durch Zusammensetzung kleiner Geschwindigkeiten zu beliebig großen Geschwindigkeiten zu gelangen. Denke ich mir etwa einen Dampfer mit der Geschwindigkeit v fahrend und auf ihm einen Menschen in der Fahrtrichtung mit der Geschwindigkeit q laufend, so ist die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Menschen gegenüber dem Ufer $v + q$. Ein anderes Ergebnis erhalten wir aber, wenn wir uns auf den Boden der Relativitätstheorie stellen. Denken wir uns also wieder unsere zwei Koordinatensysteme K und K'. K entspreche dem Ufer und K' dem Dampfer. Ferner denken wir uns einen Körper, der sich gegen K' in der Richtung der positiven X-Achse mit der Geschwindigkeit q bewegt. Wir fragen nach der Geschwindigkeit Q, mit der sich derselbe Körper relativ zu K bewegt. Die Antwort entnehmen wir unsere Transformationsgleichungen. Wenn der Körper in K' die Geschwindigkeit q hat, so können wir das auch durch die Gleichung

$$x' = qt'$$

zum Ausdrnck bringen. Andererseits ist bei Benutzung der Transformationsgleichungen (23)

$$Q = \frac{x}{t} = \frac{k(x' + vt')}{k\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right)}.$$

Ersetzen wir hierin x' durch qt', so können wir durch kt' heben und erhalten die Gleichung:

(25) $$Q = \frac{q + v}{1 + \frac{qv}{c^2}}$$

als das in der Relativitätstheorie gültige Additionstheorem der Geschwindigkeiten. Wir sehen, daß sich dieser Ausdruck von dem in der Newtonschen Mechanik gültigen durch den Faktor $1/(1 + qv/c^2)$ unterscheidet, eine Größe, die wiederum von 1 nur sehr wenig verschieden ist, solange q und v beide sehr klein gegen c sind. Erst bei großen Geschwindigkeiten wird der Unterschied erheblich. Dann verhindert dieser Faktor aber, daß Q jemals größer wird als c, wenn nur q und v beide kleiner sind als c. Um das einzusehen, ist es nur notwendig, für q und v die Ausdrücke $c - a$ und $c - b$ einzusetzten, in denen a und b positive Zahlen sein sollen. Wenn wir das tun, ergibt die Ausrechnung:

$$Q = c\frac{2c - a - b}{2c - a - b + \frac{ab}{c}},$$

eine Größe, die sicher kleiner ist als c, da der Nenner des Bruches größer ist als sein Zähler. In Worten besagt das also, daß wir durch Zusammensetzung zweier Unterlichtgeschwindigkeiten niemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen können. Setzen wir aber die Lichtgeschwindigkeit selbst mit einer kleineren Geschwindigkeit zusammen, so zeigt unsere Formel (25), wenn wir in ihr z. B. q und c ersetzen, daß die Gesamtgeschwindigkeit auch wieder c ist. Durch Hinzufügen einer endlichen Geschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit wird diese also nicht vergößert Ein Ergebnis, das ja eine andere Formulierung der Grundvoraussetzung der Theorie daß die Lichtgeschwindigkeit in allen berechtigten Systemen dieselbe soll.[1])

[1]) Nan kann sagen, daß die Lichtgeschwindigkeit in der Relativitätstheorie aynliche Rolle spielt, wie sie dem Unendlichen in der Mathematik zu-

Wenn es nun auch kein berechtigtes Koordinatensystem gibt, das gegen ein anderes berechtigtes sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, und somit auch keinen Körper geben kann, der diese Geschwindigkeit erreicht, weil wir uns mit jedem Körper ein Koordinatensystem verbunden denken könnten und ein so schnell bewegter Körper ja bis auf die Länge Null verkürzt werden würde, so können doch wenigstens Ausbreitungsvorgänge diese Geschwindigkeit erreichen, wie ja das Licht tatsächlich sich mit dieser Geschwindigkeit fortpflanzt. Allerdings müssen wir auch für alle solchen Vorgänge annehmen, daß sie die Geschwindigkeit c wenigstens nicht übersteigen können. Folgende Überlegungen werden uns davon überzeugen. Denken wir uns zwei Ereignisse A und B. A soll zur Zeit $t = 0$ im Nullpunkt von K stattfinden und B zur Zeit $t = T$ im Abstande X vom Nullpunkt auf der X-Achse. Die x- und t-Koordinaten beider Ereignisse in K und einem dazu bewegten System K' ergeben sich dann aus nebenstehender Tabelle. Nun nehmen wir an, daß sowohl X als T positiv seien, d. h. daß B in K an einer positiven Stelle der X-Achse und später stattfindet als A. Schreiben wir nun den Ausdruck für das auf B bezügliche t' in folgender Form:

	x	t	x'	t'
A	0	0	0	0
B	X	T	$k(X - vT)$	$k\left(T - \frac{v}{c^2}X\right)$

$$t'_B = kT\left(1 - \frac{v}{c^2}\frac{X}{T}\right)$$

und nehmen ferner an, daß

$$\frac{X}{T} > c, \tag{26}$$

so können wir stets ein v, das kleiner als c ist, finden, so daß

$$v\frac{X}{T} \geqq c^2 \quad \text{oder} \quad 1 - \frac{vX}{c^2T} \leqq 0.$$

Das bedeutet aber, daß das auf B bezügliche t' Null oder kleiner als Null wird. Wir können somit unter der Bedingung (26) immer ein

kommt. Die Zusammensetzung noch so vieler endlicher Größen ergibt nie das Unendliche, und durch Hinzufügen einer endlichen Größe zum Unendlichen wird dieses auch nicht vergrößert.

zu K mit einer solchen Geschwindigkeit bewegtes Koordinatensystem finden, daß in ihm das Ereignis B mit dem Ereignis A gleichzeitig erscheint oder in ihm sogar vorangeht. Nehmen wir aber die entgegengesetzte Bedingung an, also

$$\frac{X}{T} < c,$$

so würde es nicht möglich sein, eine solche Geschwindigkeit zu finden, es würde also für alle nur denkbaren Koordinatensysteme B später sein als A. Setzen wir nun den Fall, daß das Ereignis B durch das Ereignis A verursacht worden ist, so wollen wir annehmen, daß dieser Zusammenhang für alle Systeme gültig ist, daß es also nicht möglich sein soll, ein Koordinatensystem ausfindig zu machen, in dem beide Ereignisse zusammenfallen oder gar B dem A vorangeht. Dann besteht aber für die Zeit T, um die das Ereignis B später stattfindet als A, und die Entfernung X, die es von A trennt, die obige Bedingung. Wenn aber B durch A verursacht ist, so ist T die Zeit, die die Wirkung braucht, um bis in die Entfernung X zu gelangen. X/T ist also die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Vorganges, durch den B als eine Wirkung von A hervorgerufen wird. Somit kann also die Ausbreitungsgeschwindigkeit irgendeines Vorganges die Lichtgeschwindigkeit nicht übertreffen.

Sicherlich wird sich nach all diesen Überlegungen manchem meiner Leser die Frage aufgedrängt haben, woher es kommt, daß in der Relativitätstheorie, die doch für alle Vorgänge Geltung beansprucht, eine, wie es scheint, ganz spezielle Größe, die Lichtgeschwindigkeit, eine so ausgezeichnete Rolle spielt, daß sie sogar in die Transformationsgleichungen eingeht. Die Frage ist sehr berechtigt, aber auch leicht beantwortet. Nur die historische Entwicklung bringt es mit sich, daß wir diese Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit nennen. Im Gedankengang unserer Theorie würde es liegen, c als die durch die Natur gegebene Grenzgeschwindigkeit zu bezeichnen und zu sagen, daß es Vor-nge gibt, die mit der Grenzgeschwindigkeit sich ausbreiten, z. B. das ht. Also nicht die Lichtgeschwindigkeit ist die Grenzgeschwindigkeit, ndern umgekehrt die Grenzgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des ichtes, und daß eine so bedeutungsvolle Größe wie die Grenzgeschwindigkeit in die Transformationsgleichungen eingeht, das wird wohl emandem mehr verwunderlich erscheinen.

Der Fizeauversuch.

Wir haben es nun allerdings nur in sehr wenigen Fällen mit Geschwindigkeiten zu tun, die so groß sind, daß der Unterschied des Additionstheorems für die Geschwindigkeiten nach der älteren Anschauung und nach der Relativitätstheorie zum Vorschein käme. Aber einer dieser Fälle ist doch sehr bemerkenswert. Das Ergebnis des Fizeauversuches nämlich, das in der älteren Physik immerhin komplizierte Annahmen zu seiner Erklärung verlangte, wird auf dem Boden der Relativitätstheorie geradezu zum Schulbeispiel für das Additionstheorem. Wir haben zwar bei unserer Ableitung der Formel für das Additionstheorem angenommen, daß q eine Körpergeschwindigkeit sei. q darf aber ebensogut eine Ausbreitungsgeschwindigkeit sein, wenn diese nur kleiner ist als c. Wenden wir also die Formel (25) auf den Fizeauversuch an. Die Lichtgeschwindigkeit im ruhenden Wasser ist c/n. Diese Größe möge dem q unserer Formel entsprechen. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers sei v. Lassen wir nun, wie beim Fizeauversuch, das Licht durch das Wasser in seiner Bewegungsrichtung hindurchgehen, so addieren sich die beiden Geschwindigkeiten, und wir finden als die Geschwindigkeit des Lichtes im bewegten Wasser vom ruhenden Boden aus beobachtet:

$$C = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{cn}}.$$

Nun ist v/c eine gegen 1 sehr kleine Zahl, so daß wir die höheren Potenzen gegen die niederen vernachlässigen können. Entwickeln wir den Ausdruck durch Ausführung der Division in eine Reihe, so heißen die ersten Glieder:

$$C = \frac{c}{n} + v - \frac{v}{n^2} - \frac{v^2}{cn} - \cdots$$

Hier sind die Glieder vom vierten ab, den drei ersten gegenüber, so klein, daß wir sie vernachlässigen dürfen, und so erhalten wir die Formel:

$$C = \frac{c}{n} + v\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).^{1})$$

Die Relativitätstheorie liefert also ohne weiteres den Fresnelschen Mitführungskoeffizienten. Man wird nicht umhinkönnen, die

1) Vgl. Formel (4) S. 31.

Umstand als eine der bemerkenswertesten Tatsachen aus dem Gebiet der Erfahrungen anzuerkennen, die zur Bestätigung der Relativitätstheorie herangezogen werden können.

Aberration und Dopplerprinzip.

Wir zeigen nun noch rasch, wie sich die Erscheinungen der Aberration und das Dopplerprinzip auf Grund der Relativitätstheorie darstellen. Wir schließen uns hierbei eng an die entsprechenden Darstellungen auf den S. 35—39 an. Nur müssen wir jetzt natürlich vom Äther völlig absehen. Zur rechnerischen Behandlung der Aberration stellen wir uns also vor, unser System K sei mit dem Fixstern fest verbunden und das System K' sei das Erdsystem. Für den Weg des Lichtstrahls in K gelten dann die Gleichungen (5) (6) S. 31/32. Wir wenden aber jetzt nicht die Gleichungen der Galileitransformation auf sie an, sondern die der Lorentztransformation S. 65 (22) und erhalten:

$$x' = k(a - vt)$$
$$y' = b - ct$$

und wiederum durch Elimination von t aus beiden Gleichungen als Gleichung des Weges des Lichtstrahles:

$$y' = \frac{c}{kv}\left[x' - k\left(a - \frac{bv}{c}\right)\right]. \tag{27}$$

Da nun k eine nur sehr wenig von 1 verschiedene Größe ist, so unterscheiden sich auch die hier gefundenen Werte für den Aberrationswinkel und den Schnittpunkt mit der X-Achse um sehr wenig von den früher auf Grund der Ättertheorie gefundenen, wie ein Vergleich der Gleichungen (27) und (8) zeigt, jedenfalls um so wenig, daß der Unterschied der beiden Werte innerhalb des Genauigkeitsbereichs unserer Messungen keine Rolle spielt.

Ganz ebenso leicht erledigt sich der Dopplereffekt. Wir gehen aus von der Gleichung (9):

$$y = a \sin\left[2\pi n\left(t - \frac{x}{c}\right)\right],$$

wir auf S. 34 näher erläutert haben, und formen sie wieder ganz an jener Stelle um, nur daß wir jetzt statt der Galileitransfor- ion die Gleichungen der Relativitätstheorie benutzen. Auf diese [illegible] erhalten wir:

$$y' = a \sin\left[2\pi n k\left(t' + \frac{v}{c^2}x' - \frac{x'}{c} - \frac{v}{c}t'\right)\right]$$

$$= a \sin\left[2\pi n k\left(t'\frac{c-v}{c} - x'\frac{c-v}{c^2}\right)\right]$$

$$= a \sin\left[2\pi n k \frac{c-v}{c}\left(t' - \frac{x'}{c}\right)\right]$$

$$= a \sin\left[2\pi n' \left(t' - \frac{x'}{c}\right)\right]$$

und finden, daß $$n' = nk\frac{c-v}{c}$$

sich von dem früher gefundenen Wert (12) nur durch den Faktor k unterscheidet, dessen geringe Verschiedenheit von 1 es wiederum bewirkt, daß der Unterschied für uns unmerklich wird. Die Lichtgeschwindigkeit dagegen ist, wie die Rechnung zeigt und das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit fordert, in beiden Systemen die gleiche, während die Rechnung bei Annahme des ruhenden Äthers (13) sie zu $c - v$ geliefert hatte.

IX. Einige weitere wichtige Folgerungen aus der Relativitätstheorie.

Wir haben nun noch einige wichtige Ergebnisse der neuen Theorie zu besprechen, die wir aber mit dem elementaren mathematisch-physikalischen Rüstzeug, auf das wir uns hier beschränken, nicht mehr abzuleiten vermögen.[1])

1) Der Leser, der über die nötigen mathematisch-physikalischen Kenntnisse verfügt, wird, wenn er den Grundgedanken der Theorie begriffen hat, die hierhergehörigen Ableitungen leicht den ersten von Einstein über diesen Gegenstand veröffentlichten Aufsätzen entnehmen. Diese ersten Aufsätze, die in den Annalen der Physik Bd. 17 (1905) erschienen sind, sind für denjenigen, der sich nur mit den prinzipiellen Fragen vertraut machen will, auch heute noch die empfehlenswerteste Lektüre, schon weil sie nicht verlangen, daß man sich erst mit einer neuen Schreibweise aller physikalischen Gleichungen vertraut macht, die allerdings der Entwicklung der Theorie äußerst förderlich gewesen ist. Sie sind zusammen mit einschlägigen Aufsätzen von Lorentz und Minkowski als Bd. 2 der Fortschritte der mathematischen Wissenschaften erschienen und dadurch bequem zugänglich geworden.

Die Mechanik.

Die bisher betrachteten Folgerungen waren im allgemeinen kinematischer Natur. Wir wenden uns jetzt den eigentlichen physikalischen Fragen zu. Hier ist es nun von vornherein klar, daß die Relativitätstheorie uns nur sehr wenig Neues über das Gesamtgebiet der Elektrodynamik lehren kann, denn aus diesem Gebiet ist sie hervorgewachsen, auf das hier vorliegende Tatsachenmaterial hat sie sich gestützt. Anders liegt die Sache aber namentlich für die Mechanik, und zwar speziell für die Dynamik. Hatten früher die Physiker die Hoffnung gehegt, die ganze Welt dermaleinst mechanisch zu erklären, die Elektrodynamik als ein Spezialgebiet der Mechanik darstellen zu können, so haben sich die Dinge längst umgekehrt. Worüber wir am besten unterrichtet sind, das sind die Gesetze des elektrischen Feldes[1]), und eher erwarten wir jetzt, die Mechanik dereinst auf die Elektrodynamik zurückzuführen, als umgekehrt. Auch für die relativistische Behandlung der Dynamik führte der Weg von den Gleichungen des elektrischen Feldes zu denen der Dynamik. Sehen wir zu, welche Aufgabe der Relativitätstheorie hinsichtlich der Mechanik gestellt war. Die Gleichungen der Mechanik, so wie sie von Newton aufgestellt und durch die folgenden Physikergenerationen umgeprägt worden sind, genügen der auf die Lorentztransformation gestützten Relativitätsforderung nicht. Sie haben sich aber auf allen Gebieten mechanischer Vorgänge in solchem Maße bewährt, daß die Relativitätstheorie diesen Gleichungen keinesfalls schlechthin widersprechen darf. Allerdings handelt es sich bei allen durch die klassische Mechanik erklärten Vorgängen um Bewegungen mit Geschwindigkeiten, die sehr klein sind gegen die Lichtgeschwindigkeit. Und so ergab sich denn für die Relativitätstheorie die Aufgabe, Gleichungen aufzustellen, die einerseits bei den Lorentztransformationen ungeändert bleiben, also in allen berechtigten Koordinatensystemen die gleiche Gestalt bewahren, die aber anderseits für kleine Geschwindigkeiten in die gewöhnlichen Gleichungen der Newtonschen Mechanik übergehen.

Aber wie schon gesagt, die Dynamik mußte jetzt auf elektrodyna-

[1]) Unter elektrischem Feld versteht man den Raum, in dem elektrische Kräfte wirksam werden, sobald ihnen ein Angriffsgegenstand geboten wird. Jeder elektrisch geladene Körper ist von einem elektrischen Felde umgeben.

mischem Boden behandelt werden, denn die ganze Newtonsche Begriffswelt ist für die Relativitätstheorie unannehmbar. Weder weiß sie etwas mit dem „starren Körper" anzufangen, der in der klassischen Mechanik eine so große Rolle spielt, denn jeder bewegte Körper erfährt ja die Lorentzkontraktion (S. 67), kann also nicht starr sein, noch vermag sie sich mit den Fernkräften der Newtonschen Theorie zu befreunden, da ihnen eine unendlich große Ausbreitungsgeschwindigkeit zukommen würde, die im Rahmen dieser Theorie nicht geduldet werden kann. Sollte also überhaupt ein Ansatz gemacht werden, so konnten nicht irgendwelche Kräfte berücksichtigt werden, sondern man mußte sich an bestimmte Kräfte halten, und was lag da näher, als die Einwirkung elektrischer Kräfte auf bewegliche Massen zugrunde zu legen. Schon lange hatte man die Gesetze der Elektronenbewegung im elektrischen Felde studiert. Während man aber früher diesen Untersuchungen die mechanischen Gleichungen zugrunde legte und damit in mancherlei Schwierigkeiten gekommen war, verfuhr man nunmehr umgekehrt. Man legte die bekannten Gesetze der Elektronenbewegung, die auch der Relativitätsforderung genügen, den Bewegungen der Massenpunkte zugrunde und kam auf diese Weise zu bemerkenswerten Ergebnissen. Dieser Weg muß ja auch deshalb zu annehmbaren Resultaten führen, weil man jeden Massenpunkt durch Zusatz einer kleinen elektrischen Ladung zu einem Ding auszugestalten vermag, dessen Bewegung im elektrischen Feld unter dem Einfluß elektrischer Kräfte völlig der Bewegung eines Elektrons entspricht. So mußte die Mechanik aus ihrer Einzelstellung gezogen werden und viel enger mit den übrigen Gebieten der Physik verknüpft werden, als es bis dahin der Fall gewesen war.

Masse und Energie.

Das interessanteste und bei weitem wichtigste Ergebnis, zu dem diese Untersuchungen geführt haben, ist die Aufstellung eines Zusammenhanges zwischen der Masse und der Energie eines Körpers. Die ausgeführten Rechnungen zeigten nämlich, daß ein Energiequantum, in seinem Ruhesystem gemessen den Wert E hat, in einem System gegenüber es mit der Geschwindigkeit q bewegt ist, den Betrag $\frac{1}{\sqrt{1-}}$

d. i. in erster Näherung gleich $E\left(1+\frac{1}{2}\frac{q^2}{c^2}\right)$ hat.[1]) Das führt uns zu folgender Betrachtung. Nehmen wir an, daß die gesamte in einem bestimmten Körper aufgespeicherte Energie in seinem Ruhesystem gemessen den Wert E habe. Sie kann sich aus allerhand verschiedenen Arten von Energie zusammensetzen, aus elektrischer, magnetischer, elastischer und Wärmeenergie einerseits, aus den Energien, die im Zusammenhalt der Moleküle und Atome enthalten sind, andererseits. Diese letzteren Energien werden den weitaus größten Anteil an der Gesamtenergie des Körpers haben. Denn die neueren Untersuchungen über den Zerfall radioaktiver Körper haben uns gelehrt, wie ungeheure Energien beim Atomzerfall frei werden. Betrachten wir nun dieses Energiequantum von einem System aus, dem gegenüber der Körper mit der Geschwindigkeit q bewegt ist, so erscheint seine Gesamtenergie um den Betrag $\frac{1}{2}\frac{E}{c^2}q^2$ vergrößert. Nun hat auch nach der älteren Lehre der Körper in diesem System eine größere Energie als in seinem Ruhesystem. Es kommt nämlich jetzt noch die Bewegungsenergie des Körpers hinzu, deren Größe $\frac{1}{2}mq^2$ beträgt. Es leuchtet nun unmittelbar ein, daß sich diese kinetische Energie als die Vergrößerung der Gesamtenergie auffassen läßt, wenn man die Annahme macht, daß $m=\frac{E}{c^2}$ ist, d. h. daß die Masse eines Körpers, also der Widerstand, den er seiner Bewegung entgegensetzt, von der in ihm angehäuften Energie herrührt. $\frac{1}{c^2}$ wäre dann das Massenäquivalent der Energie oder c^2 das Energieäquivalent der Masse. 1 g Masse würde also gleichbedeutend sein mit 900 Trillionen Erg oder ungefähr $9\cdot 10^6$ t. km. Die in einem Körper von 1 g Masse aufgestapelte Energie würde also hinreichen, um eine Last von 1 Million Tonnen auf den höchsten Berg der Erde (9000 m) zu heben. Diese ungeheure Umrechnungszahl macht es verständlich, daß wir die Massenvermehrung, die ein Körper z. B. durch Erwärmung erfährt, nicht beobachten können.

---

[1]) Genau genommen läßt sich theoretisch nur zeigen, daß die Energieverminderung oder -vermehrung vom andern System aus in der oben angegebenen Weise beurteilt wird. Der Schluß auf die Energie überhaupt ist dann aber nahe, da man sie sich doch durch allmähliches Anwachsen entstanden vorstellen kann.

Macht man diese Annahme, so hört natürlich der Satz von der Erhaltung der Masse auf, eine selbständige Bedeutung zu haben, und geht auf im Satze von der Erhaltung der Energie. Die Masse ist ja nur eine Form, in der sich das Vorhandensein von Energie bemerklich macht, und wir würden auf diese Weise folgenden Fortschritt unserer Erkenntnis erzielen. Bisher waren wir stets nur in der Lage, die Energie eines Körpers bis auf eine Konstante, die unbekannt blieb, zu bestimmen, z. B. die Molekularenergie entzog sich unserer Messung. Nunmehr würden wir imstande sein, die Gesamtenergie eines Körpers festzustellen, da die, in anderer Weise unmeßbare, im Körper verborgene Energie jetzt durch ihre Trägheit, und zwar sehr genau, bestimmt werden kann. Die kinetische Energie aber kann fernerhin nicht als eine besondere Art der Energie gelten. Sie ist nur der Ausdruck für die Änderung, die die Gesamtenergie durch den Bewegungszustand erleidet. Alle Energiearten des Körpers wachsen durch seine Bewegung, und dieser Zuwachs an Energie wird durch die kinetische Energie dargestellt. Es würde ja auch in sich unhaltbar sein, die Masse als eine Form der Energie darzustellen und gleichzeitig eine Energieart anzuerkennen, die ihren Grund in der bewegten Masse hätte.

X. Bedeutung der Relativitätstheorie für die Physik und Philosophie.

Nachdem wir uns mit den Gedankengängen vertraut gemacht haben, die zu der neuen Theorie geführt haben, diese Theorie selbst erläutert und einige ihrer wichtigsten Folgerungen besprochen haben, wollen wir uns auch die Frage stellen, welche allgemeine Bedeutung dieser Theorie zukommt. Denn sicher ist es nicht ohne Grund, daß die neue Theorie die besondere Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich zieht. Es handelt sich bei ihr um keine besonders interessante Spezialfrage, sondern um eine Theorie, die für die ganze Physik grundlegend ist. Auch erhebt sie den Anspruch, für alle Gebiete der Physik gültig zu sein. Wir haben früher von einem Relativitätsprinzip der Mechanik gesprochen. Man darf aber nicht glauben, daß dieses neben dem neuen Relativitätsprinzip seine Gültigkeit behält, so etwa, daß das eine für die Mechanik, das andere

für die Elektrodynamik bestünde, vielmehr ist auch für die Mechanik die Galileitransformation durch die Lorentztransformation abgelöst und ersetzt, die ja übrigens für kleine Geschwindigkeiten in die erstere übergeht.

Der gedankliche Anschluß.

Überdenken wir nun rückschauend noch einmal all die neuen Gedanken und Ergebnisse, denen wir begegnet sind, so mag der Eindruck vorwalten, daß wir es hier mit einer alles umwälzenden Theorie zu tun haben, mit einem völligen Abweichen aus der bisherigen Bahn des physikalischen Denkens. Sieht man aber genauer zu, so wird man diesen Eindruck *nicht* bestätigt finden. Stets führt der Fortschritt der Wissenschaften von den absoluten Aufstellungen zu der Einsicht von der Relativität und Bedingtheit unserer Feststellungen. Und von Kopernikus führt ein gerader Gedankenzug zu Einstein. Hatte sich die Menschheit einmal von dem Gedanken losgesagt, daß sie der Pol der Welt sei, daß Sonne und Sterne sich um die Erde drehen, so hatte sie erst recht keinen Grund, andere Koordinatensysteme endgültig als die absolut ruhenden anzusehen. Gewiß hat sie sich nur schrittweise von dem Absoluten getrennt. Sah sie zunächst in der Sonne das absolut ruhende Gestirn, so wählte sie später das Fixsternsystem als grundlegendes Koordinatensystem. Jedenfalls bot aber die Newtonsche Mechanik, wie wir sahen, die Mittel, um die Relativität aller reinen Bewegungsvorgänge und Bewegungsgesetze zu proklamieren, soweit Beschleunigungen aus dem Spiel bleiben. Nur unter dem Zwange der sonderbaren Ergebnisse der Elektrodynamik fand man sich mit einer neuen Theorie ab, die wieder eine *absolute* Bewegung im physikalischen Sinne anerkannte und als eine Bewegung gegen den ruhenden Äther definierte. Muß es nicht als eine Rückkehr zu den besten Traditionen naturwissenschaftlicher Bestrebungen erscheinen, wenn es Einstein gelang, auch hier das Absolute aus dem Sattel zu heben und die Relativität an seine Stelle zu setzen? Noch dazu ein Absolutes, das dazu verurteilt war, stets unerforschlich in seiner Absolutheit zu sein. Denn so hieß es ja: Es gibt zwar eine absolute Bewegung der Körper gegen den Äther, aber diese Bewegung muß stets unerkennbar bleiben, weil durch die Kontraktion der Körper in der Bewegungsrichtung gerade alle Wirkungen kompensiert wer-

den, durch die die Bewegung festgestellt werden könnte. Es wird wohl nur weniger Jahrzehnte bedürfen, und die heute noch umstrittene Relativitätstheorie wird als etwas so Natürliches und Selbstverständliches gelten, wie es uns heute der Umlauf der Erde um die Sonne ist.

Abänderung der Naturgesetze.

Wir haben nun manchmal davon gesprochen, daß die Relativitätstheorie diesem oder jenem Naturgesetz eine andere Form gegeben hat, z. B. den Grundgesetzen der Mechanik. Ist denn das möglich? Werden uns denn die Naturgesetze nicht von der Natur vorgeschrieben? Ja und nein. Die Erfahrung, der Versuch liefert uns bestimmte Zahlenreihen, es ist unsere Aufgabe, einen mathematischen Zusammenhang zwischen je zwei solchen Zahlenreihen herzustellen, die wir aufeinander beziehen wollen. Nun gibt es aber für alle unsere Beobachtungen eine Grenze der Genauigkeit, über die wir nicht hinauskönnen. Wir können diese Grenze mit der Zeit immer weiter verschieben, wir können unsere Beobachtungen immer mehr verfeinern, wir können aber niemals zu absolut genauen Beobachtungen vordringen. Somit können also auch die Zahlenreihen, die durch eine mathematische Formel aufeinander bezogen werden sollen, als in gewissen Grenzen schwankend und beliebig angesehen werden, und es können somit mehrere, prinzipiell unendlich viel verschiedene Formeln angegeben werden, die zwischen den beiden Zahlenreihen eine Beziehung herstellen, d. h. wir können Naturgesetze sehr verschiedener Form aufstellen, die den Beobachtungen genügen und unsere Erfahrungen zureichend erklären. Unter allen diesen möglichen Zusammenhängen wird man sich natürlich stets die einfachste Formel aussuchen, die mit allen in Betracht kommenden Umständen verträglich ist. Die Relativitätsforderung soll nun eine der Grundlagen sein, mit der sich alle Naturgesetze im Einklang halten müssen. So wird sie zu einem Auswahlprinzip möglicher Naturgesetze. Die Naturgesetze müssen alle in eine solche Form gebracht werden, daß sie kovariant[e] der Lorentztransformation sind, d. h. daß sie nach der Transfo[r]mation von einem System auf das andere in der gleichen Gestu[lt] erscheinen. Es versteht sich hiernach von selbst, daß die zahlenmäßigen Ergebnisse der verschiedenen möglichen Naturgesetze st[e]

nur wenig voneinander abweichen können, wie wir denn ja auch fordern müssen, daß die von der Relativitätstheorie angegebenen Gesetze für kleine Geschwindigkeiten in die wohlerprobten Formeln der klassischen Physik übergehen. So vermag die Relativitätstheorie manche Erscheinungen, so namentlich den Michelsonversuch, zu erklären, ohne mit anderen Erfahrungen, die auch durch die früheren Annahmen erklärt werden konnten, in Widerspruch zu geraten, wie wir das etwa bei der Aberration und dem Dopplereffekt gesehen haben.

Philosophische Bedeutung.

Es wird niemanden wundernehmen können, daß eine Theorie von solcher Tragweite auch in den philosophischen Kreisen Aufmerksamkeit erregt hat, zumal es den Anschein hatte, als ob die Physik hier einen Begriff aufgeklärt hätte, der seit langer Zeit ein Hauptgegenstand philosophischer Untersuchungen gewesen ist. Begeisterte Zustimmung ebenso wie vorsichtige Ablehnung hat die neue Theorie von philosophischer Seite gefunden. Man darf aber die Verschiedenheit des Standpunktes nicht übersehen. Es ist eine ganz andere Einstellung, mit der Einstein, der Physiker, an den Begriff der Zeit herangeht als etwa Kant, der Philosoph. Es ist gar nicht derselbe Begriff, den beide meinen, wenn sie das gleiche Wort gebrauchen, oder zum mindesten muß man sagen, daß der physikalische Zeitbegriff nur einer der miteinander verwandten Untersuchungsgegenstände ist, die der Philosoph unter dem Titel „Zeit" behandelt. Es ist nicht mit wenigen Worten zu sagen und zu erklären, was der Philosoph meint, wenn er von der Zeit spricht, aber es ist leicht zu sagen, was der Physiker damit meint. Der Physiker versteht unter der Zeit, zu der ein Ereignis stattfindet, die Zahl der periodischen Bewegungen, die eine — Uhr genannte — Vorrichtung bis zum Eintritt des Ereignisses ausgeführt hat, wenn er eine nach Wahl herausgegriffene Bewegung als die nullte festgesetzt hat. Die Zeit ist hier nur gemessene Zeit, nur definiert mit Rücksicht auf ysikalische Vorgänge oder mechanische Einrichtun-1. Die Zeit ist diejenige veränderliche Größe, die mit Hilfe Uhren gemessen wird. Nur daß sie Größe hat, meßbar bestimmbar ist, kommt für die Physik in Betracht, und die rsuchung darüber, wie sie gemessen wird. Nicht aber inter-

essiert sich die Physik für ihre Qualität und Wesensbeschaffenheit. Diese Untersuchung bleibt der philosophischen Forschung vorbehalten, der allerdings durch die neuen physikalischen Einsichten eine vertiefte Grundlage gegeben ist, insofern nämlich die verschiedenen, leicht durcheinander fließenden Bedeutungen des Wortes sich jetzt schärfer gegeneinander abheben. Die Philosophie sucht, im wesentlichen übereinstimmend, nach Merkmalen der Zeit a priori, d. h. solchen, die nicht der Erfahrung entnommen sind, und stützt sich hierbei, je nach den Grundannahmen der verschiedenen philosophischen Richtungen, auf eine „reine Anschauung" oder auf „reines Denken" oder auf einen „phänomenologischen Befund". Die Zeitbestimmung der Physik besteht aber im Vergleich des Eintritts gewisser Ereignisse mit dem Ablauf bestimmter Vorgänge, sie besteht in der Konstatierung des raumzeitlichen Zusammentreffens eines Vorganges mit einer Uhrzeigerstellung. Die Zeitbestimmung ist also abhängig von dem physikalischen Verhalten der zeitmessenden Vorgänge. Nur die Erfahrung aber vermag uns z. B. über den Zusammenhang verschiedener Zeitmessungen zu unterrichten. Es ist also wohl ein Irrtum, wenn man sagt, Einstein habe die Durchführung der Relativitätstheorie durch eine neue Definition der Zeit ermöglicht. Eine neue Definition, das klingt nach so viel und wäre so wenig im Vergleich mit dem wirklich Geleisteten. Einstein hat vielmehr zum ersten Male der Physik zum Bewußtsein gebracht, welche stillschweigenden Voraussetzungen sie macht und stets gemacht hat, wenn sie von der Zeit gesprochen hat, er hat die Zeitmessung — eine rein physikalische Angelegenheit — von Vorurteilen befreit, die sie einem ganz anders gearteten Zeitbegriff entnommen hatte. Sicherlich ist dies aber eine Leistung von philosophischer Bedeutung, denn einmal fällt auch auf den von der Philosophie zu erforschenden Begriff der Zeit ein Licht, wenn der physikalische Zeitbegriff klar herausgestellt wird, zweitens aber ist es immer noch für die philosophische Forschung ein fruchtbarer Anstoß gewesen, wenn die Grundlagen und Voraussetzungen irgendeiner Wissenschaft — die ja auch einen Forschungsgegenstand der Philosophie bilden — von Vorurteilen und Mißverständnissen gereinigt worden sind, die dort von alters her erbangesessen waren.

XI. Historische Entwicklung der Relativitätstheorie und Ausblick auf die allgemeine Relativitätstheorie.

Auf dem Wege, auf dem wir zur Relativitätstheorie gegangen sind, haben wir zunächst die logischen Stationen nachdrücklich betont, dem historischen Interesse haben wir bis jetzt weniger Rechnung getragen. Wir möchten es doch nicht unterlassen, wenigstens in aller Kürze auch auf die Leistungen der Vorläufer der Theorie hinzuweisen, sodann des Mannes zu gedenken, der der Theorie ein mathematisches Rüstzeug an die Hand gegeben hat, das ihr zu einer ungewöhnlich raschen und eleganten Entwicklung verholfen hat, und zum Schluß darauf hinzudeuten, in welchen Bahnen bereits eine Weiterentwicklung der Theorie stattgefunden hat.

Die Elektrodynamik vor der Relativitätstheorie.

Nachdem jahrhundertelang die Mechanik die führende Rolle in der Physik gespielt hat und das Bestreben der Physiker darauf hinausging, alle Physik auf Mechanik zu gründen, trat im vergangenen Jahrhundert ein Umschwung ein. In den Vordergrund des physikalischen Interesses traten die elektromagnetischen Vorgänge, die Kenntnisse auf diesem Gebiete wuchsen rasch, und der englische Physiker Maxwell gab diesen Forschungen einen vorläufigen Abschluß durch seine elektromagnetische Theorie, deren Quintessenz in den Maxwellschen Gleichungen enthalten ist. Eine Lücke aber wiesen diese Gleichungen auf — und von hier aus führt der Weg unmittelbar zu unserem Thema —, sie waren nicht ohne weiteres anwendbar auf die elektrischen Vorgänge in bewegten Körpern. Diese Lücke auszufüllen, unternahm der so jung verstorbene, bedeutende Physiker Heinrich Hertz einen ersten Versuch. Er unternahm es, die Gleichungen der Elektrodynamik so abzuändern, daß sie sich dem Relativitätsprinzip der Mechanik fügten. Er nahm also die Gleichwertigkeit auch in elektrodynamischer Beziehung aller gegeneinander mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegten Systeme an, d. h. er veränderte die Maxwellschen Gleichungen so, daß sie ihre Form

bei Anwendung einer Galileitransformation nicht änderten. Aber die Ergebnisse der Theorie stimmten nicht mit der Erfahrung überein, und so mußte diese Theorie aufgegeben werden.

Sehr viel erfolgreicher waren die Untersuchungen des holländischen Gelehrten H. A. Lorentz. Man darf ihn als denjenigen bezeichnen, der als erster den Gedanken von der atomistischen Struktur der Elektrizität grundsätzlich zur Durchführung gebracht hat. Man bezeichnet die Lehre von den elektrischen Atomen als Elektronentheorie, und auf diese Theorie gestützt unternahm es Lorentz, die „elektromagnetischen Erscheinungen in einem System, das sich mit beliebiger, die des Lichtes nicht erreichender Geschwindigkeit bewegt", zu untersuchen und zu erklären. Wir haben schon früher darauf hingewiesen, daß er dabei die Annahme eines absolut ruhenden Äthers zugrunde legte und zur Erklärung des Umstandes, daß die Bewegung der Erde gegen diesen Äther doch nicht feststellbar ist, die besondere Hypothese der Körperverkürzung einführen mußte. Lorentz selbst fühlte das Unbefriedigende dieser Annahmen. Er schreibt: „Sicherlich haftet diesem Aufstellen von besonderen Hypothesen für jedes neue Versuchsergebnis etwas Künstliches an. Befriedigender wäre es, könnte man mit Hilfe gewisser grundlegender Annahmen zeigen, daß viele elektromagnetische Vorgänge streng, d. h. ohne irgendwelche Vernachlässigung von Gliedern höherer Ordnung, von der Bewegung des Systems unabhängig sind." Lorentz hat fortgesetzt an einer Vervollkommnung seiner Erklärungsweisen gearbeitet, und in der Tat hatte er schon den wichtigsten Teil der rechnerisch-theoretischen Arbeiten geleistet, als die Relativitätstheorie aufkam, und seinen Vorarbeiten verdankt die Relativitätstheorie sehr wesentlich ihre rasche Entwicklung. Lorentz hatte schon die deshalb auch heute nach ihm genannten Transformationsgleichungen für den Übergang von einem ruhenden auf ein bewegtes System aufgestellt, aus der sich die Kontraktion und fast alle wesentlichen Resultate der Relativitätstheorie ergeben, Lorentz hatte den Begriff einer „Ortszeit" eingeführt, ohne dabei freilich an die Relativierung der Zeitangaben in dem Einsteinschen Sinne zu denken, und er hat a später hin seine Theorie so ausgebaut, daß sie über alle Ersch nungen genau so gut Auskunft zu geben vermag wie die Relati tätstheorie, nur gab er seinen Formeln nicht die Deutung der Re tivitätstheorie und konnte sie daher auch nicht aus einer so gering

Anzahl von grundlegenden und allgemeinen Hypothesen ableiten, wie es der Relativitätstheorie möglich wurde.

In einem Aufsatz „Zur Elektrodynamik bewegter Körper" hat Einstein im Jahre 1905 zum ersten Male die Gedanken veröffentlicht, mit denen wir uns im vorstehenden beschäftigt haben. Es ist sicher die großartige Einheitlichkeit des Gesichtspunktes gewesen, die der Relativitätstheorie in kürzester Frist die Überlegenheit über die Lorentzsche Theorie verschafft hat. Sie machte aus der Spezialfrage, die diese Angelegenheit immerhin bisher gewesen war, eine Grundfrage der Physik, und die namhaftesten Physiker wandten ihr ihr Interesse zu. Sicherlich hat es zu ihrer raschen Anerkennung und Verbreitung nicht wenig beigetragen, daß Männer, wie der bekannte Berliner Physiker Max Planck, ihr von vornherein volles Verständnis entgegenbrachten und an ihrem Ausbau sowohl als an ihrer Darstellung literarisch Anteil nahmen.[1]) In den zwölf Jahren, die seit jener Veröffentlichung vergangen sind, ist rastlos auf diesem Gebiet gearbeitet worden. Alle Gebiete der Physik sind vom Standpunkt der Relativitätstheorie aus erforscht worden, fast unübersehbar ist die Literatur, die sich über die Fragen der Relativitätstheorie angehäuft hat. Wir besitzen jetzt eine zusammenfassende wissenschaftliche Darstellung aus der Feder Max Laues, eine namentlich die mathematischen Grundlagen ausführlicher behandelnde Schrift von Weyl, und auch der meist kurzen Aufsätze sind nicht wenige, die eine gemeinverständliche Darstellung anstreben.[2])

Die Leistung Minkowskis.

Unter allen Arbeiten, die sich mit der weiteren Ausgestaltung der Relativitätstheorie beschäftigen, nimmt die Leistung des sehr jung verstorbenen Göttinger Mathematikers Hermann Minkowski eine ganz besondere Stellung ein. Er zeigte, daß man allen Formeln und Ableitungen der Relativitätstheorie ein überaus einfaches und symmetrisches Gewand geben kann, wenn man in rechnerischer Hinsicht die Zeit gleichwertig mit einer der Richtungen im Raume andelt.

Max Planck, Acht Vorlesungen über theoretische Physik.

In der Sammlung Vieweg hat Einstein selbst eine solche besonders aufnde Darstellung unter dem Titel „Über die spezielle und allgemeine tivitätstheorie" gegeben.

Man hat somit im ganzen vier Variable, die man als Koordinaten eines vierdimensionalen Raumes, der „Welt", deuten kann. Man darf nicht glauben, daß durch diese rein rechnerische Einführung etwa die Zeit wirklich zu einer vierten Dimension des Raumes gemacht werden soll. Es ist nur eine kurze und unter Mathematikern unmißverständliche Sprechweise, wenn man sagt, daß man vier Variable als Koordinaten eines vierdimensionalen Raumes deutet. Es bietet sich dadurch für den Mathematiker die Möglichkeit, für manche algebraische Operationen eine Art geometrischer Deutung zu finden. Man kann in unserem Fall etwa von einem Weltpunkt sprechen und meint damit das Zusammensein dreier Raumkoordinaten und einer Zeitkoordinate. Man kann von einer Weltlinie sprechen und meint damit die Gesamtheit der Weltpunkte, die ein Körper der Reihe nach einnimmt. Bleibt ein Körper in Ruhe, so bleiben die drei Raumkoordinaten ungeändert und nur die Zeitkoordinate wächst. Man kann dann sagen, die Weltlinie des Körpers sei eine Parallele zur Zeitachse, wenn man sich den nur gedachten Raum wirklich mit vier Achsen ausgestattet denkt. Ja, man kann sogar eine solche Weltlinie zeichnerisch verfolgen, indem man der Reihe nach ihre Projektionen auf die durch je zwei der vier Achsen bestimmten sechs Ebenen zeichnet. Findet die Bewegung speziell in der Richtung der X-Achse statt, so genügt es, sich die Ebene durch die X-Achse und die Zeitachse zu veranschaulichen. Unsere Fig. 13 soll diese Möglichkeiten andeuten. Als Einheit auf der T-Achse ist die Sekunde gewählt, als Einheit auf der X-Achse die Länge von c km. L_1 stellt dann einen auf der X-Achse im Abstande $3c$ km vom Nullpunkt ruhenden Körper dar, L_2 dagegen einen Körper, der sich entlang der X-Achse bewegt.



Fig. 13.

Und zwar beginnt seine Bewegung mit der vierten Sekunde (vorher ruhte er), sie ist gleichförmig und erfolgt mit der Geschwindigkeit von $^1/_{13}\,c$ km in der Sekunde. L_3 schließlich ist die Weltlinie eines Lichtsignals, das die X-Achse entlangläuft. Der Neigungswinkel von 45^0 gegen die T-Achse ist es bei dieser Wahl der Einheiten, der die Lichtgeschwindigkeit vorstellt und der somit nicht überschritten werden kann. Man sieht auch leicht, daß, wenn statt des gezeichneten Koordinatensystems ein anderes eingeführt werden sollte, derart z. B., daß in ihm der Körper ruhte, der die Weltlinie L_2 beschreibt, dessen Nullpunkt aber zur gemeinsamen Zeit Null mit dem Nullpunkt des gezeichneten Systems zusammenfallen soll, es aus dem ersten durch Drehung um den Nullpunkt hervorgeht. In unserer Figur wird das durch die gestrichelten Achsen angedeutet. Wie man sieht, entsteht dadurch ein schiefwinkliges System. Es läßt sich nämlich zeigen, daß die X- und T-Achse stets symmetrisch zur Linie der Lichtgeschwindigkeit liegen müssen, weil ja in jedem System $x = ct$ sein muß und somit bei unserer Wahl der Einheiten die beiden Koordinaten jedes Punktes der Lichtlinie gleich lang sein müssen. Liegen nun zwei Ereignisse A und B vor, deren Verbindungslinie weniger als 45^0 gegen die T-Achse geneigt ist, so läßt sich stets ein Koordinatensystem angeben (das gepunktete), in dem die beiden Ereignisse nur einen Zeitabstand τ aufweisen, aber an derselben Stelle des Koordinatensystems vor sich gehen, dasjenige nämlich, dessen T-Achse der Verbindungslinie AB parallel ist. Ist dagegen die Verbindungslinie AC etwa stärker als 45^0 gegen die T-Achse geneigt, so ist diese Einführung unmöglich, dagegen läßt sich ein Koordinatensystem angeben (das gepunktstrichelte), in dem A und C gleichzeitig stattfinden, also nur einen örtlichen Abstand σ haben, dasjenige nämlich, dessen X-Achse der Verbindungslinie AC parallel geht.

Man kann aber auch statt der Variablen x, y, z, t durch folgende Substitution neue Variabeln einführen:

$$x = x_1,\ y = x_2,\ z = x_3,\ ct = ix_4 \quad [i = \sqrt{-1}]$$

und erhält dadurch eine wesentliche Verkürzung und bessere Übersichtlichkeit der Schreibweise. Statt der Gleichung

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0$$

haben wir beispielsweise einfach zu schreiben:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 0$$

oder noch kürzer: $$\sum_1^4 x_i^2 = 0,$$

und diese Erleichterungen sind von wirklich erheblichem Vorteil bei der Entwicklung und Ausgestaltung der Theorie gewesen. Bei dieser Schreibweise stellt sich die Lorentztransformation als eine orthogonale Transformation im vierdimensionalen Raume dar, das heißt, wenn man die Analogie zum dreidimensionalen sucht, als eine Drehung des Koordinatensystems um einen imaginären Winkel. (Das Imaginäre kommt durch die vierte Koordinate herein.)

Allgemeine Relativitätstheorie.

Wir können unsere Betrachtungen über die Relativitätstheorie nicht abschließen, ohne wenigstens andeutungsweise auf die Gedanken hinzuweisen, die mit Notwendigkeit auf eine Weiterführung der Relativitätstheorie über den hier gezeichneten Stand hindrängen und bereits zu Ergebnissen von hervorragender Bedeutung geführt haben. Wieder war es Einstein vorbehalten, die Grundzüge einer „allgemeinen Relativitätstheorie" zu schaffen, der gegenüber diese ältere Theorie als die spezielle Relativitätstheorie bezeichnet wird. Auch wird durch diese neue Theorie die alte nicht ersetzt oder wertlos gemacht, so wenig wie die Newtonsche Mechanik durch die Relativitätstheorie überflüssig gemacht worden ist. Die Newtonsche Mechanik ist als Spezialfall in der Relativitätstheorie enthalten und wird wohl stets die Grundlage der alltäglichen Rechnungen in Wissenschaft und Technik bleiben. Ihre Annäherung an die relativistische Mechanik ist bei allen hier in Betracht kommenden Geschwindigkeiten so groß, daß der Unterschied zwischen beiden für diese Gebiete schlechterdings nicht in Betracht kommt. Ebenso ist die spezielle Relativitätstheorie als Spezialfall in der allgemeinen enthalten, ja es führt gar kein anderer Weg zur allgemeinen Relativitätstheorie als über die spezielle. Die Kenntnis ihrer Gesetzmäßigkeiten wird geradezu zur Ableitung der Ergebnisse der allgemeinen Theorie erfordert.

Welche Gedanken sind es nun, die die Schale der hier geschilderten Relativitätstheorie sprengen mußten? Wir haben gesehen, daß die Relativitätstheorie die Gleichwertigkeit aller Koordinatensysteme lehrt, die sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit gegen

einander bewegen. Hier liegt die Frage nahe, warum eine solche Gleichwertigkeit nur auf diese Systeme beschränkt ist, ob es nicht möglich ist, auch beschleunigte Systeme als gleichwertig zu behandeln, die Relativitätstheorie auf beschleunigte Koordinatensysteme auszudehnen. Newton leugnete diese Möglichkeit. Es gibt nämlich, wie ja allgemein bekannt ist, eine Anzahl von Erscheinungen, die für beschleunigte Systeme charakteristisch sind. Fährt man in einem Eisenbahnzug mit gleichbleibender Geschwindigkeit, so zeigen die Gesetze der Mechanik keine Abweichung gegenüber denen, die für die ruhende Erde gelten. Ein Apfel, der aus dem Tragnetz fällt, fällt senkrecht herunter, ohne die Einwirkung von Kräften wird der Bewegungszustand keines Körpers geändert, die Koffer bleiben liegen, wo man sie hinverstaut hat, und die Menschen bleiben auf ihren Plätzen sitzen. Ganz anders wird das in den Augenblicken, in denen die Bewegung des Zuges beschleunigt oder verzögert wird, da können bei einer plötzlichen Bremsung die Menschen von ihren Plätzen geschleudert werden und schwere Gepäckstücke sich von selbst in eine unliebsame Bewegung setzen. Noch deutlicher wird dieser Unterschied im Fahrstuhl. Die Beschleunigung und Verzögerung bei der Anfahrt und dem Stillstehen macht sich durch eine eigenartige Empfindung bemerkbar, die ihre Ursache im veränderten Blutdruck hat, wohingegen während der gleichmäßigen Fahrt keine solche Empfindung zu spüren ist.

Denken wir uns — ein sehr instruktives und vielgebrauchtes Beispiel — einen großen Kasten, in dem ein Physiker sitzt und allerhand mechanische Versuche anstellt. Denken wir uns diesen Kasten in einem Galileischen System gleichförmig beschleunigt nach oben bewegt: würde der Physiker diesen Bewegungszustand feststellen können? Der Physiker im Inneren des Kastens würde die Beobachtung machen müssen, daß beliebige Körper, ohne daß eine Kraft auf sie einwirkt, zu Boden fallen, und zwar, daß alle Körper gleich schnell fallen. Da in einem nur gleichförmig bewegten System die Körper aber ihren Bewegungszustand beibehalten, also nicht fallen, würde er wohl schließen können, daß sein Kasten nicht einem jen System entspricht, wenn nicht noch eine andere Erklärungslichkeit übrig wäre. Machen wir doch auf der Erde alltäglich e gleiche Erfahrung. Auch auf der Erde fallen doch alle Körper ch schnell, ohne daß wir diese Erscheinung durch den Bewegungs-

zustand der Erde erklären oder auch nur erklären könnten. Vielmehr schreiben wir das der Einwirkung der Erdanziehung, der Schwerkraft zu. Die Körper auf der Erde befinden sich im Gravitationsfeld unseres Planeten und fallen in ihm alle gleich schnell. Wie nun, wenn sich der Kasten unseres Physikers auch in einem Gravitationsfeld befände, und zwar in Ruhe befände, wenn der Kasten also z. B. auf der Erdoberfläche stände? Der Mann im Inneren des Kastens würde diesen Fall gar nicht von dem unterscheiden können, in dem er sich in einem Raume bewegte, der gravitationsfrei zu denken ist. Wir kommen also zu dem merkwürdigen Ergebnis, daß man zum mindesten in manchen Fällen ein ruhendes System in einem Gravitationsfeld und ein beschleunigtes System als gleichwertig behandeln kann. Das hat seinen Grund in dem beachtenswerten Umstande, daß die Masse eines Körpers zugleich „träge" und „schwere" Masse ist. Die träge Masse wird durch eine Zahl charakterisiert, die dafür maßgebend ist, welchen Widerstand der Körper Kräften entgegensetzt, die ihn zu bewegen trachten. Je größer die träge Masse eines Körpers ist, desto geringer ist die Beschleunigung, die eine und dieselbe Kraft an ihm hervorzurufen vermag. Es ist nun äußerst merkwürdig und sehr erklärungsbedürftig, daß genau dieselbe Zahl maßgebend ist für die Schwerkraft, die auf den Körper einwirkt, die der Körper gewissermaßen auslöst. Denken wir uns eine Korkkugel und eine Bleikugel von genau derselben Größe. Die Masse der Korkkugel ist sehr viel kleiner. Lassen wir zwei genau gleich große Kräfte auf beide Kugeln einwirken, so wird die Bleikugel in sehr viel langsamere Bewegung geraten als die Korkkugel. Nun setzen wir beide Kugeln dem Einfluß eines und desselben Körpers, der Erde, aus. Beide werden jetzt trotz ihrer ungleichen Masse gleich schnell bewegt. Wie ist das möglich? Die Bleikugel ruft eben eine stärkere Krafteinwirkung der Erde auf sich wach als die Korkkugel. Die Erde ist stets und an allen Stellen bereit, Schwerkraft beliebiger Größe auszuüben. Die Größe der wirklich auf einen Körper ausgeübten Schwerkraft ist nun abhängig von gerade derselben Größe, die seine Trägheit bestimmt, von seiner Masse. So kommt es also, daß auf einen Körper von der doppelten trägen Masse auch die doppelte Kraft von seiten der Erde ausgeübt wird, und daß somit alle Körper gleich schnell fallen, sich unter dem Einfluß eines Schwerefeldes

gleichartig bewegen. Das also ist der Grund, weswegen unser Kastenphysiker nicht entscheiden kann, ob er beschleunigt bewegt ist oder sich ruhend in einem Schwerefeld befindet.

Diese Gleichheit zweier Körperkonstanten ist nun aber doch eine recht auffallende Tatsache, die befriedigend nur dadurch erklärt werden könnte, daß es gelänge, die beiden Konstanten der trägen und der schweren Masse auf eine einzige zurückzuführen, und dieser Gedanke führte Einstein zu dem Versuch, die Gesetze in Schwerefeldern als gleichartig mit den Gesetzen in beschleunigten Systemen zu behandeln. Keineswegs soll das heißen, daß man sich jedes Schwerefeld in seiner vollen Ausdehnung durch ein beschleunigtes System ersetzen kann. Schon für das Erdfeld ist das unmöglich, da diese Systeme an den verschiedenen Stellen der Erde ja radikal auseinanderstreben würden. Aber für ein hinreichend kleines Feld, wollen wir annehmen, soll es stets möglich sein. Betrachten wir etwa einen Quadratkilometer Bodenfläche auf der Erdoberfläche, so weichen an allen Stellen dieses Feldes die Fallrichtungen so wenig voneinander ab, daß wir sie als parallel betrachten können. Ein solches hinreichend kleines Stück eines Gravitationsfeldes können wir also einem beschleunigten gravitationsfreien Felde gleichwertig denken. Wir brauchen ja nur dem System die Beschleunigung zuzuschreiben, die im Gravitationsfelde die Körper zeigen.

Zu den beschleunigten Koordinatensystemen gehören nun als spezieller Fall auch die sich drehenden Systeme. Newtons Meinung war es, daß der Rotation eines Körpers absoluter Charakter zukäme, daß man ohne Bezugnahme auf ein besonders bestimmtes Koordinatensystem feststellen könnte, ob sich ein Körper dreht oder nicht, daß Drehung schlechthin als Drehung im absoluten Raume feststellbar sei. An einem Körper, der sich dreht, treten nämlich Zentrifugalkräfte auf, die namentlich auch eine Veränderung seiner Gestalt bewirken. Eine Kugel z. B. plattet sich zu einem Rotationsellipsoid ab, und eine solche Abplattung, meint Newton, kann man als ein Zeichen wahrer Rotation nehmen.

Stellen wir uns einmal den folgenden Fall vor. Wir haben in weiter Entfernung von allen übrigen Massen zwei flüssige Körper. Die gegenseitige Beobachtung ergibt, daß die Körper gegeneinander um ihre Zentrale rotieren. Der eine Körper A hat die Gestalt einer

Kugel, der andere B die eines abgeplatteten Rotationsellipsoides. Obwohl nun die gegenseitige Beobachtung nur zeigt, daß A gegen B rotiert und B gegen A, so würde doch Newton erklären, B sei der eigentlich rotierende Körper und A befinde sich in Ruhe, denn die Abplattung gilt ihm eben als eine Folge der Rotation, und zwar der absoluten Rotation, der Drehung gegen den Raum. Man müßte es also gewissermaßen als eine Eigenschaft des Raumes deuten, daß sich durch seinen Einfluß Körper, die sich in ihm drehen, abplatten.



Fig. 14.

Auf das Unbefriedigende dieser Annahme hat schon Ernst Mach hingewiesen, der gerade solchen Grundfragen und versteckten Voraussetzungen ein besonderes Interesse gewidmet hat. Schon er macht darauf aufmerksam, daß es nicht angängig sei, den Einfluß der fernen Massen in irgendeinem Versuch auszuschalten und auf diese Weise kennen zu lernen. Es könnte doch gerade das Vorhandensein dieser sehr fernen Massen ganz ausschlaggebend für den Ausfall der Versuche sein. Niemand kann sagen, ob ein Körper, der jetzt Ellipsoidgestalt hat, nicht zur Kugelgestalt zurückkehren würde, wenn man die fernen Massen verschwinden lassen könnte.

Führt man diesen Gedanken fort, so kann man geradezu zu der Auffassung gelangen, daß es überhaupt die Rotation gegen die Gesamtheit der fernen Massen ist, die die Abplattung bewirkt, und nicht die Rotation in einem „absoluten" Raum. Legt man aber diese Auffassung zugrunde, so wird auch die Relativität der Drehbewegung ersichtlich. Denn wenn die Abplattung des sich gegen die fernen Massen drehenden Körpers eine Folge eben der Einwirkung jener Massen ist, so wird auch in diesem Falle nur die Relativdrehung eine Rolle spielen, es wird auf dasselbe hinauskommen, ob man sich den Körper B als in Rotation befindlich denkt, oder aber diesen Körper als ruhend voraussetzt und dafür die fernen Massen in Umdrehung denkt.

Man könnte, um diese Annahme zu prüfen, sogar an einen Versuch denken. Man könnte sich ein Rad mit sehr schwerer Peripher herstellen und in Umdrehung versetzen. Dieses Rad müßte an eine in seiner Mitte angebrachten Körper Fliehkräfte hervorrufen, gerad

so als ob der Körper in der Mitte selbst sich in Rotation befindet. Nur reichen selbst die größten uns jetzt zur Verfügung stehenden rotierenden Massen, die großen Schwungräder der Dampfmaschinen, nicht aus, um einen merklichen derartigen Einfluß auch auf die leichtesten in ihre Mitte gebrachten Massen auszuüben.

Einstein hat nun in der Tat den Versuch unternommen, die prinzipielle Gleichwertigkeit aller nur möglichen Koordinatensysteme zu postulieren, und dieser Versuch schloß eine neue Theorie der Gravitation in sich, insofern als wenigstens hinreichend kleine Gravitationsfelder als Äquivalente beschleunigter Systeme anzusehen waren. Die Aufnahme der beschleunigten Systeme unter die berechtigten führt nun allerdings zu Annahmen, die an Schwierigkeit für das erste Verständnis alles übertreffen, was die Physik bisher geboten hat. Um davon wenigstens eine Vorstellung zu geben, möge folgende Überlegung dienen. Denken wir uns, die Zeichenebene der Fig. 15 sei ein Galileisches System, und in dieser Ebene rotiere eine starre Kreisscheibe. Die Scheibe soll zunächst von einem in der Ebene ruhenden Beobachter ausgemessen werden. Wir denken uns die Scheibe in einem kreisförmigen, dicht anschließenden Ausschnitt der ruhenden Ebene befindlich. Dann genügt es, wenn der Beobachter diesen Rand nachmißt und den Durchmesser mit Hilfe einer oberhalb der Scheibe querüberliegenden Stange feststellt. Er wird dann die aus der elementaren Geometrie bekannte Beziehung zwischen Umfang und Radius des Kreises finden, die durch die Formel ausgedrückt wird:



Fig. 15.

$$(32) \qquad u = 2\pi r \quad \text{oder} \quad \frac{u}{2r} = \pi.$$

Nun nehmen wir r als eine ganze, ziemlich große Zahl an und denken uns rund um die Kreisscheibe $2r$ Beobachter aufgestellt, deren gegenseitiger Abstand dann also von Beobachter zu Beobachter π Maßeinheiten betragen muß. E und F seien zwei solche Beobachter. Alle diese Beobachter sollen gleichzeitig nach Uhren der ruhenden Ebene an der ihnen gerade gegenüberliegenden Stelle der Kreisscheibe ein Merkzeichen C und D anbringen. Dann wird die Scheibe durch diese Merkzeichen in $2r$ gleiche Teile geteilt. Wir wollen dabei annehmen, daß r so groß ist, daß auf einer Strecke von der Länge π Maßein-

heiten die Kreisperipherie nur unmerklich von einer Geraden abweicht. Dann dürfen wir den Teil zwischen zwei Merkzeichen als Teil eines gegen die feste Ebene geradlinig gleichförmig bewegten Systems ansehen, auf ihn also die Ergebnisse der speziellen Relativitätstheorie anwenden. Wir lassen nun einen mit der Scheibe mitbewegten Beobachter ihren Durchmesser und ihren Umfang ausmessen. Hinsichtlich des Durchmessers wird er zu demselben Ergebnis kommen wie der ruhende, da ja bei dieser Messung (Lage AB) sein Maßstab überall senkrecht zur Bewegungsrichtung steht. Anders bei der Messung des Umfangs. Er braucht nur einen der $2r$ gleichen Teile auf dem Rande der Kreisscheibe nachzumessen. Dieser wird ihm aber länger als π Maßeinheiten erscheinen müssen, da ja, in dieser Richtung angelegt, sein Maßstab die Lorentzkontraktion zeigt, oder, anders ausgedrückt, weil dieselbe Strecke zwischen den zwei Marken vom mitbewegten System aus länger erscheint als vom ruhenden. Zwischen dem Umfang und Radius findet er also nicht die Beziehung (32), sondern

$$u = 2k\pi r \quad \text{oder} \quad \frac{u}{2r} = k\pi,$$

wobei k nach (22) gleich $1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ ist. v ist hier $r\omega$, wenn ω die Umdrehungsgeschwindigkeit bedeutet. Es haben also nicht einmal alle konzentrischen Kreise auf einer solchen Scheibe dasselbe Verhältnis des Umfangs zum Durchmesser. Dieses ist vielmehr außer von der Drehgeschwindigkeit auch noch vom Kreisradius abhängig, d. h. es ergeben sich hier nicht mehr die Maßbeziehungen der gewöhnlichen, der sogenannten Euklidischen Geometrie, wenn man ihre Gültigkeit für die Körperwelt mit Hilfe von starren Maßstäben untersucht.



Fig. 16.

Aber auch eine einheitliche Zeitmessung könnte auf der Drehscheibe nicht durchgeführt werden. Denken wir uns zwei Kreise von verschiedenem Radius, deren Mittelpunkt der Drehpunkt sei, mit Uhren besetzt. Nehmen wir an, es sei gelungen, die Uhren des äußeren Kreises untereinander synchron zu stellen und die des inneren Kreises ebenfalls. Es würde auch genügen, wenn es mit einige dieser Uhren gelänge. In einer hinreichend kurzen Zeit dürfen wi wenn beide Radien groß genug sind, zwei kleine Kreisstücke al geradlinig gleichförmig bewegt ansehen. Das äußere Kreisstück i

aber rascher bewegt als das innere, und somit müssen seine Uhren nach unseren früheren Erwägungen langsamer gehen als die des inneren Kreises. Es würde hier also nicht die Forderung erfüllt sein, daß, wenn zwei Uhren mit einer dritten synchron gehen, sie auch untereinander synchron gehen. Man sieht schon aus diesen wenigen Ausführungen, welche Schwierigkeiten sich bei der Zulassung beschleunigter Systeme als gleichberechtigt ergeben. Die Ausmessung des Raumes mit Maßstäben führt nicht mehr zu den Beziehungen der Euklidischen Geometrie. Eine Folge davon ist, daß wir in der allgemeinen Relativitätstheorie den Raum als inhomogen und die Maßstäbe somit als verschieden lang an verschiedenen Orten denken. Die Inhomogenität des Raumes ergibt sich aus der anzunehmenden Verschiedenheit des Gravitationsfeldes an seinen verschiedenen Stellen. Auch die Ausmessung der Zeit mit Uhren, deren Gang ebenfalls — wie wir noch zeigen werden — vom Gravitationsfelde abhängt, führt zu keiner Synchronitätsbestimmung mehr.

Einstein hat sich denn auch dazu entschließen müssen, bei der Formulierung solcher Naturgesetze, die in allen nur denkbaren Koordinatensystemen ihre Form bewahren sollen, von der Bestimmung der Vorgänge direkt durch Raum- und Zeitgrößen ganz abzusehen. Jedes Ereignis wird durch vier Zahlen gekennzeichnet, denen aber keine unmittelbar anschauliche Bedeutung zukommt, wie noch in der speziellen Relativitätstheorie den Kartesischen Koordinaten als mit starren Maßstäben gemessenen Längen im Raum und der Zeitkoordinate, die mit einer Uhr gemessen wird. Diese vier Zahlen müssen vielmehr erst durch Umrechnung mit den Raum- und Zeitmessungen in Beziehung gesetzt werden. Welches Maß von Abstraktion zu einer eingehenden Behandlung der Physik auf diesen Grundlagen erforderlich ist, wird hiernach ohne weiteres einleuchten.[1])

Es fragt sich nun, welche Ergebnisse denn diese neueste Theorie

1) Eine ungemein anschauliche und klare Darstellung dieser Umstände und der hier nur ganz kurz angedeuteten Grundgedanken und Folgerungen der meinen Relativitätstheorie hat Einstein selbst in dem soeben erschienenen he: „Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie" gegeben. ch die allgemeine Relativitätstheorie werden auch der Philosophie zwei gen zu erneuter Beantwortung gestellt: „Raum und Zeit und die Naturenschaften" und „die mathematische und die physikalische Geometrie", die t dem Einsteinschen Buche angeschnitten sind.

etwa schon aufzuweisen hat. Ihre Voraussetzung ist es, daß sich ein hinreichend eng begrenztes Gravitationsfeld in Gedanken durch ein beschleunigtes Koordinatensystem ersetzen läßt, daß alle Vorgänge in einem solchen Gravitationsfeld genau so verlaufen wie in einem beschleunigten und dafür schwerefreien System. Betrachtet man nun ein solches Gebiet auch noch in einer hinreichend kurzen Zeit, in der sich seine Geschwindigkeit nicht merklich ändert, so haben wir in diesem kleinen Raum-Zeitgebiet ein Galileisches System vor uns, und es wird nun angenommen, daß in diesem Grenzfall die bisher betrachtete spezielle Relativitätstheorie gilt. Kennt man aber nun die Gesetze der Natur für ein sehr kleines Raum-Zeitgebiet, so gibt die Mathematik Mittel an die Hand, die Gesetze für ausgedehntere Gebiete ausfindig zu machen.

Wir wollen nur ein ganz einfaches Beispiel dafür betrachten, wie wir durch diese Betrachtungsweise über die Gesetzmäßigkeiten der Gravitationsfelder unterrichtet werden können. Denken wir einmal wieder an unseren beschleunigten Kasten und nehmen an, daß er in seiner Seitenwand ein Loch habe. Durch dieses Loch fällt ein Lichtstrahl senkrecht zur Bewegungsrichtung in den Kasten. Welchen Weg legt der Strahl gegenüber dem Kasten zurück? In einem gleichförmig bewegten System läuft der Strahl geradlinig, in einem beschleunigten System wird ein quer zur Bewegungsrichtung laufender Lichtstrahl demnach gekrümmt erscheinen. Sind nun die Gesetze der Schwerefelder dieselben wie die bewegter Systeme, so muß auch im Schwerefeld der Lichtstrahl in der Richtung der Schwerkraft aus der geraden Bahn abgelenkt werden. Diese Folgerung hat Einstein tatsächlich gezogen. Das Gravitationsfeld der Erde ist allerdings nicht stark genug, um eine Messung möglich zu machen. Das Gravitationsfeld der Sonne aber reicht dazu aus. Das Licht eines Sternes, das sehr nahe an der Sonne vorbeikommt, müßte durch ihr Gravitationsfeld um 1,7″ aus seiner Bahn abgelenkt werden. Eine solche Feststellung ist aber nur bei Gelegenheit der Beobachtung einer totalen Sonnenfinsternis möglich, weil nur dann die Sonne hinreichend abgeblendet ist, um die in ihrer Nähe stehenden Sterne zu beobachten. Die Beobachtungen während der Sonnenfinsternis des Jahres 1919 haben nun in der Tat eine derartige Ablenkung, wie sie die Theorie vorausgesagt hat, ergeben.

Eine andere Folgerung sehr wichtiger Art — nämlich daß die Ganggeschwindigkeit einer Uhr vom Gravitationspotential abhängig ist — liefert uns folgende Überlegung: Das Koordinatensystem B mit den Achsen X und Y (Fig. 17) befinde sich gegenüber einem Galileisystem, das irgendwie in der Ebene des Papiers festgelegt sein möge, in gleichförmig beschleunigter Bewegung in Richtung der positiven X-Achse. Die Beschleunigung möge b betragen. In den Punkten P und Q mögen sich zwei gleichbeschaffene schwingende Atome befinden. Schwingende Atome sind die Ursache der Lichtaussendung und ihre Schwingungszahl ist maßgeblich für die Schwingungszahl des ausgesandten Lichtes oder, anders ausgedrückt, für seine Farbe. Nehmen wir nun an, beide Atome schwingen n-mal in der Sekunde, wenn man die Schwingungszahl mit einer benachbarten Uhr feststellt.



Fig. 17.

Nun möge von dem Atom Q ein Lichtblitz in dem Augenblick ausgesandt werden, in dem das System B sich gerade gegenüber dem angenommenen Galileisystem in Ruhe befindet.[1]) Bis dieser Lichtblitz in P ankommt, vergeht die Zeit $t = l/c$, wenn l der Abstand der beiden Atome ist und wir die Beschleunigung des Systems P so klein annehmen, daß die vom System zurückgelegte Strecke gegen die vom Licht zurückgelegte nicht in Betracht kommt. Infolge der Beschleunigung b hat das System bei der Ankunft des Lichtblitzes in P die Geschwindigkeit $v = bt = bl/c$. Demnach folgt aus dem Dopplerprinzip, daß einem Beobachter in P die Schwingungszahl größer erscheint, und zwar ist $n' = n(1 + v/c)$, wenn wir unter n' die dem Beobachter in P erscheinende Schwingungszahl verstehen.[2]) D. h. wenn der Beobachter in P das Elektron in Q beobachtet, so macht es in der Sekunde $n(1 + v/c)$ Schwingungen, in t Sekunden $nt(1 + v/c)$ Schwingungen. Da nun eine Uhr in Q während n Schwingungen eine Sekunde anzeigt, zeigt sie während $nt(1 + v/c)$ Schwingungen $t(1 + v/c)$ Sekunden an. D. h. wenn wir unter t die in P an einer bei P befindlichen

1) Einem Galileisystem gegenüber befindet es sich ja in jedem Augenblick in Ruhe, so daß der obigen Forderung stets genügt werden kann.

2) Die Formel stimmt mit der Formel (12) auf S. 35 überein, wenn an berücksichtigt, daß hier v und c entgegengesetzt gerichtet sind und daher s positive Vorzeichen auftritt.

Uhr gemessene Zeit und unter t' die von P aus an einer bei Q befindlichen Uhr abgelesene Zeit verstehen, so ist

$$t' = t\left(1 + \frac{v}{c}\right) = t\left(1 + \frac{bl}{c^2}\right) = t\left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right) \tag{33}$$

wenn man unter $\Phi = bl$ die Potentialdifferenz zwischen Q und P versteht, die sich ergeben würde, wenn man an Stelle der Beschleunigung des Systems das entsprechende Schwerefeld einführen würde. Da es nun das Prinzip der allgemeinen Relativitätstheorie ist, die Gesetze der Schwerefelder aus den für beschleunigte Systeme gültigen Verhältnissen abzuleiten (s. S. 95), so erhalten wir das Resultat, daß eine Uhr in einem Schwerefeld einer anderen gegenüber eine Gangbeschleunigung aufweist, wenn sie sich an einer Stelle höheren Potentials befindet. Da aber natürlich alle Vorgänge in der Nähe der Uhr mit deren Zeitangaben in Übereinstimmung stehen, so verlaufen alle Vorgänge an Orten höheren Potentials rascher, wenn sie von einer Stelle niedrigeren Potentials aus betrachtet werden, als wenn sie vom gleichen Ort aus betrachtet werden. Auch die Atomschwingungen, von denen wir ja ausgingen, müssen demnach an einem Punkt höheren Gravitationspotentials für einen Beobachter an einem Punkt niedereren Potentials rascher erfolgen und umgekehrt langsamer für einen Beobachter auf höherem Potential, das bedeutet aber, daß die Spektrallinien, die Atome auf Weltkörpern großer Masse aussenden, uns Erdbewohnern im Spektrum nach dem Rot verschoben erscheinen müssen, wenn wir sie mit den Spektrallinien gleichartiger Atome auf der Erde vergleichen. Auch hier scheinen die Beobachtungen mit der Theorie im Einklang zu stehen.

Mit der soeben gewonnenen Einsicht der Abhängigkeit des Uhrenganas vom Schwerepotential können wir nun auch jenes Uhrenproblem restlos erledigen, das innerhalb der speziellen Relativitätstheorie nicht befriedigend gelöst werden konnte.



Fig. 18.

In Fig. 18 möge U_1 die Uhr sein, die dauernd in einem Inertialsystem ruht, die Uhr U_2 soll sich mit der Geschwindigkeit v von ihr um die Strecke l entfernen und sich ihr mit gleichen Geschwindigkeit dann wieder nähern. Während beider Bewegen läuft sie langsamer als die Uhr U_1, und zwar ist nach Gleichung (S. 69

$$t_2 = t_1\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = t_1\left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right).$$

Da nun die Zeit t_1, die erforderlich ist, damit die bewegte Uhr den Hin- und Rückweg zurücklegt, $2l/v$ ist, so ist die mit U_2 gemessene Zeit

$$t_2 = \frac{2l}{v}\left(1 - \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{2l}{v} - \frac{vl}{c^2}$$

um den Betrag vl/c^2 kleiner als die mit U_1 gemessene Zeit. Das ist also die lediglich nach der speziellen Relativitätstheorie vom Standpunkt der Uhr U_1 aus berechnete Uhrendifferenz, die sich nach Rückkehr der Uhr U_2 ergeben muß.

Wie stellt sich nun die Sachlage von dem System der Uhr U_2 aus betrachtet dar? Während der Zeiten gleichförmiger Bewegung befindet auch sie sich jedesmal in einem Galileisystem und es muß die Uhr U_1, die als gleichförmig bewegt erscheint, ihr gegenüber nachgehen, und zwar um denselben Betrag, den wir eben errechnet haben. Aber während der Umkehr befindet sich die Uhr U_2 von U_1 aus gesehen in einem beschleunigten System. Wir wollen annehmen, daß die Beschleunigung b betrage, und die Zeit berechnen, die sie zur Umkehr der Bewegung braucht. Die Beschleunigung muß die Geschwindigkeit v in $-v$ verwandeln, also eine Änderung von $2v$ hervorrufen. Die dazu erforderliche Zeit ergibt sich aus der Gleichung

$$2v = b\tau$$

$$\tau = \frac{2v}{b}.$$

Während dieser Zeit herrscht im System der Uhr U_2, wenn wir es als ruhend betrachten wollen, ein Gravitationsfeld von der Beschleunigung b, und zwar befindet sich die Uhr U_1 an einem Punkt höheren Potentials, dessen Potentialdifferenz gegen U_2 durch $\Phi = bl$ gegeben ist. Dieses Schwerefeld herrscht während der Zeit $\tau = 2v/b$ und die Formel (33) lehrt uns, daß U_1 währenddessen die Zeit

$$\tau\left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right) = \frac{2v}{b}\left(1 + \frac{bl}{c^2}\right) = \frac{2v}{b} + \frac{2vl}{c^2} = \tau + \frac{2vl}{c^2}$$

angibt. D. h. zunächst daß die durch die Beschleunigung hervorgerufene Zeitdifferenz beider Uhren unabhängig davon ist, wie lang oder besser kurz die Zeit der Beschleunigung genommen wird. Der Grund ir liegt in dem Umstand, daß natürlich die Beschleunigung um so jer angenommen werden muß, je kürzer die Beschleunigungszeit ommen wird. Wir sind also berechtigt, die Beschleunigungszeit so anzunehmen, wie wir wollen. Dann ergibt sich folgendes Resultat:

Während der beiden gleichförmigen Bewegungen wird U_1, von U_2 aus betrachtet, insgesamt um den Betrag vl/c^2 zurückbleiben, während der Beschleunigungsperiode aber um $2vl/c^2$ vorgehen, so daß insgesamt die Uhr U_1 gegen U_2 um vl/c^2 vorgehen muß, wenn beide wieder nebeneinander liegen. Es zeigt sich also, daß sich der Unterschied von U_1 und U_2 in gleicher Weise ergibt, von welchem System aus man auch den Vorgang beurteilt, wenn man nur alle Umstände der Relativitätstheorie gemäß in Rücksicht zieht.

Die überraschendste Leistung der allgemeinen Relativitätstheorie ist aber die folgende. Die Bahnen der Planeten sind seit langer Zeit auf das genaueste nach den Newtonschen Gesetzen berechnet, und die Berechnungen und Beobachtungen haben überall vorzüglich übereingestimmt mit Ausnahme eines einzigen Falles. Die Bahnen der Planeten ergeben sich rechnerisch, wenn man den Einfluß der Sonne und aller anderen Planeten auf jeden von ihnen berücksichtigt. Man kann dann den Einfluß der Planeten beiseite lassen und allein die Einwirkung der Sonne berücksichtigen und so eine ideelle Bahn konstruieren, die der Planet nur unter der Sonnenanziehung allein durchlaufen müßte. Diese Bahn muß eine Ellipse sein und ihre Lage im „Raum", d. h. in einem System, das durch sehr ferne Sterne bestimmt ist, dauernd beibehalten. Man kann nun auch die beobachtete Bahn auf Abwesenheit der anderen Planeten korrigieren, und dann ergibt sich in der Tat für alle Planeten diese im Raume feststehende Ellipse mit Ausnahme des Merkur. Die Merkurellipse nämlich dreht sich, und zwar um 43″ in einem Jahrhundert. Der Astronom Leverrier hat durch Rechnung gezeigt, daß diese Abweichung der Beobachtung von der Rechnung bei Zugrundelegung der Newtonschen Mechanik nur durch die Annahme unbekannter Massen erklärt werden könne. Man hat nach solchen Massen aber vergeblich gesucht.

Auch die allgemeine Relativitätstheorie hat nun, wie schon die spezielle, Abänderungen an den Grundgleichungen der Mechanik vornehmen müssen. Und nun ergab sich das überraschende Resultat, daß bei Zugrundelegung der neuen relativistischen Mechan die Perihelbewegung der Merkurbahn, und zwar genau in dem be der Beobachtung gegebenen Betrage, durch die Theorie gefordert und somit erklärt wird.

Diese Leistung der allgemeinen Relativitätstheorie, durch welche

eine Schwierigkeit gelöst wird, die seit einem Jahrhundert die Astronomen beschäftigt, darf man wohl als eine hervorragende Bestätigung dieser Theorie ansehen. Nicht als ob hierdurch die neue Theorie über jeden Zweifel erhaben wäre, aber sicher wird es dazu führen, daß sich trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten viele Interessen diesem Neubau der Physik zuwenden und daß alle Gebiete der Physik unter diesem Gesichtspunkt neu durchforscht werden. Die Relativitätstheorie ist nichts bereits Fertiges, sie ist erst etwas Werdendes, sie gehört der Zukunft, und wahrscheinlich gehört auch ihr die Zukunft.

Register.

Aberration 29 ff. 97
Absolut 7. 12. 29. 83. 96
Additionstheorem 72 ff.
Allgemeine Relativitätstheorie 71. 92 ff.
Astronomie 14. 104
Äther 27. 45. 55 ff.
Atomistische Struktur der Elektrizität 88
Ausbreitungsgeschwindigkeit 84
Auswahlprinzip 84

Beobachter 11 ff. 46
Beschleunigung 24. 71. 93. 101
Bewegung 11 ff.
Brechungsquotient 36. 38

Dopplereffekt 32 ff. 77
Drehung 12. 96
Dynamik 79

tein 46. 56. 83. 85. 95. 97. 100
wand 71
enbahn 30. 52
ktrisches Feld 79
ktrodynamik 79

Elektronenbewegung 80
Elektronentheorie 88
Energie 80 ff.
Epizykel 14
Erddrehung 11
Erfahrung 29. 51
Erhaltung der Masse und Energie 82
Euklidische Geometrie 98

Farbe 8. 33
Fernkräfte 80
Fizeauversuch 36. 46. 76
Fresnel 38. 76

Galilei 19. 20
Galileisches System 20. 70
Galileitransformation 65. 72. 88
Geschwindigkeit 16. 72
Gleichzeitig 50
Gleichzeitigkeit 68
Gravitation 94. 100 ff.
Grenzgeschwindigkeit 72 ff.
Größe 8

Hertz 87
Homogen 18. 60 f.
Hypothese 5. 57

Inertialsystem 19 ff.
Interferenzmethode 36
Invarianten 17. 60
Irdisches System 25
Isotrop 60. 61

K 48 f.
k 65. 66
Kant 85
Kepler 14
Kinetische Energie 81
Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 44. 56
Koordinatensystem 15 ff. 48. 95
Koordinatentransformation 15
Kopernikus 14. 19. 83
Kovarianten 84
Kraft 20. 80
Kreis 97
Krümmung des Lichtstrahls 100
Kugel 59. 96

Längenmaß 8
Längenmessung 52
Laue 56. 89
Leverrier 104
Lichtgeschwindigkeit 43. 57. 72 ff.

Linear 18. 60
Lorentz 44. 88
Lorentzkontraktion 44. 67. 80
Lorentztransformation 65. 79

Mach 96
Maß 8
Masse 10. 80. 94. 96
Massenäquivalent der Energie 81
Masseneinheit 9
Maßsystem 7
Maxwell 87
Mechanik 26. 73. 79. 104
Merkur 104
Messen 7 ff.
Michelsonversuch 39 ff. 46
Minkowski 87 ff.
Mitführungskoeffizient 38. 76

Naturgesetze 84
Newton 19. 26. 79. 95. 104

Ortszeit 88

Pendel 11
Perihelbewegung 104
Philosophie 82 ff.
Physik 1. 82 ff.
Planck 87
Planeten 13. 104
Ptolemäus 14

Radioaktive Körper 81
Raum 12 ff. 60. 90. 96
Relativ 11 ff.
Relativitätseinsicht 16
Relativitätsprinzip 27. 55
Rotation 12. 25. 95 f.
Ruhsystem 80

Schwere Masse 94
Schwerkraft 94
Schwingungszahl 34
Sinusschwingung 34
Sonnenfinsternis 100
Spektrallinien 34
Spektrum 34
Spezielle Relativitätstheorie 71. 92. 100
Stab 66
Starrer Körper 80
Synchron 49 f. 99

Theorie 6. 57
Träge Masse 94
Trägheitssatz 19
Transformationsgleichungen 17. 53. 58 ff. 88

Uhr 11. 47 ff. 58. 67 ff. 86. 98. 101 ff.
Unendlich 73

Vektor 18
Vierdimensionaler Raum 96
Voraussetzungen der Physik 7

Welt 90
Weltlinie 90
Weltpunkt 90
Weyl 89

Zeit 47 ff. 85 f. 90. 99
Zeiteinheit 10
Zentrifugalkraft 95

Einführende Werke in die Relativitätslehre

Physikalisches über Raum und Zeit. Von Prof. Dr. E. Cohn. 4. Aufl. (Abh. u. Vortr. a. d. Geb. d. Math., Nat. u. Techn. H. 2.) Geh. M. 1.60

„In anschaulicher Darstellung legt der Verfasser die physikalischen Erfahrungen dar, die zum Verständnis des Verlaufs der Naturvorgänge im Raum- und Zeitsystem führen und in denen die Relativitätstheorie wurzelt. Das Hauptgewicht ist auf eine das volle Verständnis vom Standpunkte des physikalischen Denkens erschließende Darstellung gelegt, und die mathematische Formulierung ist nur im Anhang berührt." (Astronom. Nachrichten.)

Das Relativitätsprinzip. Leichtfaßlich entwickelt von Prof. A. Angersbach. (Math.-phys. Bibl. 39.) Kart. . . . . M. 1.40

Ausgehend von der klassischen Mechanik, behandelt das Büchlein zunächst den schon in dieser auftretenden Begriff der Relativität, geht auf die Grundfrage „Ruhender oder bewegter Aether" ein und erörtert dann die hierauf fußenden Einsteinschen Sätze, ihre Begründung und ihre Folgerungen.

Das Relativitätsprinzip. Eine Einführung in die Theorie von Prof. Dr. A. von Brill. 4. Aufl. Mit Figuren. (Abhandlungen u. Vorträge aus d. Gebiete der Math., Naturwissenschaften u. Technik. H. 3.)

Das Büchlein beschränkt sich hauptsächlich auf den Teil der Theorie, der den Widerspruch zwischen der Maxwell-Hertzschen Lichttheorie und der Erfahrung zu überbrücken berufen ist. Die Grundgleichungen der Theorie erfahren eine eingehende Behandlung, und es wird an ihnen abgeleitet, wie an Stelle der dreidimensionalen Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik die vierdimensionale Impuls-Energiegleichung tritt, und welche Behandlung damit der Begriff „Masse" erfährt. Auch die neuerdings von A. Einstein aufgestellte Theorie der Gravitation wird in längerer Besprechung gewürdigt.

Das Relativitätsprinzip. Drei Vorlesungen gehalten in Teylers Stiftung zu Haarlem. Von Prof. Dr. H. A. Lorentz. Bearbeitet von Prof. Dr. W. H. Keesom. Geh. . . . . ca. M. 1.60

Die Schrift behandelt nach einer kurzen historischen Einleitung das Einsteinsche Relativitätsprinzip, die darauf fußende Relativitätsmechanik sowie das Einsteinsche Äquivalenzprinzip. In einem Nachtrage werden einige spezielle Fragen mathematisch weiter ausgearbeitet.

Das Relativitätsprinzip. Eine Sammlung von Abhandlungen. Von Prof. Dr. H. A. Lorentz, Prof. Dr. A. Einstein, Prof. Dr. H. Minkowski. Mit Anmerkungen von Prof. Dr. A. Sommerfeld, und Vorwort von Prof. Dr. O. Blumenthal. 3., verb. Aufl. (Fortschritte der mathematischen Wissenschaften in Monographien. Heft 2.) Geh. M. 8.—, geb. . . . . M. 11.—

Die vorliegende Sammlung führt die historische Entwicklung der Theorie an der Originalarbeiten vor Augen. Dank dem Entgegenkommen Prof. Einsteins konnten in der neuen Auflage die wichtigsten seiner Arbeiten über die Relativitätstheorie im Zusammenhang zum Abdruck gebracht werden, so daß die Schrift nunmehr zu einem für das Verständnis der Theorie und ihrer Bedeutung grundlegenden Quellenwerk geworden ist.

Alle angegebenen Preise sind freibleibende Preise Teuerungszuschläge des Verlags (Mai 1920 100%, Abänderung vorbehalten) und der Buchhandlungen

Physik. Unter Redaktion von Präsident Prof. Dr. E. Warburg, Charlottenburg. (Die Kultur der Gegenwart, hrsg. von Prof. P. Hinneberg. Teil III, Abt. III, Band 1.) Mit 106 Abbildungen. [X u. 762 S.] Lex.-8. 1915. Geh. M. 22.—, geb. M. 26.—, in Halbfranz geb. . . . . M. 32.—

„Es ist nun gelungen, ein das weite Gebiet der Physik umfassendes Werk zu schaffen, das sowohl für die Physiker vom Fach als auch für die Fernerstehenden von unschätzbarem Wert ist." (Die Welt der Technik.)

Grundriß der Physik. Für höhere Lehranstalten und Fachschulen sowie zum Selbstunterricht. Von Oberlehrer Dr. K. Hahn, Hamburg. Mit 326 Abb. [ca. 330 S.] gr. 8. 1920. Geb. . . M. 8.—

Der Grundriß der Physik soll in „knappester Form" und in „streng logischem Aufbau" eine Darstellung der Experimentalphysik geben, die bis zu den „neuesten Ergebnissen der Forschung" führt.

Lehrbuch der Physik. Von Prof. E. Grimsehl, weil. Direktor der Oberrealschule a. d. Uhlenhorst in Hamburg. Zum Gebrauch beim Unterricht, bei akad. Vorles. u. zum Selbststudium. 2 Bände. 4., verm. u. verb. Aufl. hrsg. v. Prof. Dr. W. Hillers in Hamburg u. Prof. Dr. H. Starke in Aachen.

I. Band: Mechanik, Wärmelehre. Akustik u. Optik. Mit 1049 Figuren im Text, 10 Fig. auf 2 farb. Taf. u. 1 Titelbild. [XVI u. 1011 S.] gr. 8. 1919. Geh. M. 16.50, geb. M. 18.60

II. Band: Magnetismus und Elektrizität. Mit ca. 520 Figuren. [U. d. Pr. 1920.]

Die neue Auflage trägt dessen besonderer Eigenart, neben dem Schulunterricht auch der Hochschule dienstbar zu sein, in stärkstem Maße Rechnung, wofür ja schon die Namen der neuen Bearbeiter bürgen. Neben zahlreichen Ergänzungen im einzelnen weist die neue Auflage des ersten Bandes wesentliche Erweiterungen bei der Behandlung der drei für die Entwicklung der modernen Physik so wichtigen Gebiete der Relativitätstheorie, Atomistik und Hypothese der Elementarquanten auf.

Kleiner Leitfaden der praktischen Physik. Von Professor Dr. Fr. Kohlrausch, weil. Präsident der physikal.-techn. Reichsanstalt zu Berlin. 3. Aufl. bearb. von Dr. H. Scholl, Prof. an der Univ. Leipzig. Mit 165 Abbildungen im Text. [XX u. 324 S.] gr. 8. 1919. Geb. M. 10.—

Physik in graphischen Darstellungen. Von Hofrat Dr. Felix Auerbach, Professor a. d. Universität Jena. 1373 Fig. auf 213 Tafeln. Mit Text. [X u. 213 S.] gr. 8. 1912. Geh. M. 9.—, geb. M. 13.—

„Es ist nicht nur die außerordentlich große Zahl der Figuren (1373!), welche das Buch so inhaltsreich macht, sondern auch die gewählte Darstellungsform, welche anschaulich und inhaltsreich zugleich ist." (Archiv f. Mathem. u. Physik.)

Physik und Kulturentwicklung durch techn. u. wissenschaftl. Erweiter. d. menschl. Naturanlagen. V. Geh. Hofrat Dr. O. Wiener, Prof. a. d. Univ. Leipzig. Mit 72 Abb. [VIII u. 106 S.] 8. 1918. M. 4.40, geb. M. 5.50

„Es ist konzentriertes Wissen, das uns hier geboten wird, die Zusammenfassung der Erkenntnisse und der bisher erzielten höchsten Leistungen auf allen Gebieten der Naturwissenschaft und Technik, ein Spiegelbild des Kulturfortschrittes der Menschheit, soweit es mit Physik zusammenhängt." (Helios.)

Physikalisches Wörterbuch. Von Prof. Dr. G. Berndt, Ber[illegible] t.
M. 81 Fig. i. Text. [IV u. 200 S.] 8. 1920. (Teubn. kl. Fachwörterb. Bd. 5) Geb. M. [illegible] –

Will schnell und treffend, ohne größere Vorkenntnisse vorauszusetzen, über [illegible] e wichtigeren physikalischen Erscheinungen und Begriffe unterrichten. Besonders [illegible] r- rücksichtigt sind die Anwendungen der Physik im täglichen Leben u. in der Tech[illegible] t.

Auf sämtl. Preise Teuerungszuschl. d. Verlags (Mai 1920 100%, Abänd. vorb.) u. d. Bu[illegible] i.

Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens

Jeder Band ist einzeln käuflich

Kartoniert M. 1.60,*) gebunden M. 1.90*)

Verlag B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Verzeichnis der bisher erschienenen Bände innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet
Werke, die mehrere Bände umfassen, auch in einem Band gebunden erhältlich

I. Religion, Philosophie und Psychologie.

Ästhetik. Von Prof. Dr. R. Hamann 2. Aufl. (Bd. 345.)
— **Einführung in die Geschichte der Ä.** Von Dr. H. Nohl. (Bd. 602.)
Astrologie siehe Sternglaube.
Aufgaben u. Ziele d. Menschenlebens. Von Prof. Dr. J. Unold. 5. Aufl. (Bd. 12.)
Bergpredigt. Die. Von Prof. D. Dr. H. Weinel. (Bd. 710.)
Bergson, Henri, der Philosoph moderner Relig. Von Pfarrer Dr. E. Ott. (Bd. 480.)
Berkeley siehe Locke, Berkeley, Hume.
Buddha. Leben u. Lehre d. B. V. Prof. Dr. R. Pischel. 3. A., durchges. v. Prof. Dr. H. Lüders. M. 1 Tb. u. 1 T. (109.)
Calvin. Johann. Von Pfarrer Dr. G. Sodeur. Mit 1 Bildnis. 2. Aufl. (Bd. 247.)
Christentum. Aus der Werdezeit des Chr. Studien u. Charakteristiken. V. Prof. Dr. J. Geffcken. 2. Aufl. (Bd. 54.)
— **Die Religion des Urchristentums.** Von Prof. D. Dr. H. Windisch. (Bd. 641.)
— **Christentum und Weltgeschichte seit der Reformation.** Von Prof. D. Dr. K. Sell. 2 Bde. (Bd. 297. 298.)
— siehe Jesus, Kirche, Mystik im Christent.
Ethik. Grundzüge d. E. M. bei Berücksicht. d. päd. Probl. V. E. Wentscher. (397.)
— s. a. Aufg. u. Ziele, Sexualethik, Sittl. Lebensanschauungen, Willensfreiheit.
Freimaurerei. Die. Eine Einführung in ihre Anschauungswelt u. ihre Geschichte. Von Geh. Rat Dr. L. Keller. 2. Aufl. von Geh. Archivrat Dr. G. Schuster. (463.)
Griechische Religion siehe Religion.
Handschriftenbeurteilung. Die. Eine Ein[illegible]ung in die Psychol. d. Handschrift. [illegible] Prof. Dr. G. Schneidemühl [illegible]urchges. u. erw. Aufl. Mit 51 Hand[illegible]ftennachbild. i. T. u. 1 Taf. (Bd. 14.)
He[illegible]ntum siehe Mystik.
He[illegible]nistische Religion siehe Religion.
He[illegible]rts Lehren und Leben. Von Pastor [illegible] Flügel. 2. Aufl. Mit 1 Bildnis [illegible]arts. (Bd. 164.)
Hume siehe Locke, Berkeley, Hume.
Hypnotismus und Suggestion. Von Dr. E. Trömner. 3. Aufl. (Bd. 199.)
Jesuiten. Die. Eine histor. Skizze. Von Prof. Dr. H. Boehmer. 4. Aufl. (Bd. 49.)
Jesus. Wahrheit und Dichtung im Leben Jesu. Von Kirchenrat Pfarrer D. Dr. P. Mehlhorn. 2. Aufl. (Bd. 137.)
— **Die Gleichnisse Jesu.** Zugleich Anleitung zum quellenmäßigen Verständnis der Evangelien. Von Prof. D. Dr. H. Weinel. 4. Aufl. (Bd. 46.)
— s. auch Bergpredigt.
Israelitische Religion siehe Religion.
Kant, Immanuel. Darstellung und Würdigung. Von Prof. Dr. O. Külpe. 4. Aufl. hrsg. v. Prof. Dr. A. Messer. Mit 1 Bildnis Kants. (Bd. 146.)
Kirche. Geschichte der christlichen Kirche. Von Prof. Dr. H. Frhr. v. Soden: I. Die Entstehung der christlichen Kirche. (Bd. 690.) II. Vom Urchristentum zum Katholizismus. (Bd. 691.)
— siehe auch Staat und Kirche.
Kriminalpsychologie s. Psychologie d. Verbrechers, Handschriftenbeurteilung.
Kulturreligionen. s. Religion.
Leben. Das L. nach dem Tode i. Glauben der Menschheit. Von Prof. Dr. C. Clemen. (Bd. 506.)
Lebensanschauungen siehe Sittliche L.
Leib und Seele. Von Dr. phil. et med. G. Sommer. (Bd. 702.)
Locke, Berkeley, Hume. Die großen engl. Philos. Von Oberlehrer Dr. P. Thormeyer. (Bd. 481.)
Logik. Grundriß d. L. Von Dr. K. J. Grau. (Bd. 637.)
Luther. Martin L. u. d. deutsche Reformation. Von Prof. Dr. W. Köhler. 2. Aufl. Mit 1 Bildnis Luthers. (Bd. 515.)
— s. auch Von L. zu Bismarck Abt. IV.
Mechanik d. Geisteslebens. Die. V. Geh. Medizinalrat Direktor Prof. Dr. M. Verworn. 4. A. M. 19 Abb. (Bd. 206.)

*) Hierzu Teuerungszuschläge des Verlags und der Buchhandlungen.

[illegible] 2 19. 400 T.

Mission. Die evangelische. Geschichte. Arbeitsweise. Heutiger Stand. V. Pastor S. Baudert. (Bd. 406.)
Mystik in Heidentum u. Christentum. V. Prof. Dr. Edv. Lehmann. 2. Aufl. V. Verf. durchges. übersetz. v. Anna Grundtvig geb. Quittenbaum. (Bd. 217.)
Mythologie. Germanische. Von Prof. Dr. J. von Negelein. 3. Aufl. (Bd. 95.)
Naturphilosophie. Die moderne. V. Priv.-Doz. Dr. J. M. Verweyen. 2. A. (491.)
Palästina und seine Geschichte. Von Prof. Dr. H. Frh. v. Soden. 4. Aufl. Mit 1 Plan von Jerusalem und 3 Ansichten des Heiligen Landes. (Bd. 6.)
— V. u. s. Kultur in 5 Jahrtausenden. Nach d. neuest. Ausgrabgn. u. Forschgn. dargest. von Prof. Dr. P. Thomsen. 2., neubearb. Aufl. M. 37 Abb. (260.)
Paulus. Der Apostel u. sein Werk. Von Prof. Dr. E. Vischer. (Bd. 309.)
Philosophie. Die. Einführ. i. d. Wissensch., ihr Wes. u. ihre Probleme. Von Oberrealschuldir. H. Richert. 3. Aufl. (186.)
— Einführung in die Ph. Von Prof. Dr. R. Richter. 4. Aufl. von Priv.-Doz. Dr. M. Brahn. (Bd. 155.)
— Führende Denker. Geschichtl. Einleit. in die Philosophie. Von Prof. Dr. J. Cohn. 4. Aufl. Mit 6 Bildn. (Bd. 176.)
— Die Phil. d. Gegenw. in Deutschland. V. Prof. Dr. O. Külpe. 6. Aufl. (41.)
Poetik. Von Dr. R. Müller-Freienfels. (Bd. 460.)
Psychologie. Einführ. i. d. Ps. V. Prof. Dr. E. von Aster. 2. Aufl. M. 4 Abb. (492.)
— Psychologie d. Kindes. V. Prof. Dr. R. Gaupp. 4. Aufl. M. 17 Abb. (213/214.)
— Psychologie d. Verbrechers. (Kriminalpsychol.) V. Strafanstaltsdir. Dr. med. V. Vollitz. 2. Aufl. M. 5 Diagr. (Bd. 248.)
— Einführung in die experiment. Psychologie. Von Prof. Dr. N. Braunshausen. 2. Aufl. M. 17 Abb. i. T. (484.)
— s. auch Handschriftenbeurteilg., Hypnotismus u. Sugg., Mechanik d. Geisteslebens, Poetik, Seele d. Menschen, Veranlag. u. Vererb., Willensfreiheit; Pädag. Abt. II.
Reformation siehe Calvin, Luther.
Religion. Die Stellung der R. im Geistesleben. Von Konsistorialrat Lic. Dr. P. Kalweit. 2. Aufl. (Bd. 225.)
— Relig. u. Philosophie im alten Orient. Von Prof. Dr. E. von Aster. (Bd. 521.)
— Einführung in die allg. R.-Geschichte. Von Prof. D. Dr. K. Beth. (Bd. 658.)
— Die nichtchristlichen Kulturreligionen in ihrem gegenwärtigen Zustand. Von Prof. Dr. C. Clemen. (Bd. 533.)
— Die Religion der Griechen. Von Prof. Dr. E. Samter. M. Bilderanh. (Bd. 457.)
— Hellenistisch-röm. Religionsgesch. Von Hofpredig. Lic. A. Jacoby. (Bd. 584.)
Religion. D. Grundzüg. d. israel. Religionsgesch. V. Prof. D. Fr. Giesebrecht. 3. A. V. Prof. D. A. Bertholet. (52.)
— Religion u. Naturwissensch. in Kampf u. Friede. E. geschichtl. Rückbl. V. Pfarr. Dr. A. Pfannkuche. 2. A. (Bd. 141.)
— Die relig. Strömungen der Gegenwart. V. Sup. D. A. H. Braasch. 3. A. (66.)
— s. a. Bergson, Buddha, Calvin, Christentum, Luther.
Rousseau. Von Prof. Dr. P. Hensel. 3. Aufl. Mit 1 Bildnis. (Bd. 180.)
Schopenhauer. Seine Persönlichk., s. Lehre, s. Bedeutg. V. Oberrealschuldir. H. Richert. 3. Aufl. Mit 1 Bildnis. (Bd. 31.)
Seele des Menschen. Die. Von Geh. Rat Prof. Dr. J. Rehmke. 4. Aufl. (Bd. 36.)
— siehe Leib u. Seele, auch Psychologie.
Sexualethik. Von Prof. Dr. H. E. Timerding. (Bd. 592.)
Sinne d. Menschen. D. Sinnesorgane und Sinnesempfind. V. Hofr. Prof. Dr. J. K. Kreibig. 3., vrb. A. M. 30 Abb. (27.)
Sitti. Lebensanschauungen d. Gegenwart. V. Gh. Kirchenr. Prof. D. O. Kirn. 3. A. V. Prof. D. Dr. O. Stephan. (177.)
— s. a. Ethik, Sexualethik.
Spencer, Herbert. Von Dr. K. Schwarze. Mit 1 Bildnis. (Bd 245.)
Staat und Kirche in ihrem gegenseitigen Verhältnis seit der Reformation. Von Pfarr. Dr. A. Pfannkuche. (Bd. 485.)
Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte u. d. Wes. d. Astrolog. Unt. Mitw. v. Geh. Rat Prof. Dr. K. Bezold dargest. v. Geh. Hofr. Prof. Dr. Fr. Boll. 2. Aufl. M. 1 Sternk. u. 30 Abb. (Bd. 638.)
Suggestion s. Hypnotismus.
Testament. Das Alte. Seine Gesch. u. Bedeutg. V. Prof. Dr. V. Thomsen. (609.)
— Neues. Der Text d. N. T. nach s. geschichtl. Entwickl. V. Div.-Pfarr. Prof. Lic. A. Pott. 2. Aufl. M. Taf. (Bd. 134.)
Theologie. Einführung in die Theologie. Von Pastor M. Cornils. (Bd. 347.)
Veranlagung u. Vererbung. Geistige. V. Dr. phil. et med. G. Sommer. (Bd. 512.)
Urchristentum siehe Christentum.
Weltanschauung. Griechische. Von Prof. Dr. M. Wundt. 2. Aufl. (Bd. 329.)
Weltanschauungen. D., d. groß. Philosophen der Neuzeit. Von Prof. Dr. L. Busse. 6. Aufl., hrsg. v. Geh. Hofrat Prof. R. Falckenberg. (Bd. ...)
Weltentstehung. Entstch. d. W. u. d. ... nach Sage u. Wissenschaft. Von Prof. ... M. V. Weinstein. 3. Aufl. (Bd. ...)
Weltuntergang. Untergang der Welt ... der Erde nach Sage und Wissenschaft. Von Prof. Dr. M. V. Weinstein. (Bd. ...)
Willensfreiheit. Das Problem der ... Prof. Dr. G. F. Lipps. 2. Aufl. (Bd. ...)
— s. a. Ethik, Mechan. d. Geisteslebens, Pä...

II. Pädagogik und Bildungswesen.

Berufswahl, Begabung u. Arbeitsleistung in ihren gegenseitigen Beziehungen. Von W. J. Ruttmann. M. 7 Abb. (Bd. 522.)

Bildungswesen, D. deutsche, in s. geschichtlichen Entwicklung. Von Prof. Dr. Fr. Paulsen. 3. Aufl. Von Prof. Dr. W. Münch. M. Bildn. Paulsens. (Bd. 100.)
— s. auch Volksbildungswesen.

Erziehung, E. zur Arbeit. Von Prof. Dr. Edv. Lehmann. (Bd. 459.)
— **Deutsche E. in Haus u. Schule.** Von J. Tews. 3. Aufl. (Bd. 159.)
— siehe auch Großstadtpädagogik.

Fortbildungsschulwesen, Das deutsche. Von Dir. Dr. F. Schilling. (Bd. 256.)

Fröbel, Friedrich. Von Dr. Joh. Prüfer. Mit 1 Tafel. (Bd. 82.)

Großstadtpädagogik. V. J. Tews. (327.)
— siehe Erzieh., Schulkämpfe d. Gegenw.

Herbarts Lehren und Leben. Von Pastor O. Flügel. 2. Aufl. Mit 1 Bildnis Herbarts. (Bd. 164.)

Hochschulen s. Techn. Hochschulen u. Univ.

Jugendpflege. Von Fortbildungsschullehrer W. Wiemann. (Bd. 434.)

Leibesübungen siehe Abt. V.

Mittelschule s. Volks- u. Mittelschule.

Pädagogik, Allgemeine. Von Prof. Dr. Th. Ziegler. 4. Aufl. (Bd. 33.)
— **Experimentelle P.** mit bes. Rücksicht auf die Erzieh. durch die Tat. Von Dr. W. A. Lay. 3., vrb. A. M. 6 Abb. (Bd. 224.)
— s. Erzieh., Großstadtpäd.; Handschriftenbeurteilung, Psychol., Veranlag. u. Vererb. Abt. I.

Pestalozzi. Leben und Ideen. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. P. Natorp. 3. Aufl. Mit Bildn. u. 1 Brieffaksimile. (Bd. 250.)

Rousseau. Von Prof. Dr. P. Henkel. 3. Aufl. Mit 1 Bildnis. (Bd. 180.)

Schule siehe Fortbildungs-, Hilfsschulwes., Techn. Hoch-, Mädch.-, Volksschule, Univ.

Schulhygiene. Von Prof. Dr. S. Burgerstein. 3. Aufl. M. 33 Fig. (Bd. 96.)

Schulkämpfe d. Gegenw. Von J. Tews. 2. Aufl. (Bd. 111.)
— siehe Erziehung, Großstadtpäd.

Student, Der Leipziger, von 1409 bis 1909. Von Dr. W. Bruchmüller. Mit 25 Abb. (Bd. 273.)

Studententum, Geschichte des deutschen St. Von Dr. W. Bruchmüller. (Bd. 477.)

Techn. Hochschulen in Nordamerika. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. C. Müller. M. zahlr. Abb., Karte u. Lagepl. (190.)

Universitäten, über U. u. Universitätsstud. V. Prof. Dr. Th. Ziegler. Mit 1 Bildn. Humboldts. (Bd. 411.)

Unterrichtswesen, Das deutsche, der Gegenwart. Von Geh. Studienrat Oberrealschuldir. Dr. K. Knabe. (Bd. 299.)

Volksbildungswesen, Das mod. V. Stadtbbl. Prof. Dr. G. Fritz. M. 14 Abb. (266.)

Volks- und Mittelschule, Die preußische, Entwicklung und Ziele. Von Geh. Reg.- u. Schulrat Dr. A. Sachse. (Bd. 432.)

Zeichenkunst. Der Weg zur K. Ein Buch f. theor. u. prakt. Selbstbd. V. Dr. E. Weber. 2. A. M. 81 Abb. u. 1 Farbt. (430.)

III. Sprache, Literatur, Bildende Kunst und Musik.

Architektur siehe Baukunst und Renaissancearchitektur.

Ästhetik. Von Prof. Dr. R. Hamann. 2. Aufl. (Bd. 345.)
— **Einführung i. d. Geschichte d. Ä.** Von Dr. H. Nohl. (Bd. 502.)

Baukunst. Deutsche B. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Matthaei. 4 Bde. I. Deutsche Baukunst im Mittelalter. B. d. Anf. b. z. Ausgang d. roman. Baukunst. 4. Aufl. Mit 35 Abb. (Bd. 8.) II. Gotik u. „Spätgotik". 4. Aufl. Mit 67 Abb. (Bd. 9.) III. Deutsche Baukunst in d. Renaissance u. d. Barockzeit b. z. [illegible] d. 18. Jahrh. 2. Aufl. Mit 63 Abb. [illegible]rt. (Bd. 326.) IV. Deutsche B. im [illegible]jahrh. Mit 35 Abb. (Bd. 453.)
[illegible]he auch Renaissancearchitektur.
[illegible]hnen siehe Handw.
[illegible]nde Kunst, Bau und Leben der b. K. [illegible]. Dir. Prof. Dr. Th. Volbehr. [illegible]ufl. Mit 44 Abb. (Bd. 68.)
[illegible]he auch Baukunst, Griech. Kunst, [illegible]reRenaissance, Kunst, Maler, Mo-Stile.

Björnson siehe Ibsen.

Buch, Wie ein Buch entsteht siehe Abt. VI.
— s. auch Schrift- u. Buchwesen Abt. IV.

Dekorative Kunst d. Altertums. V. Dr. Fr. Poulsen. M. 112 Abb. (Bd. 454.)

Deutsch siehe Baukunst, Drama, Frauendichtung, Heldensage, Kunst, Literatur, Lyrik, Maler, Malerei, Personennamen, Romantik, Sprache, Volkslied, Volkssage.

Drama, Das. Von Dr. H. Busse. Mit Abb. 3 Bde. I: Von d. Antike z. franz. Klassizismus. 2. A., neub. v. Oberl. Dr. Riedlich. Prof. Dr. R. Imelmann u. Prof. Dr. Glaser. M. 3 Abb. II: Von Berühmtes bis Weimar. 2. Aufl. III: Von d. Romantik z. Gegenwart. (Bd. 237.)

Drama, D. deutsche, d. 19. Jahrh. Z. s. Entwickl. dgest. v. Prof. Dr. H. Wittowski. 4. Aufl. M. Bildn. Hebbels. (Bd. 51.)
— siehe auch Grillparzer, Hauptmann, Hebbel, Ibsen, Lessing, Literatur, Schiller, Shakespeare, Theater.

Dürer, Albrecht. V. Prof. Dr. K. Justmann. 2. Aufl. von Geh. Reg. Rat Prof. Dr. A. Matthaei. Mit Titelb. u. zahlr. Abbildungen. (Bd. 97.)

Französisch siehe Roman.
Frauendichtung. Geschichte der deutschen F. seit 1800. Von Dr. H. Spiero. Mit 3 Bildnissen auf 1 Tafel. (Bd. 390.)
Fremdwortkunde. Von Dr. E. Richter.
Gartenkunst siehe Abt. VI. (Bd. 570.)
Griech. Komödie, Die. V. Geh.-Rat Prof. Dr. A. Korte. M. Titelb. u. 2 Taf. (400.)
Griechische Kunst. Die Blütezeit der g. K. im Spiegel der Reliefsarkophage. Eine Einf. i. d. griech. Plastik. V. Prof. Dr. H. Wachtler. 2. A. M. zahlr. Abb. (272.)
— siehe auch Dekorative Kunst.
Griech. Tragödie, Die. V. Prof. Dr. J. Geffcken. M. 5 Abb. i. T. u. a. 1 Taf. (566.)
Grillparzer, Franz. Von Prof. Dr. A. Kleinberg. M. Bildn. (Bd. 513.)
Harmonielehre. Von Dr. H. Scholz. (Bd. 703/04.)
Harmonium s. Tasteninstrum.
Hauptmann, Gerhart. V. Prof. Dr. E. Sulger-Gebing. Mit 1 Bildn. 2., verb. u. verm. Aufl. (Bd. 283.)
Haydn, Mozart, Beethoven. V. Prof. Dr. T. Kroyer. 2 Aufl. M. 4 Bildn. (92.)
Hebbel, Friedrich. V. Geh. Hofr. Prof. Dr. O. Walzel. 2. A. M. 1 Bildn. (408.)
Heldensage, Die germanische. Von Dr. J. W. Bruinier. (Bd. 486.)
— siehe auch Volkssage.
Homerische Dichtung, Die. Von Rektor Dr. G. Finsler. (Bd. 496.)
Ibsen, Björnson u. i. Zeitgenossen. Von Prof. Dr. B. Kahle. 2 Aufl. v. Dr. G. Morgenstern. M. 7 Bildn. (Bd. 103.)
Impressionismus, Die Maler des J. Von Prof. Dr. B. Lázár. 2. A. M. 32 Abb. u. 1 farb. Tafel. (Bd. 395.)
Instrumente s. Tasteninstrum., Orchester.
Klavier siehe Tasteninstrumente.
Komödie siehe Griech. Komödie.
Kunst, Das Wesen der deutschen bildenden K. Von Geh. Rat Prof. Dr. H. Thode. (Bd. 585.)
— s. a. Bauk., Bild., Dekor., Griech. K.; Pompeji. Stile; Garten. Abt. VI.
Kunstpflege in Haus u. Heimat. 3. Aufl. Mit Abb. (Bd. 77.)
Lessing. Von Dr. Ch. Schrempf. Mit einem Bildnis. (Bd. 403.)
Literatur. Entwickl. der deutsch. L. seit Goethes Tod. V. Dr. W. Brecht. (595.)
Lyrik. Geschichte d. deutsch. L. s. Claudius. V. Dr. H. Spiero. 2. Aufl. (Bd. 254.)
— siehe auch Frauendichtung, Literatur, Minnesang, Volkslied.
Maler, Die altdeutschen, in Süddeutschland. Von H. Nemitz. Mit 1 Abb. i. Text und Bilderanhang. (Bd 464.)
— s. Michelangelo, Impression. Rembrandt.
Malerei. Die deutsche, im 19. Jahrh. Von Prof. Dr. R. Hamann. 2 Bde. Text, 2. Bde m. 57 ganzseit. u. 200 halbs. Abb., a. i. Geschkausg. erhältl. (Bd. 448—451.)
Malerei, Niederl. M. i. 17. Jahrh. V. Prof. Dr. H. Jantzen. Mit 37 Abb.
— siehe auch Rembrandt. (Bd. 373.)
Märchen s. Volksmärchen.
Michelangelo. Eine Einführung in das Verständnis seiner Werke. V. Prof. Dr. G. Hildebrandt. Mit 44 Abb (392.)
Minnesang. D. Liebe i. Liede d. dtsch. Mittelalt. V. Dr. J. W. Bruinier. (404.)
Mozart siehe Haydn.
Musik. Die Grundlagen d. Tonkunst. Versuch einer entwicklungsgesch. Darstell. d. allg. Musiklehre. Von Prof. Dr. H. Rietsch. 2. Aufl. (Bd. 178.)
— **Musikalische Kompositionsformen.** V. S. G. Kallenberg. Band I: Die elementar. Tonverbindungen als Grundlage d. Harmonielehre. Bd. II: Kontrapunktik u. Formenlehre. (Bd. 412. 413.)
— **Geschichte der Musik.** Von Dr. A. Einstein. (Bd 438.)
— **Beispielsammlung zur älteren Musikgeschichte** V. Dr. A. Einstein (439.)
— **Musikal. Romantik. Die Blütezeit d. m. K. in Deutschland.** Von Dr. E. Istel. Mit 1 Silhouette (Bd. 239.)
— s. a. Haydn. Mozart. Beethoven, Oper, Orchester, Tasteninstrumente, Wagner.
Mythologie. Germanische Von Prof. Dr. J. v. Negelein. 3. Aufl. (Bd. 95.)
— siehe auch Volkssage, Deutsche.
Niederländische Malerei s. Malerei.
Novelle siehe Roman.
Oper, Die moderne. Vom Tode Wagners bis zum Weltkrieg (1883—1914). Von Dr. E. Istel. Mit 3 Bildn. (Bd. 495.)
— siehe auch Haydn. Wagner.
Orchester. Das moderne Orchester. Von Prof. Dr. Fr. Volbach. I. Die Instrumente d. O. (Bd. 384.) II. D. mod. O. i. s. Entwickig. 2. Aufl. (Bd. 308.)
Orgel siehe Tasteninstrumente.
Personennamen, D. deutsch. V. Geh. Studienrat A. Bähnisch. 2. A. (Bd. 296.)
Perspektive, Grundzüge der P. nebst Anwendungen. Von Prof. Dr. K. Doehlemann. Mit 91 Fig. u. 11 Abb. (510.)
Phonetik. Einführ. i. d. Ph. Wiss. sprechen. V. Dr. E. Richter. M. 20 A. (354.)
Photographie, D. künstler. Ihre Entwickig., ihre Probl., i. Bedeutg. V. Dr. W. Warstat. 2., vrb. Aufl. M. Bilderanh. (410.)
— s. auch Photographie Abt. VI.
Plastik s. Griech. Kunst, Michelang.
Poetik. Von Dr. R. Müller-Freienfels. (Bd. 4
Pompeji. Eine hellenist. Stadt in Italien. Von Prof. Dr. Fr. v. D. 3. Aufl. M. 62 Abb. i. T. u. auf 1 sowie 1 Plan. (Bd.
Projektionslehre. In kurzer leichtfaßl. Darstellung f. Selbstunterr. und Gebrauch. V. Zeichenl. A. Schubert. Mit 164 Fig. (Bd

Rembrandt. Von Prof. Dr. V. Schubring. 2. Aufl. Mit 48 Abb. auf 28 Taf. i. Anh. (Bd. 158.)

Renaissancearchitektur in Italien. Von Dr. P. Frankl. 2 Bde. I. M. 12 Taf. u. 27 Textabb. II. M. Abb. (Bd. 381/382.)

Rhetorik. Von Prof. Dr. E. Geißler. 2. Bde. 2. Aufl. I. Richtlinien für die Kunst des Sprechens. II. Deutsche Redekunst. (Bd. 455/456.)

Roman. Der französische Roman und die Novelle. Ihre Geschichte v. d. Anf. b. z. Gegenw. Von O. Flake. (Bd. 377.)

Romantik, Deutsche. V. Geh. Hofrat Prof. Dr. O. F. Walzel. 4. Aufl. I. Die Weltanschauung. II. Die Dichtung. (Bd. 232/233.)

— **Die Blütezeit der mus. R. in Deutschland.** Von Dr. E. Istel. (Bd. 239.)

Sage siehe Heldensage, Mythol., Volkssage.

Schauspieler, Der. Von Prof. Dr. Ferdinand Gregori. (Bd. 692.)

Schiller. Von Prof. Dr. Th. Ziegler. Mit 1 Bildn. 3. Aufl. (Bd. 74.)

Schillers Dramen. Von Programmsaldirektor E. Heusermann. (Bd 493.)

Shakespeare und seine Zeit. Von Prof. Dr. E. Sieper. M. 3 Abb. 2. Aufl. (185.)

Sprache. Die Haupttypen des menschlich. Sprachbaus. Von Prof. Dr. F. N. Finck. 2. Aufl. v. Prof. Dr. E. Kieckers. (268.)

— **Die deutsche Sprache von heute.** Von Dr. W. Fischer. (Bd. 475.)

— **Fremdwortkunde.** Von Dr. Elise Richter. (Bd. 570.)

— siehe auch Phonetik, Rhetorik; ebenso Sprache u. Stimme Abt. V.

Sprachstämme, Die, des Erdkreises. Von Prof. Dr. F. N. Finck. 2. Aufl. (Bd. 267.)

Sprachwissenschaft. Von Prof. Dr. Kr. Sandfeld-Jensen. (Bd. 472.)

Stile, Die Entwicklungsgesch. d. St. in der bild. Kunst. V. Dr. E. Cohn-Wiener. 2. Aufl. I.: V. Altertum b. z. Gotik. M. 66 Abb. II.: V. d. Renaissance b. z. Gegenwart. Mit 42 Abb. (Bd. 317/318.)

Tasteninstrumente. Klavier, Orgel, Harmonium. Das Wesen der Tasteninstrumente. V. Prof. Dr. O. Bie. (Bd. 325.)

Theater, Das. Schauspielhaus u. -kunst v. griech. Altert. bis auf d. Gegenw. V. Prof. Dr. Chr. Gaehde. 2. A. 18 Abb. (Bd. 230.)

Tragödie s. Griech. Tragödie.

— siehe auch Schauspieler.

Urheberrecht siehe Abt. VI.

Volkslied, Das deutsche. Über Wesen und Werden d. deutschen Volksgesanges. Von Dr. J. W. Bruinier. 5. Aufl. (Bd. 7.)

Volksmärchen, Das deutsche. V. Pfarrer K. Spieß. (Bd. 587.)

Volkssage, Die deutsche. Übersicht. dargest. v. Dr. O. Böckel. 2. Aufl. (Bd. 262.)

— siehe auch Heldensage, Mythologie.

Wagner, Das Kunstwerk Richard W.s. Von Dr. E. Istel. M. 1 Bildn. 2. Aufl. (330.)

— siehe auch Musikal. Romantik u. Oper.

Zeichenkunst. Der Weg z. Z. Ein Buch ein für theoretische und praktische Selbstbildung. Von Dr. E. Weber. 2. Aufl. Mit 81 Abb. u. 1 Farbtafel. (Bd. 430.)

— s. auch Perspektive, Projektionslehre; Geomtr. Zeichnen Abt. V, Techn. Abt. VI.

Zeitungswesen. V. Dr. H. Dietz. (Bd. 328.)

IV. Geschichte, Kulturgeschichte und Geographie.

Alpen, Die. Von H. Reishauer. 2., neub. Aufl. von Dr. H. Slanar. Mit 26 Abb. und 2 Karten. (Bd. 276.)

Altertum, Das, im Leben der Gegenwart. V. Prov.-Schul- u. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. P. Cauer. 2. Aufl. (Bd. 356.)

— **D. Altertum, seine staatliche u. geistige Entwicklung und deren Nachwirkungen.** Von Oberlehr. H. Preller. (Bd. 642.)

Amerika. Gesch. d. Verein. Staaten v. A. V. Prof. Dr. E. Daenell. 2. A. (Bd. 147.)

Amerikaner, Die. V. M. Butler. Dtsch. v. Prof. Dr. W. Paszkowski. (319.)

Antike Wirtschaftsgeschichte. V. Privatdoz. O. Neurath. 2. Auflage. (Bd. 258.)

... s Leben nach den ägyptischen Papyri. Geh. Postrat Prof. Dr. Fr. Preisigke. Mit 1 Tafel. (Bd. 565.)

... erbewegung s. Soziale Bewegungen.

... alien und Neuseeland. Land, Leute Wirtschaft. Von Prof. Dr. R. ...ner. Mit 23 Abb. (Bd. 366.)

Babylonische Kultur, Die, i. Verbreit. u. i. Nachwirkungen auf d. Gegenw. V. Prof. Dr. F. C. Lehmann-Haupt. (Bd. 579.)

Baltische Provinzen. V. Dr. V. Tornius. 3. Aufl. M. 8 Abb. u. 2 Kartenskz. (Bd. 542.)

Bauernhaus, Kulturgeschichte des deutschen. V. Baurat Dr.-Ing. Chr. Rauch. 3. Aufl. Mit Abb. (Bd. 121.)

Bauernstand. Gesch. d. dtsch. V. V. Prof. Dr. H. Gerdes. 2., verb. Aufl. Mit 22 Abb. i. Text (Bd. 320.)

Belgien. Von Dr. P. Oßwald. 3 Aufl. Mit 4 Karten i. T. (Bd. 501.)

Bismarck und seine Zeit. Von Professor Dr. P. Valentin. Mit einem Titelbild. 4., durchges. Aufl. (Bd. 500.)

Böhmen. Zur Einführung in die böhmische Frage. Von Prof. Dr. R. F. Kaindl. Mit 1 Karte. (Bd. 701.)

Brandenburg.-preuß. Gesch. Von Archivar Dr. Fr. Israel. 2 Bde I. Von d. ersten Anfängen b. z. Tode König Fr. Wilhelms I. 1740. II. Von dem Regierungsantritt Friedrichs d. Gr. bis zur Gegenwart. (Bd. 440/441.)

Bürger im Mittelalter s. Städte.
Calvin. Johann. Von Pfarrer Dr. G. Seeberg. Mit 1 Bildnis. 2. Aufl. (Bd. 247.)
China. V. Prof. Dr. A. Conrady (557.)
Christentum u. Weltgeschichte seit der Reformation. Von Prof. D. Dr. K. Sell. 2 Bde. (Bd 297/298.)
Deutsch siehe Bauernhaus, Bauernstand, Dorf, Feste, Frauenleben, Geschichte, Handel, Handwerk, Reich, Staat, Städte, Verfassung, Verfassungsrecht, Volkskunde, Volksstämme, Volkstrachten, Wirtschaftsleben usw.
Deutschtum im Ausland, Das, vor dem Weltkriege. Von Prof. Dr. R. Hoeniger. 2. Aufl. (Bd. 402.)
Dorf, Das deutsche. V. Prof. R. Mielke. 2. Aufl. Mit 51 Abb. (Bd. 192.)
Eiszeit, Die, und der vorgeschichtliche Mensch. Von Geh. Bergrat Prof. Dr. G. Steinmann. 2. Aufl. M. 24 Abbildungen. (Bd. 302.)
Englands Weltmacht in ihrer Entwickl. seit d. 17. Jahrh. M. Bildn. v. Dir. Prof. Dr. W. Langenbeck. 2. Aufl. (Bd. 174.)
Entdeckungen, Das Zeitalter der G. Von Prof. Dr. S. Günther. 3. Aufl. Mit 1 Weltkarte. (Bd. 26.)
Erde siehe Mensch u. E.
Erdkunde, Allgemeine. 3 Bde. Mit Abb. I. Die Erde, ihre Beweg. u. ihre Eigenschaften (math. Geogr. u. Geonomie). Von Admiralitätsr. Prof. Dr. E. Kohlschütter. (Bd. 625.) II. Die Atmosphäre der Erde (Klimatologie, Meteorologie). Von Prof. O. Baschin. (Bd. 626.) III. Geomorphologie. Von Prof. F. Machatschek. M. 33 Abb. (Bd. 627.) IV. Physiogeographie d. Süßwassers. V. Prof. F. Machatschek. M. 24 Abb. (Bd. 628.) V. Die Meere. Von Prof. Dr. A. Merz. (Bd. 629.) VI. Die Verbreitung der Pflanzen. Von Dr. Brockmann-Jerosch. (Bd. 630.) VII. Die Verbreitg. d. Tiere. V. Dr. W. Knopfli. (Bd. 631.) VIII. Die Verbreitg. d. Menschen auf d. Erdoberfläche (Anthropogeographie). V. Prof. Dr. N. Krebs. (Bd. 632.)
Europa. Vorgeschichte E.'s. Von Prof. Dr. H. Schmidt. (Bd. 571/572.)
Familienforschung. Von Dr. E. Devrient. 2. Aufl. M. 6 Abb. i. T. (350.)
Feldherren, Große. Von Major F. C. Endres. (Bd 687/688.)
Feste, Deutsche, u. Volksbräuche. V. Priv.-Doz. Dr. E. Fehrle. M. 30 Abb. (Bd. 518.)
Finnland. Von Lektor F. Ohquist. (700.)
Französ. Geschichte. I.: D. frz. Königstum. V. Prof. Dr. R. Schwemer. (Bd. 574.)
— siehe auch Napoleon, Revolution.
Frauenbewegung, Die mod. V. Dr. Marie Bernays. (Bd. 723.)
Frauenleben. Deutsch., i. Wandel d. Jahrhunderte. Von Geh. Schulrat Dr. Eb. Otto. 3. Aufl. 12 Abb. i. T. (Bd. 45.)
Friedrich d. Gr. 6 Vortr. V. Prof. Dr. Th. Bitterauf. 2. A. M. 2 Bildn. (246.)
Gartenkunst. Gesch. d. G. V. Baurat Dr.-Ing. Chr. Rauch. M. 41 Abb. (274.)
Geographie der Vorwelt (Paläogeographie) Von Priv.-Doz. Dr. E. Dacque. Mit 78 Abb. (Bd. 610.)
— **Einführg. i. d. Studium der G.** Von Prof. Dr. O. Braun. (Bd. 693.)
Geologie siehe Abt. V.
German. Heldensage s. Heldensage.
Germanische Kultur in der Urzeit. Von Bibliotheksdir. Prof. Dr. O. Steinhausen. 3. Aufl. Mit 13 Abb. (Bd. 75.)
Geschichte, Deutsche, im 19. Jahrh. b. z. Reichseinheit. V. Prof. Dr. R. Schwemer. 3 Bde. I.: Von 1800—1848. Restauration und Revolution. 3. Aufl. (Bd. 37.) II.: Von 1848—1862. Die Reaktion und die neue Ära. 2. Aufl. (Bd. 101.) III.: Von 1862—1871. V. Bund z. Reich. 2. Aufl. (Bd. 102.)
Gesellschaft u. Geselligkeit in Vergangenh. u. Gegenwart. Von Oberin S. Krautwein. (Bd. 706.)
Griechentum. Das G. in seiner geschichtlichen Entwicklung. Von Prof. Dr. R. v. Scala. Mit 46 Abb. (Bd. 471.)
Griechische Städte. Kulturbilder aus gr. St. Von Professor Dr. E. Ziebarth. 2. A. M. 23 Abb. u. 2 Tafeln. (Bd. 131.)
Handel. Geschichte d. Welthandels. Von Realgymnasial-Dir. Prof. Dr. M. G. Schmidt. 3. Aufl. (Bd. 118.)
— **Geschichte des deutschen Handels** seit d. Ausgang des Mittelalters. Von Dir. Prof. Dr. W. Langenbeck. 2. Aufl. Mit 16 Tabellen. (Bd. 237.)
Handwerk, Das deutsche, in seiner kulturgeschichtl. Entwickl. Von Geh. Schulrat Dr. E. Otto. 4. Aufl. Mit 33 Abb. auf 12 Tafeln. (Bd. 14.)
— siehe auch Dekorative Kunst Abt. III.
Haus. Kunstpflege in Haus und Heimat. 3. Aufl. Mit Abb. (Bd. 77.)
— siehe auch Bauernhaus, Dorf.
Heldensage, Die germanische. Von Dr. J. W. Bruinier. (Bd. 486.)
Hellenist.-röm. Religionsgeschichte s. Abt. I.
Jesuiten, Die. Eine hist. Skizze. Von Prof. Dr. H. Boehmer. 4. Aufl. (Bd. [illegible]
Indien. Von Prof. Dr. Sten Kon (Bd. [illegible]
Indogermanenfrage. Von Dir. Dr. Agahd. (Bd. [illegible]
Island, d. Land u. d. Volk. V. Prof. Dr. Herrmann. M. 9 Abb. (Bd 4
Kaisertum und Papsttum. Von Prof. A. Hofmeister. (Bd. 6

Kartenkunde. Vermessungs- u. K. 6 Bde. Mit Abb. I. Geogr. Ortsbestimmung. Von Prof. Schnauder. (Bd 606.) II. Erdmessung. Von Prof Dr. O. Eggert. (Bd. 607.) III. Landmess. B. Geh. Finanzrat Suckow. (Bd. 668.) IV. Ausgleichungsrechnung. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. E. Hegemann. (Bd. 609.) V. Photogrammetrie und Stereophotogrammetrie. Von Diplom-Ing H. Lüscher. (Bd. 610) VI. Kartenkunde. Von Finanzrat Dr.-Ing. A. Egerer. 1. Einführ. i. d Kartenverständnis. 2. Kartenherstellung (Landesaufn.) (Bd 611/612.)
Kirche s. Staat u. K.; Kirche Abt. I.
Kolonien, Die deutschen. (Land u. Leute.) Von Dr. A. Heilborn. 3. Aufl. Mit 28 Abb. u. 8 Karten. (Bd. 98.)
Königstum, Französisches. Von Prof Dr. R. Schwemer (Bd 574.)
Krieg. Kulturgeschichte d. Kr. Von Prof. Dr. K. Weule, Geh. Hofrat Prof Dr. E. Bethe, Prof. Dr. B. Schmeidler, Prof. Dr. A. Doren, Prof. Dr. W. Herre. (Bd. 561.)
— **Der Dreißigjährige Krieg.** Von Dr. Fritz Endres. (Bd. 577.)
— s. auch Feldherren.
Kriegsschiffe, Unsere. Ihre Entstehung u. Verwendung. B. Geh. Mar.-Baur. a. D. E. Krieger. 2. Aufl. v. Geh. Mar.-Baur. Fr. Schürer. M 62 Abb. (389.)
Luther, Martin L. u. d. dtsche. Reformation. Von Prof. Dr. W Köhler. 2., verb. Aufl. M. 1 Bildn. Luthers. (Bd. 515.)
— s. auch Von L. zu Bismarck.
Marx, Karl. Versuch einer Einführg. v. Prof. Dr. R. Wilbrandt. 2. A (621.)
Mensch u. Erde. Skizzen v. den Wechselbeziehungen zwischen beiden. Von Geh. Rat Prof Dr A Kirchhoff. 4. Aufl.
— s. a. Eiszeit; Mensch Abt V. [(Bd. 31.)
Mittelalter. Mittelalterl. Kulturideale. B Prof. Dr. B. Bedel. I.: Heldenleben. II: Ritterromantik. (Bd 292. 293.)
— s. auch Städte u. Bürger i. M.
Moltke. Von Major F. C. Endres. Mit 1 Bildn. (Bd. 415.)
Münze. Grundriß d. Münzkunde. 2. Aufl. I. Die Münze nach Wesen, Gebrauch u. Bedeutg. B Hofrat Dr. A. Luschin v. Ebengreuth. M. 56 Abb. II. Die Münze v. Altertum b. z. Gegenw. Von Prof. Dr. H Buchenau. (Bd. 91. 657.)
- a. Finanzwiss., Geldwesen Abt VI.
- ...sche Kultur, Die. Von Prof. Dr. F. Lehmann-Haupt. (Bd. 581.)
- ...logie s. Abt I.
- ...ren I. Von Prof. Dr. Th. Bitter. 3 Aufl Mit 1 Bildn. (Bd. 195.)
- ...selbewußtsein siehe Volk.
- ... u. Mensch. B. Dir. Prof. Dr. M. Schmidt. M. 19 Abb. (Bd. 458.)
Naturvölker. Die geistige Kultur der N. B. Prof Dr K. Th. Preuß. M. 9 Abb.
— s. a Völkerkunde, allg. [(Bd. 452.)
Neugriechenland. Von Prof. Dr. A. Heisenberg. (Bd. 613.)
Neuseeland s. Australien.
Orient s. Indien, Palästina, Türkei.
Osten. Der Zug nach dem O. Die Großtat d. deutsch. Volkes i. Mittelalt. B. Geh. Hofrat Prof. Dr. Hampe. (Bd. 731.)
Ostmark s. Abt. VI.
Österreich. O.'s innere Geschichte von 1848 bis 1895. B R. Charmatz. 3., veränd. Aufl I Die Vorherrschaft der Deutschen. II. Der Kampf der Nationen. (651/652.)
— **Geschichte der auswärtigen Politik O.'s im 19. Jahrhundert.** B R. Charmatz. 2., veränd. Aufl. I. Bis zum Sturz Metternichs. II 1848—1895. (653/654.)
— **Österreichs innere u. äußere Politik von 1895—1914.** B R. Charmatz. (655.)
Ostseegebiet, Das. B. Prof. Dr. G. Braun. M. 21 Abb. u. 1 mehrf. Karte. (Bd. 367.)
— s. auch Baltische Provinzen, Finnland.
Palästina und seine Geschichte. Von Prof. Dr. H. Frh. von Soden. 4. Aufl. Mit 1 Plan von Jerusalem u. 3 Aufs. d. Heiligen Landes. (Bd. 6.)
— **B. u. s. Kultur in 5 Jahrtausenden.** Nach d. neuest. Ausgrab. u. Forschungen dargest. von Prof Dr W. Thomsen. 2., neubearb. Aufl. Mit 37 Abb. (260.)
Papsttum s. Kaisertum.
Papyri s. Antikes Leben.
Polarforschung. Geschichte der Entdeckungsreisen zum Nord- u. Südpol v. d. ältest. Zeiten bis zur Gegenw. B Prof. Dr. K. Haisert. 3 Aufl. M 6 Kart. (Bd. 38.)
Polen. Mit einem geschichtl. Überblick üb. d. polnisch-ruthen. Frage B Prof. Dr. R. F. Kaindl. 2., verb. Aufl. M. 6 Kart. (547.)
Politik. B Dr. A. Grabowsky. (Bd. 537.)
— **Umrisse der Weltpol.** B. Prof. Dr. J. Hashagen. 3 Bde. I: 1871—1907. 2 Aufl II: 1908—1914. 2. Aufl. III: D. pol. Ereign. während d. Krieges. (Bd. 553/55.)
— **Politische Geographie.** Von Prof. Dr. W. Vogel. (Bd 634.)
— **Politische Hauptströmungen in Europa im 19. Jahrhundert.** Von Prof. Dr. K. Th. v. Heigel. 4. Aufl. von Dr. Fr. Endres. (Bd. 129.)
Pompeji, eine hellenistische Stadt in Italien. Von Prof Dr. Fr. v. Duhn. 3. Aufl. Mit 62 Abb. i. T. u. auf 1 Taf., sowie 1 Plan. (Bd. 114.)
Preußische Geschichte s. Brandenb.-pr. G.
Reaktion und neue Ära s. Gesch., deutsche.
Reformation s. Calvin, Luther.
Reich. Das Deutsche R. von 1871 b. z. Weltkrieg. B. Archivar Dr. F. Israel. (575.)
Religion s. Abt. I.
Restauration und Revolution siehe Geschichte, deutsche.

Revolution. Geschichte der Französ. R. V. Prof. Dr. Th. Bitterauf. 2. Aufl. Mit 8 Bildn. (Bd. 346.)
— 1848. 6 Vorträge. Von Prof. Dr. O. Weber. 3. Aufl. (Bd. 53.)
Rom. Das alte Rom. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. O. Richter. Mit Bilderanhang u. 4 Plänen (Bd. 286.)
— Die römische Republik. Von Privatdoz. Dr. A. Rosenberg. (Bd. 719.)
— Soziale Kämpfe i. alt. Rom. V. Privatdozent Dr. S. Bloch. 3. Aufl. (Bd. 22.)
— Roms Kampf um die Weltherrschaft. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Kromayer. (Bd. 368.)
Geschichte der Römer. Von Prof. Dr. R. v. Scala. (Bd. 578.)
— siehe auch Hellenist.-röm. Religionsgeschichte Abt. I; Pompeji Abt. III.
Rußland. Geschichte, Staat, Kultur. Von Dr. A. Luther. (Bd. 563.)
Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit. Von Prof. Dr. O. Weise. 4. Aufl. Mit 37 Abb. (Bd. 4.)
— s. a. Buch. Wie ein B. entsteht. Abt. VI.
Schweiz. Die. Land, Volk, Staat u. Wirtschaft. Von Reg.- u. Ständerat Prof. Dr. O. Wettstein. Mit 1 Karte. (Bd. 482.)
Seekrieg s. Kriegsschiff.
Sitten und Gebräuche in alter und neuer Zeit. Von Prof. Dr. E. Samter. (682.)
Soziale Bewegungen und Theorien bis zur modernen Arbeiterbewegung. Von G. Maier. 6. Aufl. (Bd. 2.)
— s. a. Marx, Rom; Sozialismus Abt. VI.
Staat, St. u. Kirche in ihr. gegenw. Verhältnis seit d. Reformation. V. Pfarrer Dr. phil. A. Pfannkuche. (Bd. 485.)
— Dtsche. Städte u. Bürger i. Mittelalter. V. Prof. Dr. B. Hoff. 3. Aufl. mit zahlr. Abb. u. 1 Doppeltafel. (Bd. 43.)
— Verfassung u. Verwaltung d. deutschen Städte. V. Dr. M. Schmid. (Bd. 466.)
— s. a. Griech. Städte, Komren, Rom.
Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte u. d. Wesen d. Astrologie. Unt. Mitwirk. v. Geh. Rat Prof. Dr. C. Bezold dargest. v. Geh. Hofr. Prof. Dr. Fr. Boll. 2. Aufl. M. 1 Sternk. u. 20 Abb. (638.)
Student. Der Leipziger, von 1409 bis 1909. Von Dr. W. Bruchmüller. Mit 25 Abb. (Bd. 273.)
Studententum. Geschichte d. deutschen St. Von Dr. W. Bruchmüller. (Bd. 477.)
Türkei. Die. V. Reg.-Rat P. R. Krause. Mit 2 Karten i. Text und auf 1 Tafel. 2. Aufl. (Bd. 469.)
Urzeit i. german. Kultur in der U.
Verfassung. Grundzüge der V. des Deutschen Reiches. Von Geheimrat Prof. Dr. E. Löning. 5. Aufl. (Bd. 34.)
Verfassungsrecht. Deutsches, in geschichtlicher Entwicklung. Von Prof. Dr. Ed. Hubrich. 2. Aufl. (Bd. 50.)
Vermessungs- u. Kartenkunde s. Kartenk.
Volk. Vom deutschen V. zum dt. Staat. Eine Gesch. d. dt. Nationalbewußtseins. V. Prof. Dr. P. Joachimsen. (Bd. 511.)
Völkerkunde. Allgemeine. I: Feuer, Nahrungserwerb, Wohnung, Schmuck und Kleidung. Von Dr. A. Heilborn. M. 54 Abb. (Bd. 487.) II: Waffen u. Werkzeuge, Industrie, Handel u. Geld, Verkehrsmittel. Von Dr. A. Heilborn. M. 51 Abb. (Bd. 488.) III: Die geistige Kultur der Naturvölker. Von Prof. Dr. K. Th. Preuß. M. 9 Abb. (Bd. 452.)
Volksbräuche, deutsche, siehe Feste.
Volkskunde. Deutsche, im Grundriß. Von Prof. Dr. E. Reuschel. I. Allgemeines, Sprache, Volksdichtung. (Bd. 644.)
— s. auch Bauernhaus, Feste, Sitten, Sternglaub., Volkstracht., Volksstämme.
Volksstämme. Die deutschen, und Landschaften. Von Prof. Dr. O. Weise. 5., völlig umgearb. Aufl. Mit 30 Abb. i. Text u. auf 20 Taf. u. einer Dialektkarte Deutschlands. (Bd. 16.)
Volkstrachten. Deutsche. Von Pfarrer K. Spieß. Mit 11 Abb. (Bd. 342.)
Vom Bund zum Reich siehe Geschichte.
Von Jena bis zum Wiener Kongreß. Von Prof. Dr. G. Kolde. (Bd. 405.)
Von Luther zu Bismarck. 12 Charakterbild. a. deutscher Gesch. V. Prof. Dr. O. Weber. 2 Bde. 2. Aufl. (Bd. 123, 124.)
Vorgeschichte Europas. Von Prof. Dr. H. Schmidt. (Bd. 571/572.)
Weltgeschichte s. Christentum.
Welthandel s. Handel.
Weltpolitik s. Politik.
Wirtschaftsgeschichte, Antike. Von Privatdozent Dr. O. Neurath. 2., umgearbeitete Auflage. (Bd. 258.)
— s. a. Antikes Leben u. d. ägypt. Papyri.
Wirtschaftsleben. Deutsches. Auf geogr. Grundl. gesch. V. Prof. Dr. Chr. Gruber. 4. Aufl. V. Dr. H. Reinlein. (42.)
— s. auch Abt. VI.

V. Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin.

Aberglaube. Der, in der Medizin u. s. Gefahr f. Gesundh. u. Leben. V. Prof. Dr. O. v. Hansemann. 2. Aufl. Bd. 83.)
Abstammungs- und Vererbungslehre. Experimentelle. Von Prof. Dr. E. Lehmann. Mit 26 Abb. (Bd. 379.)
Abstammungslehre u. Darwinismus. V. Pr. Dr. R. Hesse. 5. A. M. 40 Abb. (Bd. 39.)
Abwehrkräfte des Körpers. Die. Einführung in die Immunitätslehre. Prof. Dr. med. H. Kämmerer. 52 Abbildungen. (Bd. 4
Akustik. Einführung in die A. Von Dr. F. A. Schulze. (Bd.)
Algebra siehe Arithmetik. [Bd. (
Ameisen. Die. Von Dr. med. H.

Anatomie d. Menschen, Die. B. Prof. Dr. K. v. Bardeleben 6 Bde. Jeder Bd. mit zahlr. Abb (Bd. 418/423.) I. Zelle und Gewebe, Entwicklungsgeschichte. Der ganze Körper. 3. Aufl. II Das Skelett. 2. Aufl. III. Das Muskel- u. Gefäßsystem 2. Aufl. IV Die Eingeweide (Darm-, Atmungs-, Harn- und Geschlechtsorgane, Haut). 3. Aufl. V. Nervensystem und Sinnesorgane. VI. Mechanik (Statik u. Kinetik) d. menschl. Körpers (der Körper in Ruhe u. Bewegung). 2. Aufl.
— siehe auch Wirbeltiere.

Aquarium. Das. Von E. W. Schmidt. Mit 15 Fig (Bd 335.)

Arbeitsleistungen des Menschen, Die. Einführ. in d. Arbeitsphysiologie B Prof. Dr H Boruttau. M. 14 Fig. (Bd.539.)

— **Berufswahl. Begabung u. Arbeitsleistung** in i. gegens. Beziehungen. Von W. J. Ruttmann. Mit 7 Abb. (Bd. 522.)

Arithmetik und Algebra zum Selbstunterricht. Von Prof. B. Crantz 2 Bande. I.: Die Rechnungsarten. Gleichungen 1. Grades mit einer u. mehreren Unbekannten. Gleichungen 2. Grades. 6. Aufl. M 9 Fig i Text. II.: Gleichungen, Arithmet. u. geometr. Reih Zinseszins- u. Rentenrecha Kompl. Zahlen. Binom. Lehrsatz 4.Aufl. M. 21 Fig Bd. 120, 205.)

Arzneimittel und Genußmittel. Von Prof Dr. O Schmiedeberg. Bd. 363.)

Arzt. Der. Seine Stellung und Aufgaben im Kulturleben der Gegenw. Ein Leitfaden der sozialen Medizin. Von Dr med. M Fürst. 2. Aufl. (Bd. 265.)

Astronomie. Das astronomische Weltbild im Wandel der Zeit. 2. Aufl. Von Prof Dr S Oppenheim. I. Probleme der mod. Astronomie Mit 11 Fig. Bd 355.) II. Mod. Astronomie. (Bd. 445.)

— **Die A. in ihrer Bedeutung für das praktische Leben.** Von Prof. Dr. A Marcuse Mit 26 Abb (Bd. 378.)

— siehe auch Mond, Planeten, Sonne, Weltall, Weltbild, Sternglaube. Abt. I.

Atome s Materie.

Auge. Das, und die Brille. Von Prof Dr M. v. Rohr. 2. Aufl. Mit 84 Abb. u. 1 Lichtdrucktafel. (Bd. 372.)

Ausgleichungsrechn. s Kartenkde. Abt. IV

Bakterien, Die, im Haushalt und der Natur des Menschen. Von Prof Dr. E. Gutzeit. 2 Aufl. Mit 13 Abb. (212)

— **Die krankheiterregenden Bakterien.** [illegible]tsachen d. Entsteh., Heilung u [illegible]ütung d. bakteriellen Infektionskrankheiten d. Menschen. B. Prof Dr M. [illegible]hlein. 2.Aufl. M. 33 Abb. Bd 307.)

[illegible] Abwehrkräfte, Desinfektion, Pilze, [illegible]ilzlinge

[illegible]. Tätigkeit d. menschl. Körpers. Einführ[illegible]e Physiologie d. Menschen. B. Prof. [illegible]. Sachs. 4. A. M. 34 Abb. (Bd.32.)

[illegible] s. Arbeitsleistung.

Befruchtung und Vererbung. Von Dr E. Teichmann. 2. Aufl. M. 9 Abb. u. 4 Doppeltafeln. (Bd. 70.)

Bewegungslehre s. Mechan., Aufg. a. d. M. I.

Bienen. Die. Von Prof. Dr. E. Zander. (Bd. 705.)

Biochemie. Einführung in die B. in elementarer Darstellung. Von Prof. Dr. W Löb. Mit 12 Fig. 2. Aufl. v. Prof. Dr. H Friedenthal. (Bd 352.)

Biologie. Allgemeine. Einführ. i. d. Hauptprobleme d. organ. Natur B. Prof. Dr. H. Miehe 2. Aufl. 52 Fig. (Bd. 130.)

—, **Experimentelle. Regeneration, Transplantat. und verwandte Gebiete** Von Dr C Thesing. Mit 1 Tafel und 69 Textabbildungen. (Bd 337.)

— siehe a. Abstammungslehre. Bakterien, Befruchtung. Fortpflanzung. Lebewesen, Organismen. Schädlinge. Tiere. Urtiere.

Blumen. Unsere Bl. u. Pflanzen im Garten Von Prof. Dr. U. Dammer. Mit 69 Abb. (Bd 360.)

— **Uns Bl u. Pflanzen i. Zimmer.** B Prof. Dr. U Dammer. M. 65 Abb. (Bd 359.)

Blut. Herz. Blutgefäße und Blut und ihre Erkrankungen. Von Prof Dr. H. Rosin Mit 18 Abb (Bd. 312.)

Botanik. B. d. praktischen Lebens. B. Prof Dr P Giesenius. M. 24 Abb Bd 173.)

— siehe Blumen, Lebewesen, Pflanzen, Pilze, Schädlinge. Wald; Kolonialbotanik. Tabak Abt. VI

Brille s. Auge u. d. Brille.

Chemie. Einführung in die allg. Ch. B. Studienrat Dr. B. Bavink. 2 Aufl. Mit zahlr Fig. (Bd 582.)

— **Ein führg. i. d. organ. Chemie:** Natürl. u. künstl Pflanz.- u. Tierstoff B Studienrat Dr B Bavink. 2.A. 9 Abb (187.)

— **Einführung i. d. anorganische Chemie.** B Studienrat Dr. B Bavink. (598.)

— **Einführung i. d. analyt. Chemie.** B. Dr. F Rusberg. 2 Bde (Bd. 524. 525.)

— **Die künstliche Herstellung von Naturstoffen.** B. Prof. Dr. E. Rüst. (Bd. 674.)

— **Ch. in Küche und Haus.** Von Dr. J. Klein. 4 Aufl. (Bd. 76.)

— siehe a. Biochemie, Elektrochemie. Luft, Photoch., Agrikulturch., Sprengstoffe, Technol Chem. Abt. VI.

Chemikalienkunde. Von Chemiker Emil Dreckler (Bd. 728.)

Chirurgie. Die, unserer Zeit. Von Prof. Dr J Feßler. Mit 52 Abb. Bd 339.)

Darwinismus. Abstammungslehre und D. Von Prof Dr R. Hesse. 5. Aufl. Mit 40 Textabb (Bd 89.)

Desinfektion, Sterilisation und Konservierung. Von Reg.- u. Med.-Rat Dr. O. Solbrig. M. 20 Abb. i. T. (Bd. 401.)

Differentialrechnung unter Berücksichtig. d. prakt. Anwendung in der Technik mit zahlr. Beispielen u. Aufgaben versehen. Von Studienrat Dr. M. Lindow. 2. A. M. 45 Fig. i. Text u. 161 Aufg. (367.)
— siehe a. Integralrechnung.
Drogenkde. V. Chem. G. Drechsler. (727.)
Dynamik s. Mechanik, Aufg. a. d. techn. M. 2 Bd., ebenso Thermodynamik.
Eiszeit, Die, u. der vorgesch. Mensch. Von Geh. Bergr. Prof. Dr. G. Steinmann. 2. Aufl. Mit 24 Abb (Bd. 302.)
Elektrochemie u. ihre Anwendungen. Von Privatdoz. Dr. K. Arndt. 2. Aufl. Mit 37 Abb. i. T. (Bd. 234.)
Elektrotechnik, Grundlagen der E. Von Oberingenieur A. Roth. 2. Aufl. Mit 74 Abb. (Bd. 391.)
Energie. D. Lehre v. d. E. W. Oberlehr. A. Stein. 2. A. M. 13 Fig. (Bd. 257.)
Entwicklungsgeschichte d. Menschen. V. Dr. A. Heilborn. M. 60 Abb. (Bd. 388.)
Erde s. Weltentstehung u. -untergang.
Ernährung und Nahrungsmittel. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Lunge. 3. Aufl. Mit 5 Abb. i. T. u. 2 Taf. (19.)
Experimentalchemie s. Luft usw.
Experimentalphysik s. Physik.
Farben s. Licht u. F.: s. a. Farben Abt. VI.
Festigkeitslehre s. Statik.
Fixsterne, Die. V. Dr. Aug. Kühl. (677.)
Fortpflanzung. F. und Geschlechtsunterschiede d. Menschen. Eine Einführung in die Sexualbiologie. V. Prof. Dr. H. Boruttau. 2. Aufl. M. 39 Abb. (Bd. 540.)
Garten. Der Kleing. Von Redakteur Joh. Schneider. 2. Aufl. M. 80 Abb. (498.)
— Der Hausgarten. Von Gartenarchitekt W. Schubert. Mit Abb. (Bd. 502.)
— siehe auch Blumen, Pflanzen, Gartenkunst, Gartenstadtbewegung Abt. VI.
Gebiß, Das menschl., s. Erkrank. u. Pflege. V. Zahnarzt Fr. Jäger. M. 24 Abb. (229.)
Geisteskrankheiten. V. Geh. Med.-Rat Oberstabsarzt Dr. G. Ilberg. 2. A. (151.)
Genußmittel siehe Arzneimittel u. Genußmittel; Tabak Abt. VI.
Geographie s. Abt. IV.
— **Math. G.** s. Astronomie u. Erdkunde Abt IV.
Geologie, Allgemeine. V. Geh. Bergr. Prof. Dr. Fr. Frech 6 Bde. (Bd. 207/211 u. Bd. 61.) I.: Vulkane einst und jetzt. 3. Aufl. M. Titelbild u. 78 Abb. II.: Gebirgsbau und Erdbeben. 3., wes. erw. Aufl. M. Titelbild u. 57 Abb. III.: Die Arbeit des fließenden Wassers 3. Aufl. M. 56 Abb. IV.: Die Bodenbildung. Mittelgebirgsformen u. Arbeit des Ozeans. 3., wes. erw. Aufl. Mit 1 Titelbild u. 68 Abb. V. Steinkohle, Wüsten u. Klima der Vorzeit. 3. Aufl. Mit 39 Abb. VI. Gletscher einst u. jetzt. 3. Aufl. Mit 46 Abb. im Text.
— s. a. Kohlen, Salzlagerstätt. Abt. VI.
Geometrie. Analyt. G. d. Ebene s. Selbstunterricht. Von Prof. W. Franz. 2. Aufl. Mit 55 Fig. (Bd. 504.)
— **Geometr. Zeichnen.** Von Zeichenlehrer A. Schudeisky. (Bd. 568.)
— s. a. Mathematik.
Geomorphologie s. Allgem. Erdkunde.
Geschlechtskrankheiten, Die, ihr Wesen, ihre Verbreitg., Bekämpfg. u. Verhütg. Für Gebildete aller Stände bearb. v. Generalarzt Prof. Dr. W. Schumburg. 4. A. Mit 4 Abb. u. 1 mehrfarb. Taf. (251.)
Geschlechtsunterschiede s. Fortpflanzung.
Gesundheitslehre. Von Obermed.-Rat Prof. Dr. M. v. Gruber. 4. Aufl. Mit 28 Abbildungen. (Bd. 1.)
— **G. für Frauen.** Von Dir. Prof. Dr. E. Baisch. 2 Aufl. M. 11 Abb. (538.)
— s. a. Abwehrkräfte, Bakterien, Leibesüb.
Graph. Darstellung, Die. V. Hofrat Prof. Dr. F. Auerbach. 2. Aufl. Mit 139 Figuren. (Bd. 437.)
Haushalt siehe Bakterien, Chemie, Desinfektion, Naturwissenschaften, Physik.
Haustiere. Die Stammesgeschichte unserer H. Von Prof. Dr. C. Keller. 2. Aufl. Mit 29 Figuren. (Bd. 252.)
— s. a. Kleintierzucht, Tierzüchtg. Abt. VI.
Herz, Blutgefäße und Blut und ihre Erkrankungen. Von Prof. Dr. H. Rolly. Mit 18 Abb. (Bd. 312.)
Hygiene s. Schulhygiene, Stimme.
Hypnotismus und Suggestion. Von Dr. E. Trömner. 3. Aufl. (Bd. 199.)
Immunitätslehre s. Abwehrkräfte d. Körp.
Infinitesimalrechnung. Einführung in die I. Von Prof. Dr. G. Kowalewski. 3. Aufl. Mit 19 Fig. (Bd 197.)
Integralrechnung mit Aufgabensammlung. V. Studienrat Dr. M. Lindow. 2. Aufl. Mit Fig. (Bd. 673.)
Kalender, Der. Von Prof. Dr. W. F. Wislicenus. 2. Aufl. (Bd. 69.)
Kälte, Die. Wesen, Erzeug. u. Verwert. Von Dr. H. Alt. 45 Abb. (Bd. 311.)
Kinematographie s. Abt. VI.
Konservierung siehe Desinfektion.
Korallen u. and. gemeinbild. Tiere. V. Prof. Dr. W. May. Mit 45 Abb. (Bd. 231.)
Kosmetik. Ein kurzer Abriß der ärztlichen Verschönerungskunde. Von Dr. J. Sandel. Mit 10 Abb. im Text. (Bd. 489.)
Lebewesen. Die Beziehungen der Tiere und Pflanzen zueinander. Von Prof. Dr. K. Kraepelin. 2. Aufl. I. Der Tiere zueinander. M. 64 Abb. II. Der Pflanzen zueinander u. zu d. Tieren. 68 Abb. (Bd. 426/4
— s. a. Biologie, Organismen, Schädlin
Leib und Seele. Von Dr. phil. et med Sommer. (Bd. 7
Leibesübungen. Die, und ihre Bedeut für die Gesundheit. Von Prof. Dr. Zander. 4. Aufl. M. 20 Abb. (
— s. auch Turnen.

Licht. Das, u. d. Farben. Einführung in die Optik. Von Prof. Dr. L. Graetz 4. Aufl. Mit 100 Abb. (Bd. 17.)
Luft. Wasser, Licht und Wärme. Neun Vorträge aus d. Gebiete d. Experimentalchemie. V. Geh. Reg.-Rat Dr. M. Bleekmann. 4. Aufl. M. 115 Abb. (Bd 5.)
Luftstickstoff. D., u. s. Verwertg. V. Prof. Dr. K. Kaiser. 2. A. M. 13 Abb. (313.)
Maße und Messen. Von Dr. W. Block. Mit 34 Abb. (Bd. 385.)
Materie, Das Wesen d. M. V. Prof. Dr. G. Mie. I. Moleküle und Atome. 4. A. Mit 25 Abb. II. Weltäther und Materie. 4. Aufl. Mit Fig. (Bd. 58/59.)
Mathematik. Einführung in die Mathematik. Von Oberlehrer W. Mendelssohn. Mit 42 Fig. (Bd. 503.)
— **Math. Formelsammlung.** Ein Wiederholungsbuch der Elementarmathematik. Von Prof. Dr. S. Jakobi. (Bd. 567.)
— **Naturwissensch. u. M. i. klass. Altertum.** Von Prof. Dr. Joh. L. Heiberg. Mit 2 Fig. (Bd. 370.)
— **Praktische M.** Von Prof. Dr. R. Neuendorff. I. Graphische Darstellungen. Verkürztes Rechnen. Das Rechnen mit Tabellen. Mechanische Rechenhilfsmittel. Kaufmännisches Rechnen i. tägl. Leben. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 2., verb. A. M. 29 Fig. i. T. u. 1 Taf. II. Geom. Zeichnen. Projektionsl. Flächenmessung. Körpermessung. M. 133 Fig. (341, 526.)
— **Mathemat. Spiele.** V. Dr. W. Ahrens. 3. Aufl. M. Titelb. u. 77 Fig. (Bd. 170.)
— s. a. Arithmetik, Differentialrechnung, Geometrie, Infinitesimalrechnung, Integralrechnung, Perspektive, Planimetrie, Projektionslehre, Trigonometrie, Vektorrechnung, Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Mechanik. Von Prof. Dr. Hamel. 3 Bde. I. Grundbegriffe der M. II. M. d. festen Körper. III. M. d. flüss. u. luftförm. Körper. (Bd. 684/686.)
— **Aufgaben aus d. techn. Mechanik** für den Schul- u. Selbstunterricht. V. Prof. R. Schmitt. I. Bewegungsl., Statik. 156 Aufg. u. Lös. II. Dynamik. 140 Aufg. u. Lös. m. zahlr. Fig. i. T. (558/559.)
— siehe auch Statik.
Meer. Das M., s. Erforsch. u. s. Leben. Von Prof. Dr. O. Janson. 3. A. M. 40 F. (Bd. 30.)
Mensch u. Erde. Skizzen v. d. Wechselbeziehungen zwischen beiden. Von Geh. Rat Prof. Dr. A. Kirchhoff. 4. Aufl. (Bd. 31.)
— **Die Rassen der Menschen.** Von Prof. E. Fischer. (Bd. 624.)
Eiszeit, Entwicklungsgesch. Urzeit.
Natur u. Mensch siehe Natur.
Nervenkörper. Bau u. Tätigkeit d. menschl. Nervensystems. Einführung in die Physiologie. Von Prof. Dr. H. Sachs. 4. Aufl. M. 34 Abb. (32.)
auch Anatomie, Arbeitsleistungen, Blut, Fortpflanzg., Gehirn, Herz, Nervensystem, Physiol., Sinne, Verbildg.
Mikroskop. Das. V. Prof. Dr. W. Scheffer. 2. Aufl. Mit 99 Abb. (Bd. 35.)
Moleküle s. Materie.
Mond. Der. Von Prof. Dr. J. Franz. 2. Aufl. Mit 34 Abb. (Bd. 90.)
Nahrungsmittel s. Ernährung u. N.
Natur u. Mensch. V. Direkt. Prof. Dr. M. G. Schmidt. Mit 19 Abb. (Bd. 458.)
Naturlehre. Die Grundbegriffe der modernen N. Einführung in die Physik. Von Hofrat Prof. Dr. F. Auerbach. 4. Aufl. Mit 71 Fig. (Bd. 40.)
Naturphilosophie, Die mod. V. Privatdoz. Dr. J. M. Verweyen. 2. A. (Bd. 491.)
Naturwissenschaft. Religion und N. im Kampf u. Frieden. Ein geschichtl. Rückblick. V. Pfarrer Dr. A. Pfannkuche. 2. Aufl. (Bd. 141.)
— **N. und Technik.** Am sausenden Webstuhl d. Zeit. Übersicht üb. d. Wirkungen d. Naturw. u. Technik a. d. ges. Kulturleben. V. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Launhardt. 3. Aufl. M. 3 Abb. (23.)
— **N. u. Math. i. klass. Altert.** V. Prof. Dr. J. L. Heiberg. 2 Fig. (Bd. 370.)
Nerven. Vom Nervensystem, sein. Bau u. sein. Bedeutung für Leib u. Seele im gesund u. krank. Zustande. V. Prof. Dr. R. Bander. 3. Aufl. M. 27 Abb. (Bd. 48.)
— siehe auch Anatomie.
Optik. Die opt. Instrumente. Lupe, Mikroskop, Fernrohr, photogr. Objektiv u. ihnen verwandte Instr. V. Prof. Dr. M. v. Rohr. 3. Aufl. M. 89 Abb. (88.)
— s. a. Auge, Brille, Kinemat., Licht u. Farbe, Mikrosk., Spektroskopie, Strahlen.
Organismen. D. Welt d. O. In Entwickl. und Zusammenhang dargestellt. Von Oberstudienrat Prof. Dr. K. Lambert. Mit 52 Abb. (Bd. 236.)
— siehe auch Lebewesen.
Paläozoologie siehe Tiere der Vorwelt.
Perspektive. Die, Grundzüge d. P. nebst Anwendg. V. Prof. Dr. K. Doehlemann. Mit 91 Fig. u. 11 Abb. (Bd. 510.)
Pflanzen. Die fleischfress. Pfl. V. Prof. Dr. A. Wagner. Mit 82 Abb. (Bd. 344.)
— Uns. Blumen u. Pfl. i. Garten. V. Prof. Dr. U. Dammer. M. 69 Abb. (Bd. 360.)
— Uns. Blumen u. Pfl. i. Zimmer. V. Prof. Dr. U. Dammer. M. 65 Abb. (Bd. 359.)
— s. auch Botanik, Garten, Lebensweisen, Pilze, Schädlinge.
Pflanzenphysiologie. V. Prof. Dr. H. Molisch. Mit 63 Fig. (Bd. 569.)
Photochemie. Von Prof. Dr. G. Kümmell. 2. Aufl. Mit 23 Abb. i. Text u. a. 1 Taf. (Bd. 227.)
Photographie s. Abt. VI.
Physik. Verbegung d. mod. Ph. V. Oberl. Dr. H. Keller. 2. Afl. M. Fig. (343.)
— **Experimentalphysik.** Gleichgewicht u. Bewegung. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Börnstein. M. 90 Abb. (371.)

Physik. Bd. I. Klein u. Hans. B. Studienr. H. Speitkamp M. 51 Abb (Bd. 478.)
— **Große Physiker. Von Prof. Dr. F. A. Schulze.** 2 Aufl. Mit 6 Bildn. (824.)
— s. auch Energie, Naturlehre, Optik, Relativitätstheorie, Wärme; ebenso Elektrotechnik Abt. VI.
Physiologie. Bd. d. Menschen. B. Privatdoz. Dr. A. Lipschütz. 4 Bde. I: Allgem. Physiologie. II: Physiologie d. Stoffwechsels. III: Bd. d. Atmung, d. Kreislaufs u. d. Ausscheidung. IV: Bd. der Bewegungen und der Empfindungen. (Bd 527—530.)
— siehe auch Arbeitsleistungen, Menschl. Körper, Pflanzenphysiologie.
Pilze, Die. Von Dr. A. Eichinger. Mit — s. a. Bakterien. [64 Abb. (Bd. 334.)
Planeten, Die. Von Prof. Dr. B. Peter. 2. Aufl. Von Dr. H. Naumann. Mit Figuren. (Bd. 240.)
Planimetrie z. Selbstunterricht. B. Prof. B. Kranz. 2. Aufl. M. 94 Fig. (340.)
Praktische Mathematik s. Mathematik.
Projektionslehre. In kurzer leichtfaßlicher Darstellung f. Selbstunterr. u. Schulgebr. Von Zeichenl. A. Schubeisky. Mit 208 Fig. im Text. (Bd. 564.)
Radium, Das, u. d. Radioaktivität. B. Dr. M. Centnerszwer. 2. Afl. M. 33 Abb.
Rassen s. Mensch. [(Bd. 405.)
Rechenmaschinen, Die, und das Maschinenrechnen. Von Reg.-Rat Dipl.-Ing. K. Lenz. Mit 43 Abb. (Bd. 490.)
Relativitätstheorie, Einführung in die. M. 16 Fig. B. Dr. W. Bloch (Bd. 618.)
Röntgenstrahlen, D. R. u. ihre Anwendg. B. Dr. med. G. Buckh. M. 85 Abb. i. T. u. auf 4 Tafeln. (Bd 556.)
Säuglingspflege. Von Dr. E. Kobrak. Mit 20 Abb. (Bd. 154.)
Schachspiel. Das, und seine strategischen Prinzipien. B. Dr. M. Lange. 3. Aufl. Mit 2 Bildn., 1 Schachbrettafel u. 43 Diagrammen. (Bd. 281.)
— **Die Hauptvertreter der Schachspielkunst u. d. Eigenart ihrer Spielführung. Von Dr. M. Lange** (Bd. 531.)
Schädlinge, Die, im Tier- u. Pflanzenreich u. i. Bekämpf. B. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. K. Eckstein. 3. A. M. 36 Fig. (18.)
Schulhygiene. Von Prof. Dr. S. Burgerstein. 3. Aufl. Mit 43 Fig. (Bd. 96.)
Sexualbiologie s. Fortpflanzung, Pflanzen.
Sexualethik. B. Prof. Dr. H. E. Timerding (Bd. 592.)
Sinne d. Mensch.. D. Sinnesorgane u. Sinnesempfindungen. B. Hofrat Prof. Dr. J. Kreibig. 3. Aufl. M. 30 Abb. (27.)
Sonne, Die. Von Dr. A. Krause. Mit 64 Abb. (Bd. 357.)
Spektroskopie. Von Dr. L. Grebe. 2. Aufl. Mit Abbild. (Bd. 284.)
Spiel siehe Mathem. Spiele, Schachspiel.
Sprache. Die menschliche Sprache. (Ihre Entwicklung beim Kinde, ihre Gebrechen und deren Heilung.) Von Lehrer K. Nickel. (Bd. 586.)
— siehe auch Rhetorik. Sprache Abt. III.
Statik. Mit Einschluß der Festigkeitslehre. B. Baugewerkschuldirektor Reg.-Baum. A. Schau. Mit 149 Fig. i. T. (Bd. 497.)
— siehe auch Mechanik.
Sterilisation siehe Desinfektion.
Stickstoff s. Luftstickstoff
Stimme. Die menschliche St. und ihre Hygiene. Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. H. H. Gerber. 3., verb. Aufl. Mit 21 Abb. (Bd. 136.)
Strahlen, Sichtbare u. unsichtb. B. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Börnstein u. Prof. Dr. W. Marckwald. 3. Afl. v. Prof. Dr. E. Regener. M. zahlr. Abb. (Bd. 64.)
Suggestion. Hypnotismus und Suggestion. B. Dr. E. Trömner. 3. Aufl. (Bd. 199.)
Süßwasser-Plankton, Das. B. Prof. Dr. O. Zacharias. 2. A. 57 Abb. (Bd. 156.)
Tabak, Der. Von Jak. Wolf. 2. Aufl. Mit 17 Abb. i. T. (Bd. 416.)
Thermodynamik s. Abt. VI.
Tiere, T. der Vorwelt. Von Prof. Dr. O. Abel. Mit 31 Abb. (Bd. 399.)
— **Die Fortpflanzung der T. B. Prof. Dr. R. Goldschmidt.** Mit 77 Abb. (Bd. 253.)
— **Tierkunde. Eine Einführung in die Zoologie. Von Privatdozent Dr. K. Hennings.** Mit 34 Abb. (Bd. 142.)
— **Lebensbedingungen und Verbreitung der Tiere. Von Prof. Dr. O. Maas.** Mit 11 Karten und Abb. (Bd. 139.)
— **Zwiegestalt der Geschlechter in der Tierwelt (Dimorphismus). Von Dr. Fr. Knauer.** Mit 37 Fig. (Bd. 148.)
— s. auch Aquarium, Bakterien, Bienen, Haustiere, Korallen, Lebewesen, Schädlinge, Urtiere, Vogelleben, Vogelzug, Wirbeltiere.
Tierzucht siehe Abt. VI: Kleintierzucht, Tierzüchtung.
Trigonometrie, Ebene, z. Selbstunterr. B. Studienr. B. Kranz. 2. A. M. 50 Fig. (Bd. 431.)
— **Sphärische Tr. B. Studienr. B. Kranz.** (Bd. 605.)
Tuberkulose, Die, Wesen, Verbreitung, Ursache, Verhütung und Heilung. Von Generalarzt Prof. Dr. W. Schumb. 3 Aufl. M. 1 Taf. u. 8 Fig. (Bd
Turnen. Von Oberl. F. Eckardt. 1 Bildnis Jahns. (Bd.
— s. auch Leibesübungen, Anatomie Menschen Bd. VI.
Urtiere. Die, Einführung i. d. Wissen.. vom Leben. Von Prof. Dr. R. Goldschmidt. 2. A. M. 44 Abb. (Bd

Urzeit. Der Mensch d. U. Vier Vorlesung. aus der Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts. Von Dr. A. Heilborn. 3. Aufl. Mit 47 Abb. (Bd 62.)
Vektorrechnung. Einführung in die V. Prof. Dr. F. Jung. (Bd. 668.)
Verbildungen, Körperliche, im Kindesalter u. ihre Verhütung. Von Dr. M. David. Mit 26 Abb. (Bd 321.)
Vererbung. Exp. Abstammungs- u. V.-Lehre. Von Prof. Dr. E. Lehmann. Mit 20 Abbildungen. (Bd. 379.)
— **Geistige Veranlagung u. V.** V. Dr. phil. et med G. Sommer. 2. Aufl. (512.)
Vogelleben, Deutsches. Zugleich als Exkursionsbuch für Vogelfreunde. V. Prof. Dr A Voigt. 2. Aufl. (Bd. 221.)
Vogelzug und Vogelschutz. Von Dr W. R. Eckardt. Mit 6 Abb. (Bd. 218.)
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Einführ. in die. Von Prof. Dr. R. Suppantschitsch. (Bd. 580.)
Wald. Der deutsche. V. Prof. Dr. G. Hausrath. 2 Aufl M. Bilderanh u. 2. Karten. — siehe auch Holz Abt VI. [(Bd 153.)
Wärme. Die Lehre v. d. W. V. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R Börnstein. Mit Abb. 2. Aufl. v. Prof. Dr. A. Wigand. (172.)
— s. a. Luft. Wärmekraftmasch., Wärmelehre, techn Thermodynamik Abt. VI.
Wasser, Das. Von Geh. Reg.-Rat Dr. O. Anselmino. Mit 44 Abb. (Bd. 291.)
Weidwerk. V. deutsche. V. Forstmstr. G. Frhr. v. Nordenflycht. M. Titelb. (Bd.436.)
Weltall. Der Bau des W. Von Prof. Dr. J. Scheiner 4. A. M. 26 Fig. (Bd. 24.)
— siehe auch Materie.
Weltbild. Das astronomische W. im Wandel der Zeit. Von Prof. Dr. S. Oppenheim. 2 Aufl. Mit 19 Abb. (Bd. 110.)
— siehe auch Astronomie.
Weltentstehung. Entstehung d. W. u. d. Erde nach Sage u. Wissensch. V. Prof. Dr M. B. Weinstein. 3. Aufl. (Bd. 223.)
Weltuntergang. Untergang der Welt und der Erde nach Sage und Wissenschaft. V. Prof. Dr M. B Weinstein. (Bd. 470.)
Wetter. Unser W. Einführ. i. d. Meteorol. Deutsch V Dr. R. Hennig. 2. Aufl. Mit 14 Abb. (Bd. 349.)
— Einführung in die Wetterkunde. Von Prof. Dr. S. Weber. 3. Aufl. Mit 28 Abb. u. 3 Taf. (Bd. 55.)
Wirbeltiere. Vergleichende Anatomie der Sinnesorgane der W. Von Prof. Dr. W. Lubosch. Mit 107 Abb. (Bd. 282.)
Zahnheilkunde siehe Gebiß.
Zellen- und Gewebelehre siehe Anatomie des Menschen. Biologie.
Zoologie s. Abstammungsl., Aquarium, Bienen, Biologie, Schädlinge, Tiere, Urtiere, Vogelleben, Vogelzug, Weidwerk, Wirbeltiere.

VI. Recht, Wirtschaft und Technik.

Agrikulturchemie. Von Dr. B. Kritsche. Mit 21 Abb. (Bd. 314.)
Angestellte siehe Kaufmännische A.
Antike Wirtschaftsgeschichte. V. Priv.-Doz. Dr. G. Neurath. 2., umgearb. A. (258.)
— siehe auch Antikes Leben Abt. IV
Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung. V. Geh Hofrat Prof Dr. C. v. Zwiedineck-Südenhorst. 2. Aufl. (78.)
Arbeitsleistungen des Menschen. Die. Einführ in d. Arbeitsphysiologie. V. Prof. Dr. H Boruttau. M. 14 Fig. (Bd. 539.)
— **Berufswahl. Begabung u. A.** in ihren gegenseitigen Beziehungen. Von W. J. Ruttmann. Mit 7 Abb. (Bd. 522.)
Arzneimittel und Genußmittel. Von Prof. Dr. C. Schmiedeberg. (Bd. 363.)
Arzt. Der. Seine Stellung und Aufgaben im Kulturleben der Gegenw. Von Dr. M Fürst. 2. Aufl. (Bd 265.)
Autobil. Das. Eine Einf. in d. Bau d. Personen-Kraftwagens. V. Ob.-Ing. Klau 3., überarb. Aufl. M. 98 Abb. Titelbild. (Bd. 166.)
Bauhandwerk s. Eisenbetonbau.
Baukunst siehe Abt. III.
Beleuchtungswesen. Das moderne. Von Dr. H. Lux. M. 54 Abb. (Bd 433.)
Bergbau. Von Bergassessor S. W. Weber. (Bd. 467.)
Bewegungslehre s. Mechan., Aufg. a. d. M.
Bierbrauerei. Von Dr. A. Bau. Mit 47 Abb. (Bd. 333.)
Bilanz s. Buchhaltung u. B.
Blumen. Unt. Bl. u. Pfl. i. Garten. Von Prof. Dr. R Dammer. M. 69 Abb. (360.)
— Unt. Bl. u. Pfl. i. Zimmer. V. Prof. Dr. U. Dammer. M. 65 Abb. (Bd. 359.)
— siehe auch Garten.
Brauerei s. Bierbrauerei.
Buch. Wie ein B. entsteht. V. Prof. A. W. Unger. 4. Aufl. M. 7 Taf. u. 26 Abb. im Text. (Bd. 175.)
— s. a Schrift- u. Buchwesen Abt. IV.
Buchhaltung u. Bilanz. Kaufm., und ihre Beziehungen z. buchhalter. Organisation, Kontrolle u. Statistik. V. Dr. P. Gerstner. 2. Aufl M. 4 schemat. Darst. (507.)
Chemie in Küche und Haus. Von Dr. J. Klein. 4 Aufl. (Bd. 76.)
— s. auch Agrikulturchemie, Elektrochemie, Farben, Sprengstoffe, Technik; ferner Chemie Abt. V.
Dampfkessel siehe Feuerungsanlagen.
Dampfmaschine. Die. Von Geh Bergrat Prof. R. Vater. 2 Bde. I: Wirkungsweise des Dampfes im Kessel und in der Maschine. 4 Aufl. M. 37 Abb. (Bd. 393.) II: Ihre Gestaltung und Verwendung. 2. Aufl. Mit 105 Abb. (Bd. 394.)

Desinfektion, Sterilisation und Konservierung. Von Reg.- und Med.-Rat Dr. O. Soldrig. Mit 20 Abb. (Bd. 401.)
Deutsch s. Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Verfassung, Weidwerk, Wirtschaftsleben, Zivilprozeßrecht; Reich Abt. IV.
Drähte u. Kabel, ihre Anfertig. u. Anwend. i. d. Elektrotech. B. Tel.-Insp. S. Brick. 2. Aufl. M. 43 Abb. (Bd. 285.)
Dynamik s. Mechanik, Aufg. a. d. M. 2. Bd., ebenso Thermodynamik.
Eisenbahnwesen, Das. Von Eisenbahnbau- u. Betriebsinsp. a. D. Dr.-Ing. E. Biedermann. 3. A. M. zahlr. Abb. (144.)
Eisenbetonbau, Der. B. Dipl.-Ing. E. Haimovici. 2. Aufl. Mit 82 Abb. i. T. sowie 6 Rechnungsbeisp. (Bd. 275.)
Eisenhüttenwesen, Das. Von Geh. Bergr. Prof. Dr. H. Wedding. 5. Aufl. v. Bergass. F. W. Wedding. M. 22 Abb. (20.)
Elektrische Kraftübertragung, Die. B. Ing. B. Köhn. Mit 137 Abb. (Bd. 424.)
Elektrochemie. Von Prof. Dr. K. Arndt. Mit 37 Abb. (Bd. 284.)
Elektrotechnik. Grundlagen d. E. B. Obering. A. Rotth. 2. Aufl. M. 74 Abb. (391.)
— s. auch Drähte u. Kabel, Telegraphie.
Erbrecht. Testamentserrichtung und E. Von Prof. Dr. F. Leonhard. (Bd. 429.)
Ernährung u. Nahrungsmittel s. Abt. V.
Farben u. Farbstoffe. J. Erzeug. u. Verwend. B. Dr. A. Zart. 31 Abb. (Bd. 483.)
— siehe auch Licht Abt. V.
Fernsprechtechnik s. Telegraphie.
Feuerungsanlagen, Industr., u. Dampfkessel. B. Ing. J. E. Mayer. 88 Abb. (Bd. 348.)
— siehe auch Geldwesen.
Funkentelegraphie siehe Telegraphie.
Fürsorge s. Kinderf., Kriegsbeschädigtenf.
Garten. Der Kleingarten. B. Redakt. Joh. Schneider. 2. Aufl. M. 80 Abb. (498.)
— **Der Hausgarten.** Von Gartenarchitekt W. Schubert. Mit Abb. (Bd. 502.)
— siehe auch Blumen.
Gartenkunst. Gesch. d. G. B. Baurat Dr.-Ing. Chr. Rank. M. 41 Abb. (Bd. 274.)
Gartenstadtbewegung, Die. Von Landeswohnungsinspektor Dr. H. Kampffmeyer. 2. Aufl. M. 43 Abb. (Bd. 259.)
Gefängniswesen s. Verbrechen.
Geldwesen, Zahlungsverkehr u. Vermögensverwalt. Von G. Maier. 2. Aufl. (398.)
— s. a. Finanzwissensch.; Münze Abt. IV.
Genußmittel siehe Arzneimittel und Genußmittel, Tabak.
Gewerblicher Rechtsschutz i. Deutschland. B. Patentanw. B. Tolksdorf. (Bd. 138.)
— siehe auch Urheberrecht.
Graphische Darstell., Die. B. Hofrat Prof. Dr. F. Auerbach. 2. A. M. 139 Abb. (437.)
Handel. Geschichte d. Welth. Von Realgymnasialdirektor Prof. Dr. M. G. Schmidt. 3. Aufl. (Bd. 118.)
Handel. Geschichte d. deutsch. Handels seit d. Ausgang des Mittelalters. Von Dir. Prof. Dr. W. Langenbeck. 2. Aufl. Mit 16 Tabellen. (Bd. 237.)
Handelsmarine, Die. Entwickl. u. Techn. B. Major R. Weiß. 69 Abb. (Bd. 364.)
Handwerk, D. deutsche, in s. kulturgeschichtl. Entwicklg. B. Geh. Schulr. Dr. E. Otto. 4. Aufl. M. 33 Abb. auf 12 Taf. (Bd. 14.)
Haushalt s. Chemie, Desinfekt., Physik; Nahrungsm. Abt. IV; Walter. Abt. V.
Häuserbau siehe Baukunde, Beleuchtungswesen, Heizung u. Lüftung, Wohnungsw.
Hebezeuge. Hilfsmittel zum Heben fester, flüssiger und gasf. Körper. Von Geh. Bergrat Prof. R. Vater. 2. Aufl. M. 67 Abb. (Bd. 196.)
Heizung und Lüftung. Von Ingenieur J. E. Mayer. Mit 40 Abb. (Bd. 241.)
Holz. Das H., seine Bearbeitung u. seine Verwend. B. Insp. J. Großmann. Mit 39 Originalabb. i. T. (Bd. 473.)
Hotelwesen, Das. Von B. Damm-Etienne. Mit 30 Abb. (Bd. 331.)
Hüttenwesen siehe Eisenhüttenwesen.
Immunitätslehre s. Abwehrkräfte Abt. V.
Ingenieurtechnik. Schöpfungen d. J. der Neuzeit. Von Geh. Regierungsrat M. Geitel. Mit 92 Abb. (Bd. 28.)
Instrumente siehe Optische J.
Kabel s. Drähte und K.
Kälte, Die, ihr Wesen, i. Erzeug. u. Verwertg. B. Dr. H. Alt. M. 45 Abb. (311.)
Kaufmann. Das Recht des K. Ein Leitfaden f. Kaufleute, Studier. u. Juristen. B. Justizrat Dr. M. Strauß. (Bd. 409.)
Kaufmännische Angestellte. D. Recht d. k. A. B. Justizr. Dr. M. Strauß. (361.)
Kinderfürsorge. Von Prof. Dr. Chr. J. Klumker. (Bd. 620.)
Kinematographie. Von Dr. H. Lehmann. 2. Aufl. B. Dr. W. Nerté. Mit Abb. (Bd. 358.)
Klein- u. Straßenbahnen, Die. B. Obering. a. D. Oberlehrer A. Liebmann. Mit 85 Abb. (Bd. 322.)
Kleintierzucht, Die. Von Redakt. Joh. Schneider. M. 59 Fig. i. T. u. a. 6 Taf.
— siehe auch Tierzüchtung. (Bd. 604.)
Kohlen, Unsere. B. Bergass. B. Kukuk. Mit 60 Abb. i. Text u. 3 Taf. (Bd. 396.)
Kolonialbotanik. Von Prof. Dr. F. Tobler. Mit 21 Abb. (Bd.
Konstitution, Unsere. Von A. Br[illegible]ning. (Bd.
Konservierung siehe Desinfektion.
Kontinentalnotenbankwesen, Die. Von Pr[illegible] F. Standinger. (Bd.
— s. auch Mittelstandsbewegung, [illegible]schaftliche Organisationen.
Kraftanlagen siehe Dampfmaschine, [illegible]rungsanlagen und Dampfkessel, Wa[illegible]kraftmaschine, Wasserkraftmaschine.

Kraftübertragung. Die elektr. V. Ing. P. Köhn. 2. Aufl. M. Abb. (Bd. 424.)
Krieg. Kulturgeschichte d. K. V. Prof. Dr. K. Weule, Geh. Hofrat Prof. Dr. E. Bethe, Prof. Dr. B. Schmeidler, Prof. Dr. A. Doren, Prof. D. v. Herre. (Bd. 561.)
Kriegsbeschädigtenfürsorge. In Verbindung mit Med.-Rat, Oberstabsarzt u. Chefarzt Dr. Rebentisch, Gewerbeschuldir. H. Back, Direktor des Städt. Arbeitsamts Dr. B. Schlotter hersg. v. Prof. Dr. C. Kraus, Leit. d. Städt. Fürsorgeamts für Kriegshinterblieb. in Frankfurt a. M. M. 2 Abbildgst. (523.)
Kriegsschiffe, Unsere. Ihre Entstehg. u. Verwendg. B. Geh. Marinebaur. a. D. E. Krieger. 2. Aufl. v. Marinebaur. Fr. Schürer. Mit 62 Abb. (389.)
Kriminalistik, Moderne. Von Amtsrichter Dr. A. Hellwig. M. 18 Abb. (Bd. 476.)
— s. a. Verbrechen, Verbrecher.
Küche siehe Chemie in Küche und Haus.
Landwirtschaft. Die deutsche. B. Dr. W. Claaßen. 2. Aufl. Mit 15 Abb. u. 1 Karte. (Bd. 215.)
— s. auch Agrikulturchemie, Kleintierzucht, Luftstickstoff, Tierzüchtung; Haustiere, Tierkunde Abt. V.
Landwirtschaftl. Maschinenkunde. B. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. G. Fischer. 2. Aufl. Mit 64 Abbildungen. (Bd. 315.)
Luftfahrt, Die, ihre wissenschaftlichen Grundlagen und ihre technische Entwicklung. Von Dr. K. Rimführ. 3. Aufl. v. Dr. Fr. Huth. M. 60 Abb. (Bd. 300.)
Luftstickstoff, Der, u. s. Verw. B. Prof. Dr. K. Kaiser. 2. A. M. 13 Abb. (313.)
Lüftung, Heizung und L. Von Ingenieur J. E. Mayer. Mit 40 Abb. (Bd. 241.)
Marx, Karl. Versuch e. Einführung. V. Prof. Dr. R. Wilbrandt. 2. A. (621.)
— s. auch Sozialismus.
Maschinen s. Dampfmaschine, Hebezeuge, Landwirtsch. Maschinenkunde, Wärmekraftmasch., Wasserkraftmasch.
Maschinenelemente Von Geh. Bergrat Prof. R. Vater. 3. A. M. 175 Abb. (Bd. 391.)
Maße und Messen. Von Dr. W. Block. Mit 34 Abb. (Bd. 385.)
Mechanik. B. Prof. Dr. G. Hamel. 3 Bde. I. Grundbegriffe d. M. II. M. der festen Körper. III. M. d. flüss. u. luftförm. Körper. (Bd. 634 636.)
Aufgaben aus der technischen M. Schul- u. Selbstunterr. B. Prof. Schmitt. M. zahlr. Fig. I. Beweist., Statik. 156 Aufg. u. Lösungen. Anhang. 146 A. u. Lös. (Bd. 558/559.)
— s. auch siehe Maße und Messen.
Merkbuch, Das, für Juristen, Wirtschaftler u. Verwaltungsbeamte. Justizrat Dr. M. Strauß. (194.)
Messkunst, Das. B. Prof. Dr. W. Schesack. 2. Aufl. M. 99 Abb. (Bd. 35.)
Milch, Die, und ihre Produkte. Von Dr. A. Reiß. Mit 16 Abb. (Bd. 362.)
Mittelstandsbewegung, Die moderne. Von Dr. L. Müssemann. (Bd. 417.)
— siehe Konsumgenoss., Wirtschaftl. Org.
Nahrungsmittel s. Abt. V.
Naturwissensch. u. Technik. Am sauf. Webstuhl d. Zeit. Übers. üb. d. Wirkgen. d. Entw. d. N. u. T. a. d. ges. Kulturleb. B. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Launhardt. 3. Aufl. Mit 3 Abb. (Bd. 23.)
Nautik. B. Dir. Dr. J. Möller. 2. Aufl. Mit vielen Abb. (Bd. 255.)
Optischen Instrumente, Die. Lupe, Mikroskop, Fernrohr, photogr. Objektiv u. ihnen verw. Instr. Von Prof. Dr. M. v. Rohr. 3. Aufl. M. 89 Abb. (Bd. 88.)
Organisationen, Die wirtschaftlichen. Von Prof. Dr. E. Leberer. (Bd. 428.)
Ostmark, Die. Eine Einführ. i. d. Probleme ihrer Wirtschaftsgesch. Hrsg. von Prof. Dr. W. Mitscherlich. (Bd. 351.)
Patente u. Patentrecht s. Gewerbl. Rechtssch.
Perpetuum mobile, Das. B. Dr. Fr. Ichak. Mit 38 Abb. (Bd. 462.)
Photochemie. Von Prof. Dr. G. Kümmell. 2. Aufl. Mit 23 Abb. i. Text u. auf 1 Tafel. (Bd. 227.)
Photographie, Die, ihre wissenschaftlichen Grundlagen u. i. Anwendung. B. Dr. O. Prelinger. 2. Aufl. Mit Abb. (414.)
— **Die künstlerische Ph.** Ihre Entwicklung, ihre Probleme, ihre Bedeutung. Von Dr. W. Warstat. 2., verb. Aufl. Mit Bildertaf. (Bd. 410.)
— **Angewandte Liebhaber-Photographie, ihre Technik und ihr Arbeitsfeld.** Von Dr. W. Warstat. Mit Abb. (Bd. 555.)
Physik in Küche und Haus. Von Prof. Dr. H. Speitkamp. M. 61 Abb. (Bd. 478.)
— siehe auch Physik in Abt. V.
Postwesen, Das. Von Oberpostrat O. Stebliff. 2. Aufl. (Bd. 182.)
Rechenmaschinen, Die, und das Maschinenrechnen. Von Reg.-Rat Dipl.-Ing. K. Benz. Mit 43 Abb. (Bd. 490.)
Recht siehe Erbrecht, Gewerbl. Rechtsschutz, Kaufm. Angest., Kriminalistik, Urheberrecht, Verbrechen, Verfassungsrecht, Zivilprozeßrecht.
— **Rechtsfragen des täglichen Lebens in Familie und Hauswirt.** Von Justizrat Dr. M. Strauß. (Bd. 219.)
Rechtsprobleme, Moderne. B. Geh. Justizr. Prof. Dr. J. Kohler. 2. Aufl. (Bd. 138.)
Salzlagerstätten, Die deutschen. Ihr Vorkommen, ihre Entstehung und die Verwertung ihrer Produkte in Industrie und Landwirtschaft. Von Dr. L. Riemann. Mit 27 Abb. (Bd. 407.)
— siehe auch Geologie Abt. V.
Schiffbau siehe Kriegsschiffe.
Schmuck., Die, u. d. Schmucksteinindustr. B. Dr. A. Eppler. M. 64 Abb. (Bd. 376.)